

ANDRE DOS SANTOS KOCK
Matrícula: 202524449
Análise e Desenvolvimento de
Sistemas - Integral

-  Dashboard
(/Aluno/MinhasTurmas/)
-  Informações Pessoais
(/Aluno/InformacoesPessoais/)
-  Mensagens (/Aluno/Mensagens/)
-  Horários
(/Aluno/QuadroDeHorarios/)
-  Quadro Curricular
(/Aluno/Historico/)
-  Financeiro

Correção de Prova

Minhas Disciplinas (/AgendamentoProva)
/ Agendamentos de Prova (/AgendamentoProva/AgendamentoDeProva/20207120252?
idDisciplinaOferta=157576&idOfertaNoEAD=0)
/ Correção de Prova

Nota Máxima	6,00
Resultado	3,60
Descrição Considerando todos os conjuntos numéricos já estudados ao longo dessa disciplina, analisando as afirmativas abaixo relacionadas, sobre os conjuntos numéricos, todas estão corretas, EXCETO A O conjunto dos Números Reais não contém o conjunto dos Números Racionais. B Conjunto dos Números Naturais está contido dentro do conjunto dos Números Inteiros	

 [Agendamento Financeiro \(/AgendamentoJuridico/\)](#)

 [Secretaria On-line \(/Atendimento/\)](#)

 [Minha Biblioteca \(/Biblioteca\)](#)

 [Calendário de Atividades \(/Calendario/Aluno/jkwNb5qZfRw=\)](#)

 [Carteira de Estudante \(/CarteiraEstudante\)](#)

 [Histórico Escolar \(/Historico\)](#)

 [Boletins \(/Boletim/Aluno/jkwNb5qZfRw=\)](#)

 [Rematrícula \(/Rematricula\)](#)

 [Provas \(/AgendamentoProva\)](#)

 [Gráficos](#) <

 [Office 365 \(/Aluno/Office365/\)](#)

 [Carreiras \(https://uvvcarreiras-csm.symplicity.com/\)](#)

- C

Conjunto dos Números Racionais contém o conjunto dos Números Inteiros.

☐
- D

Entre dois números racionais distintos sempre existe outro número racional

☐
- E

Nem todo número Inteiro é Natural

☒

Nota 0,00

Descrição Uma prova com duas questões foi dada a uma classe de 40 alunos. Dez alunos acertaram as duas questões, 25 acertaram a primeira questão e 20 acertaram a segunda questão. Quantos alunos erraram as duas questões? 

- A

05 alunos

☒
- B

7 alunos

☐
- C

10 alunos

☐
- D

12 alunos

☐
- E

15 alunos

☐

 Clube de Descontos
(<https://clube.uvv.br/>)



(<https://itunes.apple.com/pt/app/clubede-descontos/id776866952?mt=8>)
(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phidelis.uvv.android>)

Nota 0,60

Descrição

Considerando a função $f(x) = \frac{\sqrt{-x+2}}{x^2-4x-5}$, é possível afirmar que seu conjunto Domínio é igual a:



- A $\{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x < 5\}$ ☐
- B $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2\}$ ☐
- C $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -1 \text{ e } x \neq 5\}$ ☐
- D $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2 \text{ e } x \neq -1\}$ ☒
- E $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 2 \text{ e } x \neq 5\}$ ☐

Nota 0,60

Descrição

Considerando todos os anagramas distintos que se pode formar com todas as letras da palavra MATEMÁTICA e desprezando o acento agudo, a quantidade desses anagramas em que as vogais apareçam todas juntas é igual a



A	$.6!$	☐
B	$.5 \times 6!$	☒
C	$\frac{6!}{4}$	☐
D	$\frac{10!}{24}$	☐
E	$.6 \times 6!$	☐
Nota	0,60	

Descrição Seja $S=\{1,2,4,6\}$. Qual das relações em S dadas a seguir é ao mesmo tempo reflexiva, antissimétrica e transitiva.



A	$R = \{(2, 4), (4, 2), (4, 6), (6, 4)\}$	☐
B	$R = \{(1, 2), (2, 1), (1, 1), (2, 2)\}$	☐

C	$R = \{(1, 1), (2, 2), (4, 4), (6, 6), (4, 6), (6, 4)\}$	☐
D	$R = \{(1, 1), (2, 2), (4, 4), (6, 6), (1, 2), (2, 4), (4, 6)\}$	☐
E	$R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 4), (1, 6), (2, 2), (4, 4), (6, 6), (2, 4), (2, 6)\}$	☒
Nota	0,60	

Descrição	Sejam $A=\{1,2,3,6,12,18\}$ e a relação “x divide y” sobre A. De acordo com o diagrama de Hasse de $(A,)$, afirmamos o seguinte: I) Os majorantes do subconjunto $\{2, 3\}$ são 6 e 12. II) Os minorantes do subconjunto $\{2, 3, 6\}$ são 1 e 2. III) O elemento mínimo de A é 1. IV) O elemento máximo de A é 18. V) O supremo do subconjunto $\{2, 3\}$ é 6. Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso):	☒
A	V – V – F – F – V	☒
B	F – F – V – F – V	☒
C	V – F – F – V – F	☐
D	F – V – F – F – V	☐

	E	F - V - V - F - F	☐
Nota	0,00		

Descrição	Sejam a relação sobre o conjunto $A = \{1,2, 3, 4\}$ descrita no conjunto $R = \{(1, 1), (1,4), (2, 3), (3, 2), (1, 2), (4, 3)\}$. Quais das seguintes alternativas descreve apropriadamente o fecho simétrico (F) de R?	
A	$F = \{(4,1), (2, 2), (3, 2)\} \cup R$	☐
B	$F = \{(1, 3), (2, 5), (3, 3)\} \cup R$	
C	$F = \{(3, 1), (3, 4), (2,4)\} \cup R$	☐
D	$F = \{(4,1), (2,2), (3, 3)\} \cup R$	☐
E	$F = \{(2,1), (4,1), (3,4)\} \cup R$	
Nota	0,00	

Descrição	Noventa alunos do primeiro período de Ciências da Computação frequentam aulas de informática, 70 frequentam aulas de matemática e 5 não se interessam	
------------------	---	---

pelas duas disciplinas neste período. Se 30 frequentarem aulas de Informática e matemática. Quantos alunos há no primeiro período de Ciências da Computação?

A	115	☐
B	125	☒
C	135	☒
D	145	☐
E	155	☐
Nota	0,00	

Descrição O fecho transitivo em $A = \{0, 1, 2, 3\}$ da relação $R = \{(0, 1), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2), (3, 0)\}$ é: ☒

A	$\{(0, 0), (1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$	☐
B	$\{(0, 1), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2), (3, 0)\}$	☐
C	$\{(0, 1), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2), (3, 0), (3, 3)\}$	☐
D	$\{(0, 1), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2), (3, 0), (0, 2), (0, 0), (1, 0), (2, 1), (3, 1), (3, 2)\}$	☒

E $\{(0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2), (3, 0), (1, 0), (2, 1), (3, 1), (3, 2)\}$ **Nota**

0,60

Descrição

Sejam as relações binárias R e T em um conjunto S.

*Considere as afirmações:*

- I. Se R e T forem reflexivas então $R \cup T$ também é;
- II. Se R e T forem reflexivas então $R \cap T$ também é;
- III. Se R e T forem simétricas então $R \cap T$ também é;
- IV. Se R e T forem transitivas então $R \cup T$ também é.

Assinale a alternativa correta:

A

I, II e III estão corretas

**B**

I e IV estão corretas

**C**

III e IV estão corretas



Portal do Aluno		
D	II, III e IV estão corretas	☐
E	I, III e IV estão corretas	☐
Nota	0,60	

Versão: 3.25.1001.2 ;