

Matematik A E2020

Uge 43, Forelæsning 1

Afsnit 7.11 og 10.1-4

Følger, (uendelige) rækker, rentetilskrivning

Overblik

- I dag:
 - Følger og rækker (7.11 og 10.4)
 - Lidt om rentetilskrivning (10.1-2) [NB: 10.3 kommer onsdag]
- Onsdag:
 - Kort om eksamen
 - Nutidsværdi og annuiteter (10.3,5,6)
 - Differensligninger (10.8)
- Næste uge (44): Integralregning (kap 9)!

Følger/"sequences" (7.11)

En (tal)følge $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$ (eller bare $\{s_n\}$) består af reelle tal:

$$s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, \dots$$

Kan opfattes som funktion $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, idet vi lader $s(1) = s_1$, $s(2) = s_2$, etc.

Alternativ notation: $(s_n)_{n=1}^{\infty}$, $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eller bare (s_n)

Eksempler:

$$s_n = \frac{1}{n} \quad 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$$

$$s_n = (-1)^n \quad -1, 1, -1, 1, \dots$$

$$s_1 = 1, s_2 = 1 \text{ og } s_n = s_{n-1} + s_{n-2} \text{ for alle } n \geq 3$$
$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots$$

Konvergens af følger

Løs definition:

En følge $\{s_n\}$ er konvergent med grænseværdien $s \in \mathbb{R}$, hvis følgens elementer ”efterhånden er vilkårligt tæt på s ”.

Så skriver vi


$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$$

(eller $s_n \rightarrow s$ for $n \rightarrow \infty$)

Præcis definition:

For alle $\varepsilon > 0$ findes $n_0 \in \mathbb{N}$ så

$$|s_n - s| < \varepsilon \text{ for alle } n > n_0$$



Bemærk analogien til definitionen af $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$

Eksempler


$$s_n = \frac{1}{n}$$

$$|s_n - 0| = \left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n}$$

Denne følge konvergerer mod 0 ($\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = 0$), da $\frac{1}{n}$ kan gøres vilk. lille ved at gøre n stor.

$$s_n = (-1)^n \quad -1, 1, -1, 1, \dots$$

Ikke konv! (Da den "hopper" ml. -1 og 1)



Uendelige rækker/"infinite series" (10.4)

En uendelige række er (løst sagt!) en uendelig sum af reelle tal:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots$$

Giver det mening med en sådan uendelig sum?

Lad os - på løstagtigt grundlag - overveje:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^n} = \frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \frac{1}{1000} + \frac{1}{10000} + \dots$$

$= 0,1111\dots = \frac{1}{9}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots$$

[Faktisk: $\frac{\pi^2}{6}$]

$$\sum_{n=1}^{\infty} 1 = 1 + 1 + 1 + 1 + \dots$$

" = ∞ "

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n = -1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - \dots$$

?
= 0 ?
= -1 ?

Afsnitsfølgen og konvergens

For en uendelige række $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$

består *afsnitsfølgen* $\{s_n\}$ af ”partial-summerne”

$$s_n = \sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$


(Dvs. $s_1 = a_1$, $s_2 = a_1 + a_2$, $s_3 = a_1 + a_2 + a_3$, ...)

Hvis afsnitsfølgen $\{s_n\}$ er konvergent med $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$,
så siges den uendelige række at være konvergent med sum s :

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i = s \quad \left(= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n a_i \right)$$

Eksempler

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots$$
$$= 1$$



Når vi tager flere og flere led
med i summen, bliver kvadratet tættere og tættere
på udfyldt.

$$\sum_{i=1}^{\infty} (-1)^i = -1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$$

Afsnitssfølgen: $s_1 = -1$, $s_2 = 0$, $s_3 = -1$, $s_4 = 0$, ...

$$s_n = \begin{cases} -1 & \text{hvis } n \text{ ulige} \\ 0 & \text{hvis } n \text{ lige} \end{cases}$$

Afsnitssflg er ikke konv, så rækken er ikke konv.

Vigtigt og nyttigt resultat, (10.4.8) s. 387:

Hvis den uendelige række $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ er konvergent, så gælder:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Bevis:

$$a_n = \sum_{i=1}^n a_i - \sum_{i=1}^{n-1} a_i = s_n - s_{n-1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} s - s = 0$$

Geometriske rækker (potensrækker)

(Uendelig) Geometrisk række ($a, k \in \mathbb{R}$):

$$\sum_{n=1}^{\infty} ak^{n-1} = a + ak + ak^2 + ak^3 + \dots$$

(Bemærk: $\sum_{n=1}^{\infty} ak^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} ak^n$)

Eksempler:

$a=1$
 $k=\frac{1}{2}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots \quad (=2)$$

$a=1$
 $k=\frac{1}{10}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{10^n} = 1 + \frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \frac{1}{1000} + \dots \quad \left(= \frac{10}{9}\right)$$

Konvergens og sum af uendelig geom. række, (10.4.5) s.386:

Den geometriske række $\sum_{n=1}^{\infty} ak^{n-1}$

er konvergent hvis og kun hvis $|k| < 1$, og så er summen

$$\sum_{n=1}^{\infty} ak^{n-1} = \frac{a}{1-k}$$

Eksempler fra før:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2 \quad \checkmark$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^{n-1} = \frac{1}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{1}{\frac{9}{10}} = \frac{10}{9} \quad \checkmark$$

Øvelse

$$\sum_{n=1}^{\infty} ak^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} ak^n = \frac{a}{1-k} \quad (\text{for } |k| < 1)$$

Bestem summen:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{5^{n-1}} = 2 + \frac{2}{5} + \frac{2}{25} + \frac{2}{125} + \dots$$

pingo.coactum.de
(185415)

$$= \frac{2}{1 - \frac{1}{5}} = \frac{2}{\frac{4}{5}} = \frac{10}{4} = \underline{\underline{\frac{5}{2}}}$$

$$\frac{2}{5^{n-1}} = 2 \left(\frac{1}{5} \right)^{n-1}, \text{ dvs } \underline{a=2}, \underline{k=\frac{1}{5}}$$

Endelig geometrisk række

Sum af endelig geom. række (10.4.3) s.384:

For alle reelle tal a og $k \neq 1$ gælder:

$$\sum_{i=1}^n ak^{i-1} = a + ak + ak^2 + \dots + ak^{n-1} = a \cdot \frac{k^n - 1}{k - 1}$$

Bevis: Lad $s_n = \sum_{i=1}^n ak^{i-1} = a + ak + ak^2 + \dots + ak^{n-1}$

$$ks_n = ak + ak^2 + \dots + ak^{n-1} + ak^n$$

$$s_n(k-1) = ks_n - s_n = ak^n - a = a(k^n - 1)$$

$$\text{Heraf : } s_n = \frac{a(k^n - 1)}{k - 1}$$

□

Den geometriske række $\sum_{i=1}^{\infty} ak^{i-1}$

er konvergent hvis og kun hvis $|k| < 1$, og så er summen

$$\sum_{i=1}^{\infty} ak^{i-1} = \frac{a}{1-k}$$

Bevis: Det n 'te led i afsnitsfølgen er (for $k \neq 1$)

$$s_n = \sum_{i=1}^n ak^{i-1} = a \cdot \frac{k^n - 1}{k - 1}$$

Hvis $|k| < 1$ vil $k^n \rightarrow 0$ når $n \rightarrow \infty$.

Dus når $|k| < 1$ vil $s_n \rightarrow a \cdot \frac{-1}{k-1} = \frac{a}{1-k}$

Hvis $|k| \geq 1$ (og $k \neq 1$) er k^n ikke konv.!

Dus når $|k| \geq 1$ (og $k \neq 1$) er $\{s_n\}$ ikke konv.!

$k=1$: $\sum ak^{i-1} = a + a + a + \dots$, ikke konv. (for $a \neq 0$)

Rentetilskrivning (10.1-2)

Et beløb S_0 indsættes i banken til en årlig rente r .

Ved årlig rentetilskrivning er beløbet efter et år så vokset til:

$$S_0(1 + r)$$

Hvis der tilskrives renter n gange om året (n årlige *terminer*) er *terminsrenten* $\frac{r}{n}$ og det oprindelige beløb S_0 er så efter en termin blevet til:

$$S_0(1 + \frac{r}{n})$$

Efter et år er beløbet blevet til:

$$S_0(1 + \frac{r}{n})^n$$

Og efter t år er beløbet blevet til:

$$S_0(1 + \frac{r}{n})^{nt}$$

Ved n årlige rentetilskrivninger er den *effektive årlige rente* R givet ved ((10.1.2), s. 377):

$$(1 + R) = (1 + \frac{r}{n})^n$$

Det kan vises (exercise 10.2.6, ekstra udfordring til uge 44) at $(1 + \frac{r}{n})^n$ er voksende i n .

Derfor: Jo flere årlige rentetilskrivninger, jo højere effektiv rente!

Kontinuert rentetilskrivning

Beløb S_0 er efter et år med n rentetilskrivninger blevet til:

$$S_0\left(1 + \frac{r}{n}\right)^n$$

Hvad sker der i grænsen $n \rightarrow \infty$? ("kontinuert rentetilskrivning")

Idet vi sætter $h = \frac{r}{n}$ får vi:

$$\left(1 + \frac{r}{n}\right)^n = (1 + h)^{\frac{1}{h} \cdot r} = \left[(1 + h)^{\frac{1}{h}}\right]^r$$

Når $n \rightarrow \infty$ vil $h \rightarrow 0$. Derfor:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n = \left[\underbrace{\lim_{h \rightarrow 0} (1 + h)^{\frac{1}{h}}}_{= e} \right]^r = [e]^r = e^r$$

Vigtig grænseværdi,
se næste slide!

Beløb S_0 er efter et år med kontinuert rentetilskrivning altså blevet til:

$$S_0 e^r$$

Efter t år: $S_0(e^r)^t = S_0 e^{rt}$

Kont. rentetilskr:
Højeste eff. rente!

En vigtig grænseværdi [(6.11.4), s.216)]:

$$\lim_{h \rightarrow 0} (1+h)^{\frac{1}{h}} = e$$

Bevis: Lad $g(x) = \ln(x)$.

$$\ln\left((1+h)^{\frac{1}{h}}\right) = \frac{1}{h} \ln(1+h) = \frac{\ln(1+h) - \ln(1)}{h}$$

$$= \frac{g(1+h) - g(1)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} g'(1) = \frac{1}{1} = 1$$

$$\underline{(1+h)^{\frac{1}{h}}} = e^{\underline{\ln\left((1+h)^{\frac{1}{h}}\right)}} \xrightarrow{h \rightarrow 0} e^1 = e$$

□