# Omrekentabel opioïden[1]

| Morfine | | Fentanyl | Oxycodon | | Hydromorfon | Tramadol | Buprenorfine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oraal | s.c./i.v. | pleister | oraal | s.c./i.v. | oraal | oraal | pleister |
| mg/24 u | mg/24 u | µg/u | mg/24 u | mg/24 u | mg/24 u | mg/24 u | µg/u |
| 30 | 10 | 12 | 15 | 7,5 | 4[2] | 150 | 17,5[3] |
| 60 | 20 | 25 | 30 | 15 | 8 | 300 | 35 |
| 120 | 40 | 50 | 60 | 30 | 16 | -[4] | 70 |
| 180 | 60 | 75 | 90 | 45 | 24 | - | 105 |
| 240 | 80 | 100 | 120 | 60 | 32 | - | 140 |
| 360 | 120 | 150 | 180 | 90 | 48 | - | -[5] |
| 480 | 160 | 200 | 240 | 120 | 64 | - | - |

1) Bij opioïdrotatie vanwege bijwerkingen wordt geadviseerd om 75% van de equi-analgetische dosis te geven, bij opioïdrotatie vanwege onvoldoende effect wordt de equi-analgetische dosis geadviseerd 2) Deze dosering kan in de praktijk niet gegeven worden omdat de laagste dagdosering van het slow releasepreparaat 4 mg is en het middel 2x per dag moet worden gegeven 3) Hiervoor wordt de buprenorfinepleister van 35 µg/uur doormidden geknipt 4) Hogere doseringen dan 400 mg/dag worden niet geadviseerd 5) Hogere doseringen dan 140 µg per uur worden niet geadviseerd