HYPER BIJ DM2

glucose > 15 mmol/l

Ga na of de meting correct uitgevoerd is.
Zijn handen gewassen voor meting?

Zeer ernstig

een of meer van de volgende verschijnselen:
1. tekenen van dehydratie (zoals weinig plassen)
2. braken > 4 uur,
3. hyperventilatie (verzuring?)
4. soporeus of subcomateus

→ Ambulance sturen en/of spoedvisite

Ernstig

BG > 25 of HI op de meter, of ziekteverschijnselen: braken < 4 uur, diarree en/of koorts, maar wel helder en plast nog

→ Visite binnen 30 minuten

Matig

BG 15–25 zonder ziekte-verschijnselen, maar wel dorst/polyurie

Mild

BG 15–25 zonder ziekteverschijnselen en zonder klachten

→ Adviseer voldoende te drinken (minimaal 100–200 ml per uur, liefst 500 ml in het eerste uur

---

1. Adviseer voldoende te drinken, minimaal 100–200 ml per uur, liefst 500 ml in het eerste uur
2. Bijspuiten met 2-4-6-regel
3. Overweeg bij braken een anti-emeticum

Bij ernstig ziek zijn en/of dehydratie en/of als bovenstaande advies niet mogelijk is en/of als er onvoldoende bewaking thuis is

→ Laat patient opnemen in ziekenhuis voor IV-behandeling

HYPO

glucose < 4 mmol/l en symptomen en/of bewustzijnsverlies
(niet alle patiënten hebben een meter –>
bewustzijnsverlies bij iemand met diabetes is een hypo tot het tegendeel bewezen is)

Kan glucose niet oraal innemen (buiten bewustzijn) U1

Gebruikt patient een SU-derivaat?

Ja

Telefoon: indien glucagon aanwezig, laat dit spuiten (sc of im).
Tevens spoedvisite glucose 50% IV (minimaal 20 ml, tot bewustzijn hersteld is)

→ Opname in ziekenhuis is geïndiceerd ivm zeer lang aanhoudende hypo's (soms wel 3 dagen)

Nee

Telefoon: indien glucagon aanwezig, laat dit spuiten (sc of im). Patient moet binnen 10 minuten bij zijn*

→ Indien geen glucagon aanwezig of geen reactie binnen 10 minuten: spoedvisite –> glucose 50% IV (minimaal 20 ml, tot orale inname mogelijk is)*

* Indien na bijkomen orale inname van glucose mogelijk is, adviseer patient om 2 boterhammen met zoet beleg te nemen. Herhalen BG-meting na 15 minuten, 1 uur en 2 uur en alle waarden doorbellen aan HAP.

Kan glucose oraal innemen (bij bewustzijn)

Laat patient eten/drinken:
- 6 dextro's
- of 2 eetlepels suiker opgelost in warm water
- daarna 2 boterhammen met zoet beleg
- herhaling BG meting

na 15 minuten & 1 uur (dit doorbellen aan HAP)

Gewenst resultaat?
Herhaal zo nodig bovenstaand schema 1 keer

Nee

Visite binnen 30 minuten.
Controleer bewustzijn en mogelijkheden tot follow-up van het bloedglucose. Overweeg bij gebruik van SU-derivaat een opname

Ja

Telefonisch advies:
- bij gebruik SU-derivaat –> volgende toediening eenmalig halveren (glicazide 'MR' en glimepiride) of overslaan en die dag follow-up door eigen huisarts op HAP
- bij gebruik insuline: tot overleg eigen huisarts of HAP de volgende dag –> spuit 20% minder insuline

---

Kortwerkend humaan • Humuline Regular • Insuman Rapid	
Snelwerkend analoog • Apidra (glulisine) • Humalog (lispro) • Novorapid (aspart)	
Langwerkend humaan • Humuline NPH • Insulatard • Insuman Basal	
Langwerkende analogen • Lantus (glargine)	
• Levemir (detemir)	
• Tresiba (degludec)	
Humane mix • Humuline NPH • Insuman Comb	
Analoge mix • Humalog Mix (lispro/lispro protamine) • NovoMix (aspart/aspart protamine)