

毕业论文（初稿）

图的前三大邻接特征值和的
变分结构及谱极值

Variational Structures and Spectral Extremal Problems
for the Sum of the Three Largest Adjacency Eigenvalues

学生姓名：待填写

学号：待填写

专业：待填写

指导教师：待填写

完成日期：2026 年 9 月 1 日

摘要

本文研究简单图邻接矩阵的前三大特征值之和

$$S_3(G) = \lambda_1(G) + \lambda_2(G) + \lambda_3(G).$$

研究从有限图与阶梯 graphon 之间的完整谱对应出发：阶梯 graphon 的积分算子除继承归一化后的有限图特征值外，还具有无限重零特征值，因而 $\sigma_3(W_G) = S_3(G)/|V(G)|$ 需要以第三大邻接特征值非负为前提。随后，利用 Ky Fan 变分原理建立 graphon 上的前三大谱和，并证明极值 graphon 的一阶符号必要条件。该条件控制灵敏度核的正负区域；零水平集则需要附加的二级极值选择和正性条件。进一步证明有限图全局极值比值 $M_3(n)/n$ 的极限存在，并等于 graphon Ky Fan 泛函的最大值。

主要可计算结果集中于由完全图核心与五边形外围构成的 clique- C_5 blow-up 图族。通过等价划分、商矩阵和五阶循环 Fourier 分解，可得到平衡图族 $K_a \vee C_5[K_b]$ 的完整邻接谱及 S_3 的闭式表达。更一般地，对具有连通支撑的有限步 graphon 可以证明：固定块测度和跨块密度后，任一对角块密度的增加都会严格提高前 k 大谱和。这一一般单调性说明完全块优于独立块。随后求得平衡 clique- C_5 六分块模型的唯一最优核心比例

$$\alpha_* = \frac{91 - 25\sqrt{7}}{126},$$

并证明目标函数在平衡参数区间上满足全局二次稳定性估计。对于允许五个外围块测度独立变化的完整单纯形，进一步给出迹范数表示和内部 KKT 方程，严格排除全部边界极大点，并证明平衡点是五维测度空间中的非退化严格局部极大点。有限阶图族还满足精确约化

$$S_3(H_{a,b}) = nF(a/n) - 3.$$

这一恒等式给出带显式误差项的构造下界，并推出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \max_{|V(G)|=n} S_3(G) \geq \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18}.$$

此外还给出一般图和二部图的线性上界，建立矩阵、图编辑距离与 graphon L^2 扰动下的谱和连续性估计，并得到首项修正为 -3 的有限阶双边展开。非平衡 blow-up 实验进一步导出平衡性与全局结构猜想；clique- C_5 模型在全体 graphon 中是否最优仍是本文尚未解决的问题。进一步地，本文把 C_5 推广到全部环 C_r ，证明五边形在“完全图核心加平衡环外围”模型族中唯一最优。

关键词：图谱；邻接特征值；Ky Fan 原理；graphon；谱极值；五边形 blow-up；扰动稳定性

Abstract

We study the sum of the three largest adjacency eigenvalues of a simple graph, $S_3(G) = \lambda_1(G) + \lambda_2(G) + \lambda_3(G)$. We first clarify the complete spectral correspondence between a finite graph and its step graphon. The graphon operator has infinitely many additional zero eigenvalues, so the identity $\sigma_3(W_G) = S_3(G)/|V(G)|$ requires $\lambda_3(G) \geq 0$. We then formulate the graphon problem through the Ky Fan variational principle and prove a first-order sign condition for an extremal graphon. The condition determines the graphon on the positive and negative regions of the associated sensitivity kernel, while its zero set requires an additional tie-breaking argument. We also prove that the finite extremal ratios $M_3(n)/n$ converge and that their limit equals the graphon variational maximum.

Our main explicit results concern clique blow-ups of a cycle joined to a complete core. Equitable partitions, quotient matrices, and the Fourier decomposition of C_r yield the full adjacency spectrum of the balanced family $K_a \vee C_r[K_b]$. We prove that C_5 is the unique optimizer among all balanced cycle lengths. More generally, for a finite-step graphon with connected support and fixed off-diagonal densities, increasing any diagonal block density strictly increases every Ky Fan spectral sum. We then determine the unique optimal core proportion in the balanced clique- C_5 model and prove a global quadratic estimate along the balanced one-parameter family. On the full five-dimensional simplex of block measures, we derive a trace-norm representation and interior KKT equations, exclude every boundary maximizer, and prove that the balanced point is a nondegenerate strict local maximum. We also obtain the exact finite-order reduction $S_3(H_{a,b}) = nF(a/n) - 3$. These results yield the lower bound

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \max_{|V(G)|=n} S_3(G) \geq \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18}.$$

We also derive edge-based upper bounds for general and bipartite graphs, establish perturbation bounds in graph edit distance and graphon L^2 distance, and obtain a two-sided finite-order expansion with leading correction -3 . Reproducible computations are given for unbalanced blow-ups. Proven results, conditional statements, and computational conjectures are kept separate; global optimality of the six-block model remains open.

Keywords: graph spectrum; adjacency eigenvalue; Ky Fan principle; graphon; spectral extremal problem; perturbation stability; blow-up of the five-cycle

目录

摘要	I
Abstract	III
第一章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 相关研究现状	1
1.3 成果口径与文献边界	2
1.4 研究难点与技术路线	2
1.5 主要结果	3
1.6 论文结构	4
1.7 记号约定	4
第二章 预备知识	5
2.1 图的邻接谱	5
2.2 Rayleigh 商与 Ky Fan 原理	5
2.3 Graphon 与邻接积分算子	6
2.4 五边形的谱	7
2.5 图的 join 与等价划分	7
第三章 有限图与 graphon 的谱对应	8
3.1 阶梯 graphon 的定义	8
3.2 前三大谱和的归一化条件	8
3.3 0-1 有限步模型的确定性逼近	9
3.4 一个必须保留的技术注记	10
第四章 极值 graphon 的必要结构	11
4.1 Graphon 上的 Ky Fan 泛函	11
4.2 第三个正谱方向与投影取得	12
4.3 全局渐近极值常数的存在性	12
4.4 灵敏度核与一阶符号条件	14
4.5 零水平集与二级极值选择	15
4.6 椭球驻点关系的当前地位	16

第五章	clique-C_5 blow-up 图族的谱极值	17
5.1	构造与一般商矩阵	17
5.2	平衡图族的完整谱	18
5.3	从 C_5 到 C_r 的环长度选择	20
5.4	固定分块下的对角密度单调性	23
5.5	非平衡六分块的迹范数表示与边界排除	25
5.6	对称六分块 graphon 的显式谱	29
5.7	平衡 clique 模型的唯一最优比例	30
5.8	定量稳定性与有限阶优化	31
5.8.1	完整测度单纯形中的解析局部稳定性	32
5.9	对全体有限图问题的渐近下界	35
第六章	一般上界与特殊图类	36
6.1	由谱能量得到的基本上界	36
6.2	密度优化后的一般图上界	36
6.3	二部图的奇异值表示	38
6.4	本章结果的作用与局限	39
第七章	谱和的扰动估计与有限阶稳定性	40
7.1	有限维 Ky Fan 谱和的扰动界	40
7.2	图编辑距离下的谱和稳定性	41
7.3	Graphon 谱和的 L^2 连续性	41
7.4	平衡构造的双边有限阶展开	42
7.5	典型图族的谱和比较	43
7.6	数值稳定不等于结构稳定	43
7.7	本章小结	44
第八章	计算实验、结构猜想与后续问题	45
8.1	计算目标与范围	45
8.2	小阶候选的独立复核	45
8.3	九阶候选构造的完整邻接表	46
8.4	非平衡外围块的搜索结果	47
8.5	数值稳定性与随机搜索证据	48
8.6	结论层级与逻辑边界	49
8.7	全局六分块猜想	50
8.8	后续研究问题	50
8.9	本章小结	51
参考文献		52

第一章 绪论

1.1 研究背景

设 G 是一个具有 n 个顶点的简单图，邻接矩阵记为 $A(G)$ ，其特征值按非增顺序排列为

$$\lambda_1(G) \geq \lambda_2(G) \geq \cdots \geq \lambda_n(G).$$

本文关注前三大邻接特征值之和

$$S_3(G) := \lambda_1(G) + \lambda_2(G) + \lambda_3(G).$$

这是一个同时反映图的稠密程度和整体结构的谱参数。与只研究谱半径 λ_1 的问题相比， S_3 对第二、第三个谱方向也敏感，从而自然地会区分具有相近边数但具有不同社区结构的图。

图谱极值问题的一个基本困难是：目标量由矩阵的前三个特征值共同决定，而这三个特征值对局部边的改变具有耦合效应。对于稠密图序列，graphon 理论提供了一个自然的极限语言。将图看成单位区间上的阶梯函数后，邻接矩阵可归一化为一个 Hilbert–Schmidt 积分算子；Ky Fan 变分原理又把前三大特征值之和写成三维子空间上的极值问题。这使得有限图的离散优化可以与函数空间中的变分分析相连接。

1.2 相关研究现状

Ky Fan 的经典极值原理把 Hermitian 矩阵前 k 个特征值之和表示为秩 k 投影上的迹极值 [1]，它是研究谱和问题的统一工具。对于图和一般对称矩阵，前两个以及前 k 个特征值之和的早期系统研究可见 Ebrahimi B. 等 [4] 和 Mohar [5]。这些工作表明，谱和问题既与图的极值边结构有关，也与矩阵分块和谱能量方法密切相关。

Lovász–Szegedy 的稠密图极限理论 [8] 及其系统专著 [10] 为大规模图的渐近结构提供了 graphon 语言。Liu [11] 进一步发展了 graphon 在谱极值问题中的应用。该

框架的优势是把邻接矩阵归一化为紧自伴积分算子，从而可以同时使用图极限紧性、算子谱和变分分析；困难则在于零谱、重特征值和极值 graphon 的有限步化都需要单独处理。

在与本文最接近的前两大特征值和问题中，Kumar 等 [15] 结合 graphon、凸几何、外代数和平方和方法证明了 $8n/7$ 型上界，并在极值 graphon 中使用二级极值选择处理一阶灵敏度核的零水平集。Huang 与 Wei[16] 随后给出有限阶问题的精确最大值和唯一性刻画。这些结果说明 graphon 变分可以产生精确结论，同时也提示从 $k = 2$ 推广到 $k = 3$ 时不能简单照搬所有结构引理。

关于二部图的前 k 个邻接特征值和，可以通过双邻接矩阵的奇异值来研究；相关谱和与能量结果可见 Das、Mojallal 和 Sun[12]。与已有工作相比，本文不声称已经解决 $k = 3$ 的全局精确极值，而是给出一个严格的受限模型主定理、一个显式构造下界、一般线性上界以及可继续验证的结构猜想。

1.3 成果口径与文献边界

本文中的“主要结果”只表示正文给出了自洽证明，并不自动表示这些结论具有文献意义上的首创性。Ky Fan 原理、等价划分、谱扰动公式、graphon 紧性以及已有的前两大谱和上界均在首次实质使用处标明来源。第五章的模型计算和推导完整写出，但在没有完成专题文献检索和导师确认前，不使用“首次证明”“填补空白”等优先权表述。第八章的有限枚举、随机搜索和中心差分只作为计算证据；猜想、带附加假设命题以及无条件定理分别使用不同环境，不互相替代。

1.4 研究难点与技术路线

前三大特征值之和同时受到正谱空间、零谱和分块结构的影响。为了使离散图、graphon 变分与显式构造处在同一套论证中，下文依次处理以下四个难点。

1. 阶梯 graphon 的积分算子具有无限重的零特征值，有限图谱与 graphon 谱之间不能无条件地把前三项逐项对应。
2. 一阶变分只能决定灵敏度核严格为正或严格为负的区域；在零水平集上，还需要额外的极值选择或稳定性论证。
3. 在同一六分块拓扑内，独立外围块并非最优。允许块内密度从 0 变化到 1 后，前三大谱和严格增加，因此最优端点由 clique 外围块给出。
4. 小阶数计算若没有邻接表、枚举算法和独立复核，就只能作为启发式证据，不能

写成“已证明唯一”。

据此采用“谱对应—变分必要条件—显式分块模型—一般上界”的技术路线。其中, clique- C_5 blow-up 的精确谱、块内密度单调性、有限阶约化和定量稳定性构成可完全验证的主结果。对非平衡六分块, 本文进一步给出迹范数表示、边界排除、内部 KKT 方程和平衡点的完整五维局部稳定性; 内部驻点的全局分类以及全体 graphon 的结构分类仍保留为后续问题。

1.5 主要结果

主要结果可以概括为以下八点。

1. 给出有限图阶梯 graphon 的完整谱分解, 并说明在 $\lambda_3(G) \geq 0$ 时才有 $\sigma_3(W_G) = S_3(G)/n$ 的直接恒等式。
2. 对极值 graphon 建立灵敏度核的符号必要条件: 核为正处图值必须为 1, 核为负处图值必须为 0。零水平集的处理被单独列出, 不与一阶结论混淆。
3. 证明有限图极值比值 $M_3(n)/n$ 的极限存在, 并等于 graphon 上 σ_3 的最大值。这把原先的上下极限统一为一个定义良好的全局常数。
4. 对固定块测度和跨块密度的不可约有限步 graphon, 证明任一对角块密度增加都会严格提高前 k 大谱和。该结论把“完全外围块优于独立外围块”从对称六分块计算推广为一般算子单调性定理。
5. 对平衡 clique- C_5 blow-up $K_a \vee C_5[K_b]$ 给出完整邻接谱。对相应的六分块 graphon, 证明平衡模型具有唯一最优核心比例

$$\alpha_* = \frac{91 - 25\sqrt{7}}{126}.$$

在平衡直线上给出全局二次稳定性估计以及有限阶恒等式 $S_3(H_{a,b}) = nF(a/n) - 3$ 。对允许五个外围测度独立变化的完整单纯形, 建立迹范数表示和内部 KKT 方程, 严格排除全部边界极大点, 并证明上述平衡点是完整五维空间中的非退化严格局部极大点。

6. 将外围五边形推广为任意环 C_r , 给出平衡环 clique blow-up 的完整谱, 并严格证明 C_5 在“完全图核心加平衡环外围”模型族中具有唯一最大的归一化前三大谱和。
7. 给出一般图和二部图的边数型上界, 分别把全局归一化上界压到 $(1 + \sqrt{3})/2$ 和 $(1 + \sqrt{3})/4$ 。
8. 建立 Ky Fan 谱和关于矩阵 Frobenius 扰动、图编辑距离和 graphon L^2 距离的

统一连续性估计，并把平衡图族的有限阶结果加强为 $B_n = c_*n - 3 + O(n^{-1})$ 。同时说明目标值稳定不能替代结构稳定性；非平衡 blow-up 的可复现实验则支持外围块大小平衡猜想。

特别地，全局极值比值的极限存在，并满足如下严格下界：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \max_{|V(G)|=n} S_3(G) \geq \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18} \approx 1.2815681969.$$

本文不声称这个数已经是所有 graphon 中的全局最大值。

1.6 论文结构

第二章介绍图谱、紧自伴算子、Ky Fan 原理和 graphon 的基本概念。第三章处理有限图到阶梯 graphon 的精确谱对应。第四章讨论 graphon 变分和一阶符号结构。第五章是全文的显式谱核心，分析 clique- C_5 blow-up、一般环 C_r 的平衡核心-外围模型，并给出非平衡六分块测度的边界排除和局部稳定性。第六章给出一般图和二部图的上界。第七章建立矩阵、图和 graphon 三个层次的扰动估计，并推导平衡构造的双边有限阶展开。第八章说明可复现实验、 $n = 9$ 的候选构造、非平衡结构猜想以及后续研究问题。

1.7 记号约定

除非另有说明，图均为有限简单无向图， $n = |V(G)|$ ， $m = |E(G)|$ 。积分均在 Lebesgue 测度下进行，graphon 在几乎处处相等的意义下视为同一个对象。对紧自伴算子，特征值按非增顺序排列，并将零特征值按需要补入谱序列。

第二章 预备知识

2.1 图的邻接谱

令 G 为 n 阶简单图, $A = A(G)$ 为其实对称邻接矩阵. 由谱定理, 存在正交矩阵 U 使得

$$A = U \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) U^T, \quad \lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n.$$

定义前 k 个特征值之和为

$$S_k(G) = \sum_{i=1}^k \lambda_i(G).$$

以下只使用 $k=3$, 但在变分公式中保留一般的 k 记号. 图的邻接谱、等价划分及商矩阵的系统背景可参见 [6].

由于 $\operatorname{Tr} A = 0$, 当 $n \geq 3$ 时有 $S_3(G) \geq 0$. 邻接矩阵的平方迹满足

$$\operatorname{Tr}(A^2) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 = 2m.$$

这两个恒等式将在第六章中给出粗粒度但完全一般的上界。

2.2 Rayleigh 商与 Ky Fan 原理

对实对称矩阵 A 和非零向量 x , 其 Rayleigh 商为

$$R_A(x) = \frac{x^T A x}{x^T x}.$$

最大特征值满足 Rayleigh–Ritz 公式

$$\lambda_1(A) = \max_{\|x\|_2=1} x^T A x.$$

定理 2.1 (有限维 Ky Fan 原理). 设 A 为 $n \times n$ 实对称矩阵, 且 $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$. 则对 $1 \leq k \leq n$,

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i = \max_{\substack{f_1, \dots, f_k \\ f_i^T f_j = \delta_{ij}}} \sum_{i=1}^k f_i^T A f_i = \max_{P=P^*=P^2, \operatorname{rank} P=k} \operatorname{Tr}(AP).$$

证明. 取前 k 个单位正交特征向量即可达到右端. 对任意正交组, 令 $P = \sum_i f_i f_i^T$. 将 P 在 A 的特征基下对角化, 得到 $\text{Tr}(AP) = \sum_j \lambda_j p_j$, 其中 $0 \leq p_j \leq 1$ 且 $\sum_j p_j = k$. 把总权重放在最大的 k 个特征值上给出上界. $\square$

对无限维紧自伴算子, 正特征值和负特征值分别只能以 0 为聚点, 因而不宜把全部谱强行拼成一个双向无限的非增序列. 本文直接采用 Ky Fan 泛函作为定义:

$$\sigma_k(T) := \sup_{P=P^*=P^2, \text{rank } P=k} \text{Tr}(TP).$$

若 T 至少有 k 个正特征值 $\mu_1^+(T) \geq \dots \geq \mu_k^+(T) > 0$, 则 $\sigma_k(T) = \sum_{i=1}^k \mu_i^+(T)$, 而且上确界由相应特征空间上的投影达到. 若正特征值少于 k 个, 则上述数值等于已有正特征值之和并以零补齐; 这里的“补零”只是泛函数值的约定, 不声称 0 必为算子的特征值. 对 graphon 邻接算子, 下文简写为 $\sigma_k(W)$. 上述投影形式源于 Ky Fan 极值原理 [1]; 有限维极小极大原理与矩阵谱不等式的系统论述可参见 [2, 3]. 投影写法的优点是在 $\lambda_k = \lambda_{k+1}$ 时仍可直接使用, 而无须固定唯一的特征向量组.

2.3 Graphon 与邻接积分算子

一个 graphon 是对称可测函数

$$W : [0, 1]^2 \rightarrow [0, 1], \quad W(x, y) = W(y, x) \quad \text{a.e.}$$

其邻接积分算子定义为

$$(A_W f)(x) = \int_0^1 W(x, y) f(y) dy, \quad f \in L^2([0, 1]).$$

因为 $W \in L^2([0, 1]^2)$, A_W 是 Hilbert-Schmidt 算子, 特别是紧自伴算子. 其非零谱由实特征值组成, 除可能的零点外只能以 0 为聚点.

对可积对称核 U , 本文采用标准 cut 范数

$$\|U\|_{\square} := \sup_{S, T \subseteq [0, 1] \text{ measurable}} \left| \int_{S \times T} U(x, y) dx dy \right|.$$

两个 graphon 的 cut 距离是在一方作保测重标号后对该范数取下确界; 距离为零的 graphon 按 weak isomorphism 视为同一极限对象.

若 $I_1, \dots, I_r$ 是 $[0, 1]$ 的可测划分, 且 W 在每个 $I_i \times I_j$ 上几乎处处为常数, 则称 W 为有限步 graphon. 取 $\phi_i = \mathbf{1}_{I_i} / \sqrt{|I_i|}$, 其在块常数子空间上的矩阵表示为

$$B_{ij} = W_{ij} \sqrt{|I_i| |I_j|}.$$

该矩阵是对称的; 块常数子空间的正交补包含在 A_W 的零空间中. 关于 graphon、cut 距离和稠密图收敛的系统背景可参见 [8, 9, 10].

2.4 五边形的谱

五边形 C_5 的邻接特征值为

$$2 \cos \frac{2\pi k}{5}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

故其谱可写为

$$2, \quad \frac{\sqrt{5}-1}{2}, \quad \frac{\sqrt{5}-1}{2}, \quad -\frac{\sqrt{5}+1}{2}, \quad -\frac{\sqrt{5}+1}{2}.$$

这个 Fourier 分解是第五章计算 C_5 blow-up 谱的关键。

定义 2.2 (完全块 blow-up). 设 F 为图, $F[K_b]$ 表示把 F 的每个顶点替换为一个大小为 b 的完全图, 并将原图中的每条边替换为两个对应块之间的完全二部图。类似地, $F[\overline{K}_b]$ 表示独立块 blow-up。

2.5 图的 join 与等价划分

若 G 和 H 为不交图, $G \vee H$ 在保留两者内部边的同时加入所有跨图边。若顶点划分的各块对外部块具有相同邻接关系, 则该划分是等价划分; 块常数向量张成的子空间在邻接矩阵作用下不变。其商矩阵一般不对称, 但与对称矩阵相似, 从而具有实特征值。第五章将反复使用这一事实。

第三章 有限图与 graphon 的谱对应

3.1 阶梯 graphon 的定义

设 G 是 n 阶图。将单位区间划分为长度均为 $1/n$ 的区间 $I_1, \dots, I_n$, 定义其阶梯 graphon 为

$$W_G(x, y) = \begin{cases} 1, & x \in I_i, y \in I_j, ij \in E(G), \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

令 $U_n = \text{span}\{\mathbf{1}_{I_i} : 1 \leq i \leq n\}$, 并取标准正交基 $\phi_i = \sqrt{n} \mathbf{1}_{I_i}$ 。

命题 3.1 (阶梯 graphon 的完整谱). 在上述基下, A_{W_G} 在 U_n 上的矩阵表示为 $A(G)/n$, 并且

$$\text{Spec}(A_{W_G}) = \left\{ \frac{\lambda_i(G)}{n} : 1 \leq i \leq n \right\} \cup \{0, \text{无限重}\}.$$

证明. 对 $1 \leq i, j \leq n$, 有

$$\langle A_{W_G} \phi_j, \phi_i \rangle = \int_{I_i \times I_j} W_G(x, y) n \, dx \, dy = \frac{A(G)_{ij}}{n}.$$

于是 U_n 在算子作用下不变, 限制矩阵为 $A(G)/n$ 。若 $f \in U_n^\perp$, 则每个块上的积分为零, 从而 $A_{W_G} f = 0$ 。这给出全部非零特征值及无限重零特征值。□

3.2 前三大谱和的归一化条件

graphon 的谱序列包含无限个零, 这一点对前三大谱和尤其重要。

推论 3.2. 对任意 n 阶图 G , 有

$$\sigma_3(W_G) = \sum_{i=1}^3 \max \left\{ \frac{\lambda_i(G)}{n}, 0 \right\}.$$

特别地, 若 $\lambda_3(G) \geq 0$, 则

$$\sigma_3(W_G) = \frac{S_3(G)}{n}.$$

若 $\lambda_3(G) < 0$, 则负特征值会被 graphon 谱中的零越过, 不能直接写成 $S_3(G)/n$ 。

证明. 由命题 3.1, graphon 的非零特征值恰为有限图特征值除以 n , 同时还存在无限重零特征值. 因此, 前三项 Ky Fan 泛函只保留 $\lambda_1/n, \lambda_2/n, \lambda_3/n$ 中的正值, 其余位置以零补齐. 第一式成立, 而 $\lambda_3 \geq 0$ 时立即得到第二式. $\square$

这一区分并非技术细节. 对于极值问题, 一个严谨的做法是先证明候选极值序列具有非负第三大特征值, 或者直接以 graphon 的 Ky Fan 投影泛函为起点, 最后再把结果翻译回有限图. 第五章的 clique- C_5 构造中将显式验证第三大特征值为正.

3.3 0–1 有限步模型的确定性逼近

第五章使用的 graphon 在每个块对上只取 0 或 1. 这一额外结构允许完全确定性地构造有限图, 而不需要调用随机图集中不等式.

命题 3.3 (0–1 有限步 graphon 的谱逼近). 设 $I_1, \dots, I_r$ 是 $[0, 1]$ 的可测划分, $p_i = |I_i| > 0$, 且 W 在 $I_i \times I_j$ 上取常值 $w_{ij} \in \{0, 1\}$. 则存在简单图序列 G_N , 使得在适当重标号后 $W_{G_N} \rightarrow W$ 于 L^2 , 并且对每个固定的 $k \geq 1$,

$$\frac{S_k(G_N)}{N} \longrightarrow \sigma_k(W).$$

证明. 对每个充分大的 N , 选取正整数 $n_i(N)$, 使

$$\sum_{i=1}^r n_i(N) = N, \quad \frac{n_i(N)}{N} \longrightarrow p_i.$$

把第 i 个块替换为 $n_i(N)$ 个顶点. 当 $i \neq j$ 时, 若 $w_{ij} = 1$, 就在两块之间加入全部边, 否则不加边; 当 $i = j$ 时, 分别按 $w_{ii} = 1$ 或 0 取完全图或独立集. 各块测度收敛且顶点对角小方格的总面积为 $1/N$, 所以适当重标号后 $\|W_{G_N} - W\|_2 \rightarrow 0$.

记 B_N 为 $A(G_N)/N$ 在归一化块示性函数基下的对称商矩阵. 其元素为

$$(B_N)_{ij} = w_{ij} \frac{\sqrt{n_i(N)n_j(N)}}{N} \quad (i \neq j),$$

以及

$$(B_N)_{ii} = w_{ii} \frac{n_i(N) - 1}{N}.$$

因此 B_N 逐项收敛于 A_W 在块常数子空间上的矩阵

$$B = (w_{ij}\sqrt{p_i p_j})_{i,j=1}^r.$$

由有限维 Weyl 连续性, B_N 的各个特征值收敛于 B 的对应特征值. 商空间之外的特征值只可能是 0 或 $-1/N$: 前者来自独立块内差分方向, 后者来自完全块内差分

方向。它们在极限中恰好承担 Ky Fan 泛函中补零的作用，故对每个固定 k 都有 $S_k(G_N)/N \rightarrow \sigma_k(W)$ 。□

注 3.4. 若某些块密度严格位于 $(0, 1)$ ，仅取整块测度并不能实现这些分数密度，也不能保留精确等价划分。此时可借助 W -随机图或块内拟随机构造研究谱收敛，但需要额外的集中估计。本文的显式下界只使用命题 3.3 覆盖的 0-1 模型，不对一般分数密度作上述确定性逼近声明。

3.4 一个必须保留的技术注记

若将图谱序列直接嵌入 $L^2([0, 1])$ 而忽略零特征值，就会在以下两种情形中产生错误：第一，有限图的第三大特征值为负；第二，图的秩小于三。以下始终采用命题 3.1 的完整谱式，并在每次使用 $S_3(G)/n = \sigma_3(W_G)$ 时单独检查非负性。

第四章 极值 graphon 的必要结构

4.1 Graphon 上的 Ky Fan 泛函

对 graphon W , 定义

$$\sigma_3(W) = \sup_{\substack{f_1, f_2, f_3 \in L^2[0,1] \\ \langle f_i, f_j \rangle = \delta_{ij}}} \sum_{i=1}^3 \langle A_W f_i, f_i \rangle.$$

按照第二章的约定, 该上确界就是 graphon 的前三项 Ky Fan 泛函, 也可写为

$$\sigma_3(W) = \sup_{P=P^*=P^2, \text{rank } P=3} \text{Tr}(A_W P).$$

当 A_W 有三个正特征值时, 该值等于它们之和, 并由相应特征空间上的投影达到; 在证明这一正性之前, 不预先断言上确界一定达到。

命题 4.1 (极值 graphon 的存在性). 存在 graphon W_* 使

$$\sigma_3(W_*) = \sup\{\sigma_3(W) : W \text{ 为 graphon}\}.$$

证明. 对任意两个 graphon U, W , Ky Fan 变分式给出

$$|\sigma_3(U) - \sigma_3(W)| \leq 3\|A_{U-W}\|_{\text{op}}.$$

对任意两个 graphon, 由有界核的标准插值估计可取

$$\|A_{U-W}\|_{\text{op}} \leq \sqrt{8\|U-W\|_{\square}}.$$

因此 cut 范数收敛蕴含算子范数收敛。同时, graphon 空间按 cut 距离为零取商后在 cut 距离下紧致 [8, 10, 11]。谱泛函在重标号下不变, 故 σ_3 在该紧商空间上连续并取得最大值。□

4.2 第三个正谱方向与投影取得

已有结果表明, 对任意 graphon W ,

$$\sigma_2(W) \leq \frac{8}{7}.$$

这里使用的是前两大谱和上界的 graphon 形式。文献 [15, 16] 给出有限图结论; 对任意 graphon 取稠密有限图逼近, 再使用本章采用的 cut 范数-算子范数连续性, 即得到上述 graphon 不等式。因此, 这里没有把文献中的有限图定理直接改写成未经说明的连续版本。另一方面, 定理 5.18 给出的六分块 graphon W_0 满足

$$\sigma_3(W_0) = \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18} \approx 1.281568 > \frac{8}{7}.$$

引理 4.2 (极值对象的第三正特征值). 每个 σ_3 全局极大 graphon W_* 都至少有三个正特征值。特别地, 若将前三个正特征值记为 $\mu_1(W_*) \geq \mu_2(W_*) \geq \mu_3(W_*) > 0$, 则

$$\sigma_3(W_*) = \mu_1(W_*) + \mu_2(W_*) + \mu_3(W_*),$$

且 *Ky Fan* 上确界由对应的三维特征空间达到。

证明. 极值性给出

$$\sigma_3(W_*) \geq \sigma_3(W_0) > \frac{8}{7} \geq \sigma_2(W_*).$$

若 A_{W_*} 的正特征值不足三个, 则按第二章的 *Ky Fan* 定义补零后必有 $\sigma_3(W_*) = \sigma_2(W_*)$, 与上式矛盾。因此第三个正特征值存在; 紧自伴谱定理随即给出三个标准正交特征函数以及达到上确界的三维投影。□

这一引理只保证第三个正谱方向存在, 并不保证 $\mu_3(W_*) > \mu_4(W_*)$ 。后续一阶符号条件不需要这一额外谱隙。

4.3 全局渐近极值常数的存在性

前面的 graphon 极值问题不仅提供变分语言, 还能解决有限图极值比值是否收敛这一基本问题。令

$$M_3(n) = \max\{S_3(G) : |V(G)| = n\},$$

并记

$$\mathfrak{c}_3 := \max\{\sigma_3(W) : W \text{ 为 graphon}\}.$$

定理 4.3 (有限图极值比值的极限存在). 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M_3(n)}{n} = \mathfrak{c}_3.$$

特别地, 前三大邻接特征值和的全局渐近极值常数存在, 而不只是具有上下极限。

证明. 先证上界。对任意 n 阶图 G , 阶梯 graphon 的无限重零谱只可能把有限图中的负特征值向后推, 因此第三章的完整谱对应给出

$$\frac{S_3(G)}{n} \leq \sigma_3(W_G) \leq \mathfrak{c}_3.$$

对所有 G 取最大值可得

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{M_3(n)}{n} \leq \mathfrak{c}_3.$$

下面证明匹配下界。取达到 $\mathfrak{c}_3$ 的 graphon W_* . 稠密图逼近定理保证存在有限简单图序列 F_j , 使得适当重标号后

$$\|W_{F_j} - W_*\|_{\square} \rightarrow 0[8, 10].$$

由有界核的 cut 范数-算子范数估计和 Ky Fan 连续性,

$$\sigma_3(W_{F_j}) \rightarrow \sigma_3(W_*) = \mathfrak{c}_3.$$

另一方面, 引理 4.2 的证明给出

$$\mathfrak{c}_3 > \frac{8}{7},$$

而任意 graphon 的前两项谱和至多为 $8/7$ 。所以对充分大的 j , W_{F_j} 必有三个正特征值; 否则 $\sigma_3(W_{F_j}) = \sigma_2(W_{F_j}) \leq 8/7$ 。由第三章的谱对应, 此时

$$\frac{S_3(F_j)}{|V(F_j)|} = \sigma_3(W_{F_j}).$$

因此, 对任意 $\varepsilon > 0$, 可固定一个 m 阶图 F , 使

$$\lambda_3(F) > 0, \quad \frac{S_3(F)}{m} \geq \mathfrak{c}_3 - \varepsilon.$$

对任意充分大的 N , 令 $t = \lfloor N/m \rfloor$, 把 F 的每个顶点替换为大小为 t 的独立集, 并在剩余 $N - tm$ 个位置补孤立点, 所得图记为 H_N 。独立集 blow-up 的邻接矩阵为 $A(F) \otimes J_t$, 故其非零特征值为 $t\lambda_i(F)$; 由于 $\lambda_3(F) > 0$, 补入的零特征值不会改变前三项, 于是

$$S_3(H_N) = tS_3(F).$$

从而

$$\frac{M_3(N)}{N} \geq \frac{S_3(H_N)}{N} = \frac{tm}{N} \frac{S_3(F)}{m}.$$

令 $N \rightarrow \infty$, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到

$$\liminf_{N \rightarrow \infty} \frac{M_3(N)}{N} \geq \mathbf{c}_3.$$

与上界合并即得结论。 $\square$

注 4.4. 该定理证明了全局常数的存在, 但没有计算出它的精确值。第五章给出 $\mathbf{c}_3 \geq (9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35})/18$, 第六章给出 $\mathbf{c}_3 \leq (1 + \sqrt{3})/2$ 。断言下界取等仍然是更强的结构问题。

4.4 灵敏度核与一阶符号条件

设 W 是 σ_3 的一个全局极大 graphon。由引理 4.2, 可以选取前三个正特征值对应的标准正交特征函数 f_1, f_2, f_3 ; 它们张成的三维投影达到 Ky Fan 上确界。定义灵敏度核

$$\kappa(x, y) = \sum_{i=1}^3 f_i(x) f_i(y).$$

对任意另一个 graphon U , 把同一组 f_i 作为 A_U 的试验函数, 可得

$$\sigma_3(U) - \sigma_3(W) \geq \iint_{[0,1]^2} (U - W) \kappa \, dx \, dy. \quad (4.1)$$

定理 4.5 (极值 graphon 的符号必要条件). 在上述假设下, 几乎处处有

$$\kappa(x, y) > 0 \implies W(x, y) = 1,$$

以及

$$\kappa(x, y) < 0 \implies W(x, y) = 0.$$

一阶变分对集合 $\{\kappa = 0\}$ 不施加约束。

证明. 定义 graphon

$$W^*(x, y) = \begin{cases} 1, & \kappa(x, y) > 0, \\ 0, & \kappa(x, y) < 0, \\ W(x, y), & \kappa(x, y) = 0. \end{cases}$$

代入式 (4.1) 得

$$\begin{aligned}\sigma_3(W^*) - \sigma_3(W) &\geq \iint_{\{\kappa>0\}} (1-W)\kappa + \iint_{\{\kappa<0\}} (-W)\kappa \\ &\geq 0.\end{aligned}$$

另一方面, W 是全局极大值点, 故左端不大于 0。右端两个被积函数均非负, 所以二者几乎处处为零。这恰好给出结论。 $\square$

注 4.6. 该定理是必要条件而不是极值 graphon 的分类定理。即使给定三个函数 f_1, f_2, f_3 并按照 κ 的符号确定 W , 仍须验证这些函数确实是所得算子的前三个特征函数, 以及所得 W 确实达到全局最大值。

4.5 零水平集与二级极值选择

在 $\kappa = 0$ 上, 式 (4.1) 的右端恒为零。若不增加信息, 就不能从一阶变分推出 W 在该集合上取 0 还是取 1。解决这个问题的一种标准方法是在所有 σ_3 极大元中再极大化谱半径。这一二级选择思路与前两大谱和问题中的处理方式一致 [15]。由命题 4.1 中相同的紧性论证和谱半径的连续性, 这一二级最大元确实存在。

命题 4.7 (带附加假设的完整阈值规则). 设 W 在所有 σ_3 极大 graphon 中使 $\mu_1(W)$ 最大。再假设其第一特征函数可以选为 $f_1 > 0$ 几乎处处, 并且 f_1, f_2, f_3 张成一个 Ky Fan 最优三维子空间。则几乎处处有

$$W(x, y) = \begin{cases} 1, & \kappa(x, y) \geq 0, \\ 0, & \kappa(x, y) < 0. \end{cases}$$

证明. 由定理 4.5 只需处理 $Z = \{(x, y) : \kappa(x, y) = 0\}$ 。令 $\widetilde{W} = W + (1 - W)\mathbf{1}_Z$, 即把 Z 上的值全部改成 1。用原来的 f_1, f_2, f_3 作试验函数, 得到 $\sigma_3(\widetilde{W}) \geq \sigma_3(W)$ 。极值性迫使二者相等, 所以 $\widetilde{W}$ 仍是 σ_3 极大元。由二级极值选择, $\mu_1(\widetilde{W}) \leq \mu_1(W)$ 。

另一方面, 用 f_1 作 $A_{\widetilde{W}}$ 的 Rayleigh 试验函数,

$$\mu_1(\widetilde{W}) \geq \mu_1(W) + \iint_Z (1 - W(x, y)) f_1(x) f_1(y) dx dy.$$

由于 $f_1(x)f_1(y) > 0$ 几乎处处, 上式与前一不等式共同推出 $W = 1$ 几乎处处成立于 Z 。 $\square$

注 4.8. 第一特征函数严格为正通常需要某种不可约性或连通性条件。本文没有证明每个极值 graphon 自动满足该条件, 故命题 4.7 被明确陈述为带附加假设的命题, 而不是无条件分类。

4.6 椭球驻点关系的当前地位

形式计算提示, 在足够强的正则性、不可约性和谱隙条件下, 极值特征函数可能满足

$$\mu_1 f_1(x)^2 + \mu_2 f_2(x)^2 + \mu_3 f_3(x)^2 = \mu_1 + \mu_2 + \mu_3 \quad \text{a.e.} \quad (4.2)$$

这意味着映射

$$x \mapsto (\sqrt{\mu_1} f_1(x), \sqrt{\mu_2} f_2(x), \sqrt{\mu_3} f_3(x))$$

几乎处处落在一个固定球面上, 或等价地, 未加权特征函数向量落在椭球面上。

但是, 从定理 4.5 到式 (4.2) 还缺少严格的对角型变分论证。尤其需要控制: 极值对象的二级选择、前三个特征值的重数、扰动后试验子空间的归一化, 以及相关二次型的符号。故将式 (4.2) 保留为驻点猜想, 不在后续证明中使用它。

猜想 4.9 (椭球驻点猜想). 存在一个达到全局最大值、满足适当不可约性与谱隙条件的 0-1 极值 graphon, 使其前三个正特征函数满足式 (4.2)。

这一表述保留了原变分思路的研究价值, 同时避免把尚未闭合的推导当作已证结论。

第五章 clique- C_5 blow-up 图族的谱极值

5.1 构造与一般商矩阵

令 C 为大小为 a 的完全图核心, $B_1, \dots, B_5$ 为五个非空完全图块, 其大小分别为 $b_1, \dots, b_5$ 。核心与所有外围顶点完全连接; 外围块 B_i, B_j 完全连接当且仅当 $ij \in E(C_5)$, 下标按模 5 计算。所得图记为

$$H(a; b_1, \dots, b_5) = K_a \vee C_5[K_{b_1}, \dots, K_{b_5}].$$

这里的记号强调外围块是完全图, 而不是独立集。




图 5.1: 六分块 clique- C_5 模型的块级拓扑示意图。中心块为完全图核心, 五个外围块按 C_5 相邻关系连接; 相应有限步 graphon 在每个块对上取常数。

令 $s_0 = a$, $s_i = b_i$ 。在六个块的归一化示性函数基下, 邻接矩阵限制在块常数子空间上的对称矩阵 B 为

$$B_{00} = a - 1, \quad B_{ii} = b_i - 1, \quad (5.1)$$

$$B_{0i} = B_{i0} = \sqrt{ab_i},$$

以及

$$B_{ij} = \begin{cases} \sqrt{b_i b_j}, & ij \in E(C_5), \\ 0, & ij \notin E(C_5), i \neq j. \end{cases}$$

与之等价的非对称邻居计数商矩阵 Q 满足

$$Q_{00} = a - 1, \quad Q_{0i} = b_i, \quad Q_{i0} = a, \quad Q_{ii} = b_i - 1,$$

且 $Q_{ij} = b_j$ 当 $ij \in E(C_5)$ 。矩阵 Q 与 B 相似, 因此二者特征值相同; 这也是等价划分谱方法的标准对称化形式 [6]。

命题 5.1 (非平衡 clique blow-up 的谱约化). 图 $H(a; b_1, \dots, b_5)$ 的邻接谱由矩阵式 (5.1) 的六个特征值以及特征值 -1 组成, 其中 -1 的额外重数为

$$(a - 1) + \sum_{i=1}^5 (b_i - 1) = a + \sum_{i=1}^5 b_i - 6.$$

证明. 块常数子空间在邻接矩阵作用下不变, 其矩阵表示正是 B 。对任意一个完全图块, 块内坐标和为零且其他块坐标为零的向量被邻接矩阵映为其相反数, 因此产生特征值 -1 。这些块内差分子空间彼此正交, 其维数之和为命题所给重数; 再加上六维块常数子空间即得到全部顶点空间。□

该命题把任意非平衡构造的 S_3 计算约化为一个 6×6 对称矩阵, 也是第八章枚举程序的理论依据。

5.2 平衡图族的完整谱

当 $b_1 = \dots = b_5 = b$ 时, 简记

$$H_{a,b} = K_a \vee C_5[K_b].$$

定理 5.2 (平衡 clique- C_5 blow-up 的完整谱). 对整数 $a, b \geq 1$, $H_{a,b}$ 的邻接谱由以下部分组成:

1. 二维商矩阵

$$Q_{a,b} = \begin{pmatrix} a-1 & 5b \\ a & 3b-1 \end{pmatrix}$$

的两个特征值

$$\rho_{\pm} = \frac{a+3b-2 \pm \sqrt{(a-3b)^2 + 20ab}}{2};$$

2. 特征值

$$\eta_b = \frac{1+\sqrt{5}}{2}b-1$$

及其重数 2;

3. 特征值

$$\nu_b = -\frac{\sqrt{5}-1}{2}b-1$$

及其重数 2;

4. 特征值 -1 及其重数 $a+5b-6$ 。

特别地, 前三大特征值为 ρ_+, η_b, ν_b , 所以

$$S_3(H_{a,b}) = \frac{a+3b-2 + \sqrt{(a-3b)^2 + 20ab}}{2} + (1+\sqrt{5})b-2. \quad (5.2)$$

证明. 外围图 $C_5[K_b]$ 在块常数子空间上的作用等于

$$bA(C_5) + (b-1)I_5.$$

对 C_5 的全一方向, 该矩阵的特征值为 $3b-1$; 该方向与核心全一方向共同形成二维不变子空间, 其邻居计数商矩阵为 $Q_{a,b}$ 。商矩阵的迹为 $a+3b-2$, 判别式化简为

$$(a+3b-2)^2 - 4((a-1)(3b-1) - 5ab) = (a-3b)^2 + 20ab,$$

故得到 $\rho_{\pm}$ 。

对 C_5 的另外四个 Fourier 方向, 分别把 $(\sqrt{5}-1)/2$ 和 $-(\sqrt{5}+1)/2$ 代入 $b\theta+b-1$, 即得到 η_b 和 ν_b , 重数均为 2。各完全块的差分子空间给出剩余的 -1 特征值。

最后, $Q_{a,b}$ 的行列式为

$$(a-1)(3b-1) - 5ab = -2ab - a - 3b + 1 < 0,$$

所以 $\rho_- < 0 < \rho_+$ 。商矩阵对应于连通图的块常数 Perron 方向, 故 ρ_+ 是邻接矩阵的 Perron 根; 也可由对称商矩阵的 Rayleigh 商得到 $\rho_+ \geq 3b-1 > \eta_b$ 。又 $\eta_b > 0$, 而 $\nu_b < -1$ 。因此前三大特征值恰为 ρ_+, η_b, ν_b 。□

例 5.3. 取 $a = b = 1$, 得到 $H_{1,1} = K_1 \vee C_5$, 且

$$\lambda_1 = 1 + \sqrt{6}, \quad S_3 = \sqrt{6} + \sqrt{5} \approx 4.685558.$$

该闭式结果同时为后文的小阶数值计算提供了校验样例。

例 5.4. 取 $a = 2, b = 1$, 得到

$$\lambda_1 = \frac{3 + \sqrt{41}}{2}, \quad S_3 = \frac{1 + \sqrt{41} + 2\sqrt{5}}{2} \approx 5.937630.$$

5.3 从 C_5 到 C_r 的环长度选择

前面的五边形模型具有两个相互配合的谱特征：外围环的第二、第三特征值相等，并且它们都为正。为了判断 C_5 是否只是一个偶然的候选，本节把外围拓扑推广为任意环 C_r 。这一步仍然完全处在可计算的平衡 clique blow-up 类内，但可以排除所有其它环长度。

对整数 $r \geq 3$, 定义

$$H_{a,b}^{(r)} := K_a \vee C_r[K_b], \quad n = a + rb,$$

其中 $C_r[K_b]$ 表示把 C_r 的每个顶点替换为一个大小为 b 的完全图。记

$$\gamma_r := 1 + 2 \cos \frac{2\pi}{r}.$$

定理 5.5 (平衡环 clique blow-up 的完整谱). 设 $r \geq 4$ 且 $a, b \geq 1$. 令

$$\rho_{\pm}^{(r)} = \frac{a + 3b - 2 \pm \sqrt{(a - 3b)^2 + 4rab}}{2},$$

并令

$$\eta_{r,b} = \gamma_r b - 1.$$

则 $H_{a,b}^{(r)}$ 的邻接谱由以下部分组成：

1. $\rho_+^{(r)}$ 和 $\rho_-^{(r)}$;
2. 对 $j = 1, \dots, r-1$, 特征值

$$\mu_{r,b}(j) = \left(1 + 2 \cos \frac{2\pi j}{r}\right) b - 1;$$

3. 特征值 -1 , 额外重数为 $a + rb - r - 1$ 。

前三大特征值为

$$\rho_+^{(r)}, \quad \eta_{r,b}, \quad \eta_{r,b},$$

其中当 $r = 4, b = 1$ 时后两项为零。因此

$$S_3 \left(H_{a,b}^{(r)} \right) = \rho_+^{(r)} + 2\gamma_r b - 2. \quad (5.3)$$

当 $r = 3$ 时, $C_3[K_b] = K_{3b}$, 故 $H_{a,b}^{(3)} = K_{a+3b}$, 其前三大特征值之和为 $a + 3b - 3$ 。

证明. 外围块常数子空间上的邻接作用为

$$bA(C_r) + (b-1)I_r.$$

其 Fourier 特征值正是 $\mu_{r,b}(j)$ 。外围全一方向的特征值为 $3b-1$, 与核心全一方向共同形成商矩阵

$$\begin{pmatrix} a-1 & rb \\ a & 3b-1 \end{pmatrix},$$

从而得到 $\rho_{\pm}^{(r)}$ 。各完全图块内坐标和为零的差分方向给出剩余 -1 特征值。

当 $r \geq 4$ 时, $\gamma_r \geq 1$, 且 $\eta_{r,b} \geq 0$ 。另外, $\mu_{r,b}(j) \leq \eta_{r,b}$, 而商矩阵的对称化形式说明 $\rho_+^{(r)} \geq 3b-1 > \eta_{r,b}$ 。最后, 商矩阵行列式为

$$(a-1)(3b-1) - rab = -(r-3)ab - a - 3b + 1 < 0,$$

故 $\rho_-^{(r)} < 0$ 。因此前三项恰如所述。 $\square$

令

$$\beta_r(\alpha) = \frac{1-\alpha}{r},$$

并定义环长度 r 对应的 graphon 目标函数

$$F_r(\alpha) := \frac{\alpha + 3\beta_r(\alpha) + \sqrt{(\alpha - 3\beta_r(\alpha))^2 + 4\alpha(1-\alpha)}}{2} + \frac{2\gamma_r}{r}(1-\alpha), \quad 0 \leq \alpha \leq 1. \quad (5.4)$$

由定理 5.5 直接得到

$$S_3 \left(H_{a,b}^{(r)} \right) = nF_r(a/n) - 3. \quad (5.5)$$

引理 5.6 (每个环长度的唯一核心比例). 对每个 $r \geq 4$, F_r 在 $[0, 1]$ 上严格凹, 且存在唯一 $\alpha_r \in (0, 1)$ 使 $F_r(\alpha_r) = \max_{[0,1]} F_r$ 。该点由方程

$$\frac{1-3/r}{2} + \frac{(1+3/r)q_r(\alpha_r) + 2(1-2\alpha_r)}{2\sqrt{q_r(\alpha_r)^2 + 4\alpha_r(1-\alpha_r)}} - \frac{2\gamma_r}{r} = 0, \quad q_r(\alpha) = \left(1 + \frac{3}{r}\right)\alpha - \frac{3}{r}, \quad (5.6)$$

唯一确定。

证明. 将根式内的量写成

$$D_r(\alpha) = q_r(\alpha)^2 + 4\alpha(1 - \alpha).$$

当 $r \geq 4$ 时, D_r 是区间上的正严格凹二次函数, 因而 $\sqrt{D_r}$ 也是严格凹函数; 其余项是线性的, 所以 F_r 严格凹。直接求导得到式 (5.6)。端点的单侧导数为

$$F'_r(0) = \frac{r^2 - 9 - 6\gamma_r}{3r} > 0, \quad F'_r(1) = -\frac{2\gamma_r}{r} < 0.$$

第一个不等式在 $r = 4, 5$ 时直接验证; 当 $r \geq 6$ 时使用 $\gamma_r < 3$ 即得。故严格凹性保证存在唯一内部驻点, 且该点为唯一全局最大点。□

定理 5.7 (环长度选择定理). 记

$$c_r := \max_{0 \leq \alpha \leq 1} F_r(\alpha), \quad r \geq 3.$$

则

$$c_3 = 1, \quad c_4 = \frac{9 + 4\sqrt{6}}{15}, \quad c_5 = \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18}, \quad c_6 = \frac{13 + 4\sqrt{11}}{21},$$

且对所有 $r \geq 6$ 有 $c_r \leq c_6$ 。因此

$$c_3 < c_4 < c_5, \quad c_r < c_5 \quad (r \geq 6),$$

即在所有平衡的“完全图核心 + 环外围”模型中, C_5 给出唯一最大的归一化前三大谱和。

证明. 对 $r = 3$, 模型就是完全图。对 $r = 4$, 由式 (5.4) 可化为

$$F_4(\alpha) = \frac{7 - 3\alpha + \sqrt{-15\alpha^2 + 22\alpha + 9}}{8}.$$

其唯一最大点为

$$\alpha_4 = \frac{11 - 4\sqrt{6}}{15},$$

代回即得 $c_4 = (9 + 4\sqrt{6})/15$ 。对 $r = 5$, 由式 (5.6) 得唯一驻点

$$\alpha_5 = \frac{91 - 25\sqrt{7}}{126},$$

代入 F_5 得

$$c_5 = \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18}.$$

后文定理 5.18 将进一步证明该目标的全局二次稳定性。

对 $r = 6$, 有

$$F_6(\alpha) = \frac{11 - 5\alpha + 3\sqrt{-7\alpha^2 + 10\alpha + 1}}{12},$$

其唯一最大点为

$$\alpha_6 = \frac{55 - 10\sqrt{11}}{77},$$

从而 $c_6 = (13 + 4\sqrt{11})/21$ 。

最后设 $r \geq 6$ 。矩阵

$$M_r(\alpha) = \begin{pmatrix} \alpha & \sqrt{\alpha(1-\alpha)} \\ \sqrt{\alpha(1-\alpha)} & 3(1-\alpha)/r \end{pmatrix}$$

的最大特征值随右下角元素增加而不减。由于 $3/r \leq 1/2$, 有

$$\lambda_{\max}(M_r(\alpha)) \leq \lambda_{\max}(M_6(\alpha)).$$

另一方面, $2\gamma_r/r \leq 2/3$: $r = 6$ 时取等号, $r = 7, 8$ 可直接计算, 而 $r \geq 9$ 时由 $\gamma_r \leq 3 \leq r/3$ 得到。于是逐点有

$$F_r(\alpha) \leq F_6(\alpha),$$

故 $c_r \leq c_6$ 。最后, 利用

$$2.236 < \sqrt{5}, \quad 5.916 < \sqrt{35}, \quad \sqrt{6} < 2.450, \quad \sqrt{11} < 3.317$$

即可严格比较所列根式常数, 并得到

$$1 < c_4 \approx 1.253197 < c_5 \approx 1.281568, \quad c_6 \approx 1.250786 < c_5.$$

□

注 5.8. 环长度选择定理只解决一个明确的受限模型族: 它没有说明任意极值 graphon 必须具有环外围, 也没有证明全体图的全局最优性。它的作用是把“为什么是 C_5 ”从数值观察提升为模型族内部的严格比较, 并为全局六分块猜想排除了整个平衡环 blow-up 竞争类。

5.4 固定分块下的对角密度单调性

平衡模型允许用 Fourier 分解写出全部特征值, 但“块内加边是否有利”并不依赖五边形的对称性。下面先在一般有限步 graphon 上处理这一问题。




图 5.2: 平衡核心-环外围模型的最优归一化谱和。图中数值点由第八章的可复现脚本独立计算；定理 5.7 已严格证明 $r = 5$ 是唯一最大点。

设 $J_1, \dots, J_r$ 是 $[0, 1]$ 的可测划分, 各块测度均为正。固定 $q_{ij} = q_{ji} \in [0, 1] (i \neq j)$, 并假设以

$$ij \in E(\Gamma) \iff q_{ij} > 0$$

定义的支撑图 Γ 连通。对 $\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_r) \in [0, 1]^r$, 令 $W_{\mathbf{p}}$ 在 $J_i \times J_i$ 上取值 p_i , 在 $J_i \times J_j$ 上取值 q_{ij} 。

当 $r = 1$ 时, $J_1 = [0, 1]$, 且 $A_{W_{p_1}} = p_1 \mathbf{1}_{J_1} \otimes \mathbf{1}_{J_1}$ 。其唯一非零特征值为 p_1 , 故对任意 $k \geq 1$ 都有 $\sigma_k(W_{p_1}) = p_1$, 严格单调性直接成立。以下定理只需处理 $r \geq 2$ 的情形。

定理 5.9 (有限步 graphon 的对角密度严格单调性). 设 $r \geq 2$ 且 $k \geq 1$ 。若 $\mathbf{p}' \geq \mathbf{p}$ 逐坐标成立且 $\mathbf{p}' \neq \mathbf{p}$, 则

$$\sigma_k(W_{\mathbf{p}'}) > \sigma_k(W_{\mathbf{p}}).$$

因此, 在块测度和全部跨块密度固定时, 前 k 大谱和关于每个对角块密度严格增加, 唯一的最大密度向量为 $(1, \dots, 1)$ 。

证明. 记 $\delta_i = p'_i - p_i \geq 0$ 。两个邻接算子之差为

$$A_{W_{\mathbf{p}'}} - A_{W_{\mathbf{p}}} = \sum_{i=1}^r \delta_i \mathbf{1}_{J_i} \otimes \mathbf{1}_{J_i},$$

其中 $(\mathbf{1}_{J_i} \otimes \mathbf{1}_{J_i})f = \langle f, \mathbf{1}_{J_i} \rangle \mathbf{1}_{J_i}$ 。右端是正半定有限秩算子。由紧自伴算子的极小极大原理, 各有序特征值在这一扰动下均不减 [2, 3]。

支撑图连通保证 W_p 不可约。其 Perron 特征函数可取为几乎处处正的 f ，并归一化为 $\|f\|_2 = 1$ 。至少存在一个 j 使 $\delta_j > 0$ ，于是

$$\begin{aligned}\mu_1(W_{p'}) &\geq \langle A_{W_{p'}} f, f \rangle \\ &= \mu_1(W_p) + \sum_{i=1}^r \delta_i \left(\int_{J_i} f(x) dx \right)^2 > \mu_1(W_p).\end{aligned}$$

第一特征值严格增加，其余前 k 个有序特征值不减，故谱和严格增加。 $\square$

推论 5.10 (clique- C_5 模板中的块内最优性). 固定核心和五个外围块的任意正测度，并固定核心-外围及五边形相邻块之间的密度为 1。若六个对角块的密度可以分别在 $[0, 1]$ 中选择，则 σ_3 的唯一最优选择是六个对角密度全部等于 1。

这个推论允许外围块不等测度、对角密度也互不相同。下面回到等外围测度的情形，以获得可显式优化的谱公式。

5.5 非平衡六分块的迹范数表示与边界排除

为了区分已经证明的局部结论与尚未解决的全局平衡化问题，本节先在完整的块测度单纯形上作有限维约化。令

$$\Delta_5 = \left\{ d = (d_0, d_1, \dots, d_5) \in [0, 1]^6 : \sum_{i=0}^5 d_i = 1 \right\},$$

其中 d_0 是核心测度， $d_1, \dots, d_5$ 是外围测度。令 T 为固定的 6×6 对称 0-1 模板矩阵：其对角元、核心与外围之间的元以及 C_5 相邻外围块之间的元为 1，其余元为 0。记

$$D(d) = \text{diag}(d_0, \dots, d_5), \quad B(d) = D(d)^{1/2} T D(d)^{1/2}, \quad (5.7)$$

并令 W_d 为相应的 clique- C_5 六分块 graphon， $\Phi(d) = \sigma_3(W_d)$ 。

命题 5.11 (惯性与迹范数表示). 对每个 $d \in \Delta_5$ ，矩阵 $B(d)$ 的正特征值不超过三个，并且

$$\Phi(d) = \sum_{\lambda(B(d)) > 0} \lambda(B(d)) = \frac{1 + \|B(d)\|_*}{2}, \quad (5.8)$$

其中 $\|\cdot\|_*$ 表示矩阵迹范数。若所有 $d_i > 0$ ，则 $B(d)$ 恰有三个正特征值和三个负特征值。

证明. 由 C_5 的 Fourier 分解以及核心-外围全一方向上的二维约化,

$$\text{Spec}(T) = \left\{ 2 + \sqrt{6}, 2 - \sqrt{6}, \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{[2]}, \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{[2]} \right\}.$$

因此 T 的惯性为 $(3, 3)$ 。当 d 位于单纯形内部时, $B(d)$ 与 T 合同, Sylvester 惯性定律给出相同的惯性。当某些 $d_i = 0$ 时, 去掉相应的零行和零列后得到 T 的一个主子矩阵的合同变换; 由主子矩阵交错, 其正特征值不超过三个。

有限步 graphon 还具有无限重零谱, 故其前三项 Ky Fan 泛函等于 $B(d)$ 的全部正特征值之和。又

$$\text{Tr } B(d) = \sum_{i=0}^5 d_i T_{ii} = 1.$$

对任意实对称矩阵, 正特征值之和等于 $(\text{Tr } B + \|B\|_*)/2$, 从而得到式 (5.8)。 $\square$

下面两个结论把全局六分块平衡化问题缩小到内部驻点分类。它们不证明内部驻点唯一, 也不证明任意非平衡测度都可经一次平滑提高目标。

命题 5.12 (模板正部给出的六分块上界). 令 T_+ 为 T 的正部, 则对任意 $d \in \Delta_5$,

$$\Phi(d) \leq \text{Tr}(D(d)T_+) = u_1 + (u_0 - u_1)d_0, \quad (5.9)$$

其中

$$u_0 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{6}}{3}, \quad u_1 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{5} + \frac{2\sqrt{6}}{15}, \quad u_0 - u_1 = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{5}}{5}.$$

在 $d_0 = \alpha_*$ 时, 右端约为 1.28223。该上界非常接近 c_* , 但它随核心测度增加, 因而单独不足以证明全局平衡化。

证明. 写 $T = T_+ - T_-$, 其中 T_+, T_- 均为正半定矩阵。于是

$$B(d) \preceq D(d)^{1/2}T_+D(d)^{1/2}.$$

右端为秩至多三的正半定矩阵。由 Ky Fan 单调性,

$$\Phi(d) \leq \text{Tr}(D(d)^{1/2}T_+D(d)^{1/2}) = \text{Tr}(D(d)T_+).$$

T 在五个外围坐标上传递, 故 T_+ 的核心对角元为 u_0 , 每个外围对角元均为 u_1 。把上面给出的 T 的谱投影代入即可得到所列闭式。 $\square$

定理 5.13 (六分块测度单纯形的边界排除). 若 $d \in \partial\Delta_5$, 则

$$\Phi(d) < \frac{12061729}{9419000} < c_*. \quad (5.10)$$

因此, Φ 在 Δ_5 上的每个全局极大点都位于单纯形内部。

证明. 若一个块的测度为零, 则在其余五个坐标上重复 命题 5.12 的证明, 只需估计相应五阶主子矩阵正部的最大对角元.

先设核心测度为零. 此时主子矩阵为 $R = I + A(C_5)$. 它的正特征值为 $3, (1 + \sqrt{5})/2, (1 - \sqrt{5})/2$, 故由顶点传递性,

$$\max_i (R_+)_{ii} = \frac{4 + \sqrt{5}}{5} < \frac{5}{4}.$$

再设一个外围块的测度为零. 由二面体对称性可假设删去第五个外围坐标, 余下外围支撑为路径 P_4 . 关于 P_4 的反射对称性, 所得五阶模板正交分解为

$$C = \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 1 & 1 \\ \sqrt{2} & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

这里 C 作用在核心、两端点之和、两内点之和张成的子空间上, E 作用在相应的反对称子空间上. 矩阵 C 的特征多项式为

$$p(x) = x^3 - 4x^2 + 1.$$

它有唯一负根 r . 由于

$$p\left(-\frac{473}{1000}\right) = -\frac{739817}{10^9} < 0, \quad p\left(-\frac{59}{125}\right) = \frac{7246}{1953125} > 0,$$

且 $p'(x) > 0$ 对 $x < 0$ 成立, 所以

$$-\frac{473}{1000} < r < -\frac{472}{1000}. \quad (5.11)$$

删除 C 的第 i 行和第 i 列所得主子式分别为

$$q_0(x) = x^2 - 3x + 1, \quad q_1(x) = x(x - 3), \quad q_2(x) = x^2 - 2x - 1.$$

由简单特征值的谱投影公式 $(P_r)_{ii} = q_i(r)/p'(r)$, 并利用 $C_+ = C - rP_r$, 得到

$$\begin{aligned} (C_+)_{00} &= \frac{(r - 3)^2}{8 - 3r}, \\ (C_+)_{11} &= 1 + \frac{r^2 - 3r}{8 - 3r} < \frac{6}{5}, \\ (C_+)_{22} &= 2 + \frac{r^2 - 2r - 1}{8 - 3r} < \frac{81}{40}. \end{aligned}$$

后两个有理上界直接来自式 (5.11): 分母大于 9, 而相应分子分别小于 $9/5$ 和 $17/100$.

第一式关于 r 在该区间严格递减, 因此

$$(C_+)_{00} < \frac{(-473/1000 - 3)^2}{8 + 3(473/1000)} = \frac{12061729}{9419000}.$$

另一方面, 直接对角化 E 得

$$(E_+)_{11} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2\sqrt{5}} < \frac{5}{4}, \quad (E_+)_{22} = \frac{1}{\sqrt{5}} < \frac{1}{2}.$$

回到原来的四个外围坐标, 其正部对角元分别是上述对称与反对称对角元的平均, 因而端点坐标小于 $49/40$, 内点坐标小于 $101/80$; 它们都小于 $12061729/9419000$ 。这就覆盖了所有边界面, 包括同时有多个零测度的低维面。

最后, 平方比较给出 $\sqrt{5} > 2.236$ 和 $\sqrt{35} > 5.916$, 所以

$$c_* > \frac{5767}{4500} > \frac{12061729}{9419000}.$$

平衡点 d_* 的目标值为 c_* , 而 Φ 在紧单纯形上连续, 故任何全局极大点都不能位于边界。□

命题 5.14 (内部驻点的 KKT 方程). 设 $d \in \text{int } \Delta_5$, 并令 $B(d)_+$ 为 $B(d)$ 的正部。则

$$\frac{\partial \Phi}{\partial d_i}(d) = \frac{(B(d)_+)_{ii}}{d_i}, \quad i = 0, \dots, 5. \quad (5.12)$$

特别地, 每个内部约束驻点满足

$$\frac{(B(d)_+)_{00}}{d_0} = \dots = \frac{(B(d)_+)_{55}}{d_5} = \Phi(d). \quad (5.13)$$

由定理 5.13, 六分块类内的每个全局极大点都必须满足该方程组。

证明. 在单纯形内部, 命题 5.11 给出一个与零点分离的三维正谱簇。令 P_+ 为其谱投影, $E_i = e_i e_i^\top$ 。由标准谱投影微分公式以及

$$\frac{\partial B}{\partial d_i} = \frac{1}{2d_i}(E_i B + B E_i),$$

可得

$$\frac{\partial \Phi}{\partial d_i} = \text{Tr} \left(P_+ \frac{\partial B}{\partial d_i} \right) = \frac{(B P_+)_{ii}}{d_i} = \frac{(B_+)_{ii}}{d_i}.$$

约束驻点处六个偏导数等于同一个 Lagrange 乘子 λ 。函数 Φ 对正测度向量一次齐次, 故 Euler 恒等式给出

$$\lambda = \lambda \sum_i d_i = \sum_i d_i \frac{\partial \Phi}{\partial d_i} = \Phi(d),$$

从而得到式 (5.13)。□

5.6 对称六分块 graphon 的显式谱

取参数 $0 \leq \alpha \leq 1$, 令

$$\beta = \frac{1 - \alpha}{5}.$$

将 $[0, 1]$ 划分为核心块 I_0 和五个外围块 $I_1, \dots, I_5$, 其中 $|I_0| = \alpha$, $|I_i| = \beta$. 定义 $W_{\alpha,p}$ 如下: 核心内部、核心与外围之间、以及 C_5 相邻外围块之间的密度均为 1; 每个外围对角块的密度为 $p \in [0, 1]$; 其余位置密度为 0。

在归一化块示性函数基下, 核心全一方向与外围总全一方向对应矩阵

$$M_{\alpha,p} = \begin{pmatrix} \alpha & \sqrt{5\alpha\beta} \\ \sqrt{5\alpha\beta} & (p+2)\beta \end{pmatrix}. \quad (5.14)$$

另外两个正的外围 Fourier 特征值为

$$\eta_p(\alpha) = \beta \left(p + \frac{\sqrt{5}-1}{2} \right), \quad (5.15)$$

重数为 2。另两个外围 Fourier 特征值为

$$\nu_p(\alpha) = \beta \left(p - \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right),$$

重数为 2。

命题 5.15 (六分块模型的前三大谱). 设 $\rho_+(\alpha, p)$ 为式 (5.14) 的最大特征值, 则

$$\sigma_3(W_{\alpha,p}) = \rho_+(\alpha, p) + 2\eta_p(\alpha).$$

证明. 当 $0 < \alpha < 1$ 时, 矩阵 $M_{\alpha,p}$ 的行列式为

$$\alpha\beta(p+2) - 5\alpha\beta = \alpha\beta(p-3) < 0,$$

故它恰有一个正特征值。另一方面, $\eta_p(\alpha) > 0$, 且 $\rho_+(\alpha, p) \geq (p+2)\beta > \eta_p(\alpha)$ 。因此前三大特征值正是 ρ_+ 和两个 η_p 。端点情形由直接计算或连续性得到。□

推论 5.16 (对称模型中的块内密度严格单调性). 对固定 $\alpha \in [0, 1]$, 函数

$$p \mapsto \sigma_3(W_{\alpha,p})$$

在 $[0, 1]$ 上严格增加。因此, 在这一固定六分块拓扑中, 外围 *clique* 块 ($p = 1$) 严格优于独立块 ($p = 0$)。

证明. 这是定理 5.9 在五个外围对角密度同步变化、核心对角密度固定为 1 时的直接推论。也可由 $M_{\alpha,p} = M_{\alpha,0} + p\beta e_2 e_2^T$ 与式 (5.15) 直接验证。□

注 5.17. 有限 clique 块会产生许多 -1 特征值, 但除以顶点数后这些值趋于零; 相比之下, 块内边对正的块常数谱方向产生一阶贡献。因此“外围越稀疏越能避免负特征值”的解释不适用于本问题的归一化极限。

5.7 平衡 clique 模型的唯一最优比例

令 $p = 1$ 。由命题 5.15, 目标函数为

$$F(\alpha) = \frac{2\alpha + 3 + \sqrt{-36\alpha^2 + 52\alpha + 9}}{10} + \frac{1 + \sqrt{5}}{5}(1 - \alpha). \quad (5.16)$$

定理 5.18 (平衡六分块模型的精确最优值). 函数 F 在 $[0, 1]$ 上严格凹, 并在唯一点

$$\alpha_* = \frac{91 - 25\sqrt{7}}{126} \approx 0.1972715653$$

达到最大值。该最大值为

$$F(\alpha_*) = \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18} \approx 1.2815681969.$$

证明. 记 $D(\alpha) = -36\alpha^2 + 52\alpha + 9$ 。在 $[0, 1]$ 上 $D > 0$, 并且

$$\frac{d^2}{d\alpha^2} \sqrt{D(\alpha)} = \frac{D''}{2\sqrt{D}} - \frac{(D')^2}{4D^{3/2}} < 0.$$

因此 F 严格凹。其驻点方程为

$$F'(\alpha) = 0 \iff \frac{52 - 72\alpha}{\sqrt{-36\alpha^2 + 52\alpha + 9}} = 4\sqrt{5}.$$

结合左端分子的符号并平方化简, 得到区间内唯一解

$$\alpha_* = \frac{91 - 25\sqrt{7}}{126}.$$

端点导数符号或严格凹性说明该点是唯一全局最大点。代入时有

$$\sqrt{D(\alpha_*)} = \frac{5\sqrt{35}}{7},$$

再代回式 (5.16) 并化简即得所述最大值。□




图 5.3: 平衡六分块模型的目标函数 $F(\alpha)$ 及其二次稳定性带。虚线标出唯一最优比例 α_* ; 阴影区域由定理 5.19 的两个二次界确定。

5.8 定量稳定性与有限阶优化

唯一最优性只说明偏离 α_* 会造成损失。下面的估计进一步给出损失量与比例偏差之间的精确二次阶关系。

定理 5.19 (平衡模型的全局二次稳定性). 对任意 $\alpha \in [0, 1]$, 有

$$\frac{27}{25\sqrt{10}}(\alpha - \alpha_*)^2 \leq F(\alpha_*) - F(\alpha) \leq \frac{50}{27}(\alpha - \alpha_*)^2.$$

特别地, 若 $F(\alpha) \geq F(\alpha_*) - \varepsilon$, 则

$$|\alpha - \alpha_*| \leq \sqrt{\frac{25\sqrt{10}}{27}} \varepsilon.$$

证明. 仍记 $D(\alpha) = -36\alpha^2 + 52\alpha + 9$. 直接求导并约去含 α 的二次项, 得到

$$F''(\alpha) = \frac{2DD'' - (D')^2}{40D^{3/2}} = -\frac{100}{D(\alpha)^{3/2}}.$$

D 在 $[0, 1]$ 上的最小值为 9, 最大值在 $13/18$ 处取得, 等于 $250/9$. 因此

$$\frac{54}{25\sqrt{10}} \leq -F''(\alpha) \leq \frac{100}{27}.$$

利用 $F'(\alpha_*) = 0$, 在 α_* 与 α 之间对二阶导数积分两次, 即可得到两个二次界。最后一个结论由左侧不等式整理而得。□

5.8.1 完整测度单纯形中的解析局部稳定性

前一个定理只扰动核心总测度，同时保持五个外围块相等。下面允许六个块测度同时变化，并在五维切空间上严格计算 Hessian。令

$$\beta_* := \frac{1 - \alpha_*}{5}, \quad d_* = (\alpha_*, \beta_*, \dots, \beta_*) \in \text{int } \Delta_5.$$

定理 5.20 (六分块完整测度空间中的严格局部稳定性). 点 d_* 是 Φ 在五维单纯形 Δ_5 内部的非退化严格局部极大点。更准确地， Φ 限制在切空间

$$\mathcal{T} = \left\{ h \in \mathbb{R}^6 : \sum_{i=0}^5 h_i = 0 \right\}$$

上的 Hessian 具有三个不同特征值

$$\theta_0 = -\frac{14\sqrt{35}}{75}, \quad \text{重数1,} \quad (5.17)$$

$$\theta_1 = -\frac{287}{95} + \frac{-311\sqrt{35} + 455\sqrt{5} + 595\sqrt{7}}{475}, \quad \text{重数2,} \quad (5.18)$$

$$\theta_2 = \frac{287}{95} + \frac{-311\sqrt{35} - 595\sqrt{7} + 455\sqrt{5}}{475}, \quad \text{重数2.} \quad (5.19)$$

三者均严格小于零。因此存在只依赖于该模板的常数 $r_0, c_0 > 0$ ，使得

$$\Phi(d) \leq c_* - c_0 \|d - d_*\|_2^2 \quad (5.20)$$

对所有满足 $d \in \Delta_5$ 且 $\|d - d_*\|_2 < r_0$ 的测度向量成立。

证明. 先说明二阶微分公式。沿直线 $d(t) = d_* + th$ 记 $B(t) = B(d(t))$ 。由式 (5.7) 逐元求导，

$$\dot{B}_{ij}(0) = \frac{B(d_*)_{ij}}{2} \left(\frac{h_i}{d_{*,i}} + \frac{h_j}{d_{*,j}} \right), \quad (5.21)$$

$$\ddot{B}_{ij}(0) = -\frac{B(d_*)_{ij}}{4} \left(\frac{h_i}{d_{*,i}} - \frac{h_j}{d_{*,j}} \right)^2. \quad (5.22)$$

平衡点处，核心-外围全一方向的两个特征值以及四个外围 Fourier 特征值为

$$\lambda_{\pm} = \frac{\alpha_* + 3\beta_* \pm \Delta_*}{2}, \quad \eta_* = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \beta_* \quad (\text{重数2}), \quad \nu_* = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \beta_* \quad (\text{重数2}),$$

其中

$$\Delta_* = \sqrt{(\alpha_* - 3\beta_*)^2 + 20\alpha_*\beta_*} = \frac{\sqrt{35}}{7}. \quad (5.23)$$

这里 $\lambda_+, \eta_* > 0$, 而 $\lambda_-, \nu_* < 0$ 。设 P_+ 为正谱投影, P_λ 为相应不同特征值的谱投影。对与零点分离的正谱簇, 标准二阶谱投影扰动公式 [13, 14] 给出

$$D^2\Phi(d_*)[h, h] = \text{Tr}(P_+\ddot{B}(0)) + 2 \sum_{\substack{\lambda \in \{\lambda_+, \eta_*\} \\ \mu \in \{\lambda_-, \nu_*\}}} \frac{\text{Tr}(P_\mu \dot{B}(0) P_\lambda \dot{B}(0))}{\lambda - \mu}. \quad (5.24)$$

重特征值在这里通过谱投影整体处理, 故不需要人为选定其内部的特征向量。

下面利用五边形的二面体对称性化简该二次型。切空间正交分解为

$$\mathcal{T} = U_0 \oplus U_1 \oplus U_2,$$

其中

$$U_0 = \text{span} \left\{ \left(\sqrt{\frac{5}{6}}, -\frac{1}{\sqrt{30}}, \dots, -\frac{1}{\sqrt{30}} \right) \right\},$$

而 U_k ($k = 1, 2$) 由外围坐标上的第 k 个实 Fourier 正弦、余弦方向张成, 核心坐标为零。Hessian 在五个外围坐标上为实对称循环形式, 因此在每个 U_k 上都是标量。取单位余弦代表元

$$h_0^{(k)} = 0, \quad h_{j+1}^{(k)} = \sqrt{\frac{2}{5}} \cos \frac{2\pi k j}{5} \quad (j = 0, \dots, 4), \quad k = 1, 2,$$

并把它们与 U_0 中所列单位向量分别代入式 (5.21)、(5.22) 和 (5.24), 使用式 (5.23) 化简, 即依次得到式 (5.17) 至 (5.19)。作为独立核对, U_0 方向还满足

$$\theta_0 = \frac{5}{6} F''(\alpha_*),$$

这与定理 5.19 中的闭式二阶导数完全一致。

最后严格验证符号。 $\theta_0 < 0$ 显然。把另两式通分, θ_1 的分子为

$$N_1 = -1435 - 311\sqrt{35} + 455\sqrt{5} + 595\sqrt{7}.$$

利用 $\sqrt{35} > 59/10$ 、 $\sqrt{5} < 9/4$ 和 $\sqrt{7} < 8/3$, 得到

$$N_1 < -\frac{39569}{60} < 0.$$

同理, θ_2 的分子为

$$N_2 = 1435 - 311\sqrt{35} - 595\sqrt{7} + 455\sqrt{5}.$$

再使用 $\sqrt{7} > 21/8$, 得到

$$N_2 < -\frac{37521}{40} < 0.$$

上述根式界均可直接平方核查。故 Hessian 在 $\mathcal{T}$ 上负定。

由于外围对称性, d_* 处的一阶导数在 $U_1 \oplus U_2$ 上为零; 在 U_0 方向上为零则等价于 $F'(\alpha_*) = 0$ 。又 Φ 在单纯形内部光滑, 负定性与 Hessian 的连续性给出一个邻域, 在其中二阶型一致为负。Taylor 公式随即推出式 (5.20)。 $\square$

注 5.21. 定理 5.20 是完整五维测度空间中的解析局部结论, 严格强于只沿平衡直线的定理 5.19。但它不排除远离 d_* 的其它内部驻点, 因而不能改写为非平衡六分块的全局平衡化定理。结合定理 5.13 和命题 5.14 后, 剩余的六分块全局问题被精确归结为: 分类式 (5.13) 的内部解, 并比较它们的目标值。

命题 5.22 (平衡有限图族的离散约化). 设 $n = a + 5b$, 其中 $a, b \geq 1$ 为整数, 则

$$S_3(H_{a,b}) = nF(a/n) - 3.$$

令

$$\mathcal{A}_n = \{a \in \mathbb{Z} : 1 \leq a \leq n - 5, a \equiv n \pmod{5}\}.$$

在所有满足 $a + 5b = n$ 的平衡图 $H_{a,b}$ 中, 最优核心大小只可能是 $\mathcal{A}_n$ 中紧邻 $\alpha_* n$ 左右的两个可行整数之一。

证明. 把 $b = (n - a)/5$ 代入式 (5.2)。根式满足

$$-36a^2 + 52an + 9n^2 = 25((a - 3b)^2 + 20ab),$$

逐项整理即得 $S_3(H_{a,b}) = nF(a/n) - 3$ 。由定理 5.18, F 在 α_* 左侧严格增加、右侧严格减少, 故离散最大值只能在两个相邻可行格点中取得。 $\square$

推论 5.23 (带显式误差的有限阶构造下界). 记

$$c_* := F(\alpha_*) = \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18}.$$

对每个 $n \geq 18$, 存在 n 阶图 G_n 使得

$$S_3(G_n) \geq c_* n - 3 - \frac{625}{54n}.$$

证明. 在同余类 $a \equiv n \pmod{5}$ 中选取最接近 $\alpha_* n$ 的整数 a_n 。当 $n \geq 18$ 时, 该整数满足 $1 \leq a_n \leq n - 5$, 且

$$\left| \frac{a_n}{n} - \alpha_* \right| \leq \frac{5}{2n}.$$

令 $b_n = (n - a_n)/5$ 。由定理 5.19 的右侧不等式和 命题 5.22,

$$\begin{aligned} S_3(H_{a_n, b_n}) &= nF(a_n/n) - 3 \\ &\geq c_* n - 3 - n \cdot \frac{50}{27} \left(\frac{5}{2n} \right)^2 \\ &= c_* n - 3 - \frac{625}{54n}. \end{aligned}$$

取 $G_n = H_{a_n, b_n}$ 即得结论。 $\square$

5.9 对全体有限图问题的渐近下界

推论 5.24 (全局渐近常数的显式下界). 令

$$M_3(n) = \max\{S_3(G) : |V(G)| = n\}.$$

则

$$c_3 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M_3(n)}{n} \geq \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18}.$$

证明. 由推论 5.23, 对所有 $n \geq 18$ 都有

$$\frac{M_3(n)}{n} \geq c_* - \frac{3}{n} - \frac{625}{54n^2}.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 再使用定理 4.3 即得结论。 $\square$

注 5.25. 定理 5.18 只证明了平衡 clique- C_5 六分块模型内部的唯一最优比例; 推论 5.24 只给出全体图问题的下界。要把该常数提升为全局精确值, 还需要一个对任意 graphon 都成立的匹配上界, 或者证明任意极值 graphon 可约化为这一六分块模型。本文没有完成这一步。

第六章 一般上界与特殊图类

6.1 由谱能量得到的基本上界

本章给出不依赖 graphon 结构分类的上界。邻接矩阵 Ky Fan 范数及其与图能量的关系可参见 [7]。首先注意，对任意按非增顺序排列且总和为零的实数列，其前 k 项平均值不小于全体平均值。因此，对 $n \geq 3$ 的简单图总有 $S_3(G) \geq 0$ 。

命题 6.1 (边数型基本上界). 设 G 有 m 条边，则

$$S_3(G) \leq \sqrt{6m}.$$

从而

$$S_3(G) \leq \sqrt{3n(n-1)} < \sqrt{3}n.$$

证明. 由 Cauchy-Schwarz 不等式及 $\text{Tr}(A^2) = 2m$,

$$S_3(G)^2 \leq 3 \sum_{i=1}^3 \lambda_i(G)^2 \leq 3 \sum_{i=1}^n \lambda_i(G)^2 = 6m.$$

再使用 $m \leq \binom{n}{2}$ 即得第二个结论。□

该估计没有使用谱半径与边密度之间的关系。把平均度下界加入论证后，可得到明显更强的线性常数。

6.2 密度优化后的一般图上界

引理 6.2 (三项谱和的单变量约化). 设 G 有 n 个顶点、 m 条边，谱半径为 λ_1 。则

$$S_3(G) \leq \lambda_1 + \sqrt{2(2m - \lambda_1^2)}.$$

证明. 由 Cauchy-Schwarz,

$$\lambda_2 + \lambda_3 \leq \sqrt{2(\lambda_2^2 + \lambda_3^2)} \leq \sqrt{2(2m - \lambda_1^2)}.$$

即得结论。若 $\lambda_2 + \lambda_3 < 0$ ，第一个不等式仍然成立。□

定理 6.3 (一般图的改进线性上界). 对任意 n 阶简单图 G ,

$$S_3(G) \leq \frac{1 + \sqrt{3}}{2} n.$$

证明. 空图情形显然。令

$$x = \frac{2m}{n^2} \in (0, 1), \quad y = \frac{\lambda_1}{n}.$$

以全一向量代入 Rayleigh 商得到 $y \geq x$, 而谱能量给出 $y \leq \sqrt{x}$ 。由引理 6.2,

$$\frac{S_3(G)}{n} \leq y + \sqrt{2(x - y^2)}. \quad (6.1)$$

若 $0 < x \leq 1/3$, 直接使用命题 6.1 得

$$\frac{S_3(G)}{n} \leq \sqrt{3x} \leq 1.$$

若 $x \geq 1/3$, 函数

$$g_x(y) = y + \sqrt{2(x - y^2)}$$

在 $y \geq \sqrt{x/3}$ 上单调不减。由于 $y \geq x \geq \sqrt{x/3}$, 由式 (6.1) 得

$$\frac{S_3(G)}{n} \leq x + \sqrt{2x(1 - x)} =: h(x).$$

在 $[1/3, 1]$ 上求导可知, h 在

$$x_* = \frac{3 + \sqrt{3}}{6}$$

处达到最大值, 并且

$$h(x_*) = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}.$$

合并两种密度范围即得结论。 □

推论 6.4 (当前上下界区间). 设 $M_3(n) = \max_{|V(G)|=n} S_3(G)$ 。则

$$\frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18} \leq \mathfrak{c}_3 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M_3(n)}{n} \leq \frac{1 + \sqrt{3}}{2}.$$

数值上, 当前严格区间为

$$1.2815681969 \leq \mathfrak{c}_3 \leq 1.3660254038.$$

注 6.5. 定理 6.3 只使用总谱能量、平均度和三项 Cauchy–Schwarz 不等式, 因而不大可能直接刻画等号结构。它的作用是提供一个与第五章构造相距约 $0.08446n$ 的全局上界, 为后续精细结构分析限定范围。

6.3 二部图的奇异值表示

设 G 为二部图，二部划分大小为 p, q ，双邻接矩阵为 $X \in \{0, 1\}^{p \times q}$ 。则

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & X \\ X^\top & 0 \end{pmatrix}.$$

若 X 的非零奇异值为 $s_1 \geq \dots \geq s_r > 0$ ，则 $A(G)$ 的非零谱为

$$s_1, \dots, s_r, -s_r, \dots, -s_1.$$

所以，补零后有

$$S_3(G) = s_1 + s_2 + s_3.$$

这一对应也是二部图谱和与矩阵奇异值方法的基本连接；相关一般结果可参见 [12]。

命题 6.6 (二部图的边数型上界). 若二部图 G 有 m 条边，则

$$S_3(G) \leq \sqrt{3m}.$$

证明. 因为 $\sum_i s_i^2 = \|X\|_F^2 = m$ ，所以

$$(s_1 + s_2 + s_3)^2 \leq 3(s_1^2 + s_2^2 + s_3^2) \leq 3m.$$

□

仅结合 $m \leq pq \leq n^2/4$ 会给出 $S_3(G) \leq \sqrt{3n}/2$ 。利用最大奇异值的密度下界，可以再次改进常数。

定理 6.7 (二部图的改进线性上界). 对任意 n 阶二部图 G ，

$$S_3(G) \leq \frac{1 + \sqrt{3}}{4} n.$$

证明. 若 $m = 0$ 则结论显然。令 $N = \sqrt{pq}$ ， $x = m/(pq) \in (0, 1]$ ，以及 $y = s_1/N$ 。以两个部中的归一化全一向量代入 X 的最大奇异值变分式，得到

$$s_1 \geq \frac{m}{\sqrt{pq}} = xN,$$

即 $y \geq x$ 。又由 $\sum s_i^2 = m = xN^2$ ，

$$\frac{S_3(G)}{N} \leq y + \sqrt{2(x - y^2)}.$$

完全重复定理 6.3 中的单变量优化，得到

$$S_3(G) \leq \frac{1 + \sqrt{3}}{2} \sqrt{pq}.$$

最后使用 $\sqrt{pq} \leq (p + q)/2 = n/2$ 即得结论。

□

例 6.8 (二部图下界). 偶圈 C_6 的邻接谱为

$$2, 1, 1, -1, -1, -2,$$

故 $S_3(C_6) = 4 = 2|V(C_6)|/3$ 。进一步, 把 C_6 的每个顶点替换为大小为 t 的独立集, 并把原来的每条边替换为完全二部图。所得平衡独立块 blow-up 的非零谱是 C_6 的非零谱乘以 t , 所以

$$S_3(C_6[\overline{K}_t]) = 4t = \frac{2}{3}|V(C_6[\overline{K}_t])|.$$

令

$$M_3^{\text{bip}}(n) = \max\{S_3(G) : |V(G)| = n, G \text{ 为二部图}\},$$

并记

$$c_{\text{bip}}^- = \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{M_3^{\text{bip}}(n)}{n}, \quad c_{\text{bip}}^+ = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{M_3^{\text{bip}}(n)}{n}.$$

对任意 n , 取 $t = \lfloor n/6 \rfloor$, 在 $C_6[\overline{K}_t]$ 上补 $n - 6t$ 个孤立点, 前三大特征值不变。因此

$$\frac{2}{3} \leq c_{\text{bip}}^- \leq c_{\text{bip}}^+ \leq \frac{1 + \sqrt{3}}{4} \approx 0.6830127019.$$

这里不预先假设二部图极值比值的极限存在。上述很窄的上下极限区间提示该问题适合进一步做精确结构分析。

6.4 本章结果的作用与局限

一般图上界没有利用第四章的符号结构, 因此尚不能与第五章的六分块下界匹配。二部图上界则把问题转化为 0-1 矩阵前三个奇异值之和的极值问题。下一步若能结合行列和、秩三近似或矩阵能量的等号条件, 可能将二部图常数进一步压到 $2/3$, 并判断 C_6 的平衡独立块 blow-up 是否为渐近极值构造。这构成一个独立而与主线相连的后续方向。

第七章 谱和的扰动估计与有限阶稳定性

第五章给出了受限图族内的精确优化，第六章给出了不依赖结构分类的一般上界。本章从另一个角度连接这两类结果：研究邻接矩阵、graphon 核或有限阶参数发生小扰动时，前 k 大谱和能够改变多少。这里得到的结论控制的是目标函数值，并不自动给出近极值图的结构分类；二者的区别将在本章最后说明。

7.1 有限维 Ky Fan 谱和的扰动界

对 $n \times n$ 实对称矩阵 A ，记

$$\Phi_k(A) = \sum_{i=1}^k \lambda_i(A), \quad 1 \leq k \leq n.$$

定理 7.1 (Ky Fan 谱和的 Lipschitz 估计). 对任意两个 $n \times n$ 实对称矩阵 A, B ，有

$$|\Phi_k(A) - \Phi_k(B)| \leq \min\{k\|A - B\|_{\text{op}}, \sqrt{k}\|A - B\|_F\}.$$

证明. 令 P_A 为 A 的前 k 个特征向量张成的正交投影。由 Ky Fan 原理，

$$\begin{aligned} \Phi_k(A) - \Phi_k(B) &\leq \text{Tr}(AP_A) - \text{Tr}(BP_A) \\ &= \text{Tr}((A - B)P_A). \end{aligned}$$

由于 P_A 的迹范数为 k 、Frobenius 范数为 $\sqrt{k}$ ，Hölder 不等式与 Frobenius 内积的 Cauchy-Schwarz 不等式分别给出

$$|\text{Tr}((A - B)P_A)| \leq k\|A - B\|_{\text{op}}$$

和

$$|\text{Tr}((A - B)P_A)| \leq \sqrt{k}\|A - B\|_F.$$

交换 A, B 后得到反向不等式，合并即得结论。该证明也是矩阵 Ky Fan 范数扰动理论的标准形式 [2, 3, 14]。□

7.2 图编辑距离下的谱和稳定性

对同一顶点集上的两个简单图 G, H ，定义边编辑距离

$$d_E(G, H) = |E(G) \triangle E(H)|,$$

其中 $\triangle$ 表示对称差。

推论 7.2 (边编辑距离控制前三大谱和). 若 G, H 是同一 n 顶点集上的简单图，则

$$|S_3(G) - S_3(H)| \leq \sqrt{6d_E(G, H)}.$$

更一般地，

$$|S_k(G) - S_k(H)| \leq \sqrt{2k d_E(G, H)}.$$

证明. 令 $D = A(G) - A(H)$ 。每条属于边集对称差的边在 D 中产生两个绝对值为 1 的非零元素，因此

$$\|D\|_F^2 = 2d_E(G, H).$$

将定理 7.1 的 Frobenius 范数估计应用于两个邻接矩阵即可。取 $k = 3$ 得到第一式。 $\square$

若 $d_E(G, H) \leq \varepsilon n^2$ ，则

$$\left| \frac{S_3(G)}{n} - \frac{S_3(H)}{n} \right| \leq \sqrt{6\varepsilon}. \quad (7.1)$$

因此，改变 $o(n^2)$ 条边不会改变归一化谱和的极限。需要注意的是，该估计在 ε 上只有平方根阶；它适合证明构造值的鲁棒性，却不能单独刻画等号或近等号图的具体分块结构。

7.3 Graphon 谱和的 L^2 连续性

有限维扰动界在 Hilbert–Schmidt 算子上有完全平行的形式，而且不要求 Ky Fan 上确界预先达到。

定理 7.3 (Hilbert–Schmidt 扰动下的 Ky Fan 连续性). 设 T, S 是同一 Hilbert 空间上的紧自伴 Hilbert–Schmidt 算子。则

$$|\sigma_k(T) - \sigma_k(S)| \leq \sqrt{k} \|T - S\|_{\text{HS}}.$$

特别地，对任意两个 graphon W, U ，

$$|\sigma_k(W) - \sigma_k(U)| \leq \sqrt{k} \|W - U\|_2.$$

证明. 由第二章的变分定义,

$$\begin{aligned}\sigma_k(T) - \sigma_k(S) &\leq \sup_{P=P^*=P^2, \text{rank } P=k} \text{Tr}((T-S)P) \\ &\leq \|T-S\|_{\text{HS}} \sup_{\text{rank } P=k} \|P\|_{\text{HS}} \\ &= \sqrt{k} \|T-S\|_{\text{HS}}.\end{aligned}$$

交换 T, S 即得绝对值估计. 对积分算子, Hilbert–Schmidt 范数恰等于核的 L^2 范数, 故得到 graphon 形式. $\square$

若 G, H 在同一 n 顶点集上, 则

$$\|W_G - W_H\|_2^2 = \frac{2d_E(G, H)}{n^2}.$$

把这一恒等式代入定理 7.3, 就会重新得到 式 (7.1). 这说明矩阵编辑距离估计与 graphon L^2 连续性是同一个 Hilbert–Schmidt 原理在离散和连续语言中的两种表达。

7.4 平衡构造的双边有限阶展开

记

$$B_n = \max\{S_3(H_{a,b}) : a + 5b = n, a, b \geq 1\},$$

并仍记

$$c_* = \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18}.$$

定理 7.4 (平衡图族的显式双边估计). 对每个 $n \geq 18$, 有

$$c_*n - 3 - \frac{625}{54n} \leq B_n \leq c_*n - 3.$$

因此

$$B_n = c_*n - 3 + O(n^{-1}), \quad \frac{B_n}{n} = c_* - \frac{3}{n} + O(n^{-2}),$$

并且

$$n \left(c_* - \frac{B_n}{n} \right) \rightarrow 3.$$

证明. 下界正是推论 5.23. 另一方面, 对每个可行的 a , 命题 5.22 和定理 5.18 给出

$$S_3(H_{a, (n-a)/5}) = nF(a/n) - 3 \leq nc_* - 3.$$

对所有可行 a 取最大值即得上界. 其余三个结论由双边不等式直接整理得到. $\square$

若 $a_n + 5b_n = n$ 达到 B_n , 令 $\delta_n = a_n/n - \alpha_*$ 。结合 定理 5.19 和命题 5.22 还可得到

$$\frac{27}{25\sqrt{10}} n \delta_n^2 \leq c_* n - 3 - B_n \leq \frac{625}{54n}. \quad (7.2)$$

该式把有限阶目标值的误差与核心比例的偏离直接联系起来。特别地, 任何达到平衡族最优值的核心比例都满足 $\delta_n = O(n^{-1})$, 这与第五章“只需比较 $\alpha_* n$ 两侧相邻可行整数”的离散约化一致。

7.5 典型图族的谱和比较

下表汇总若干能够显式计算的图族。它们提供了理解六分块构造的基准, 而不是全体图极值问题的候选分类。

表 7.1: 典型图族的前三大邻接特征值和

图族	S_3	归一化渐近值
完全图 K_n	$n - 3$	1
$K_a \cup K_b \cup K_c, a, b, c \geq 1$	$n - 3$	1
完全二部图 $K_{p,q}, p + q \geq 4$	$\sqrt{pq}$	至多 $1/2$
$C_6[\overline{K}_t], n = 6t$	$4t$	$2/3$
最优平衡 $H_{a,b}$	B_n	$c_* \approx 1.281568$

这些公式可由各图族的标准谱直接验证。 K_n 只有一个大的正谱方向, 另外两个进入 S_3 的特征值均为 -1 ; 三个不交完全图虽然提供三个非负方向, 却没有跨块连接带来的 Perron 增益。clique- C_5 模型同时利用完全核心产生的主特征值和五边形 Fourier 分解产生的二重正特征值, 因而能够突破归一化值 1。

7.6 数值稳定不等于结构稳定

推论 7.2 给出了“小编辑距离推出小谱和变化”的单向命题, 其逆命题一般不成立。

命题 7.5 (相同谱和不能控制编辑距离). 当 $3 \mid n$ 时, 令

$$G = K_n, \quad H = K_{n/3} \cup K_{n/3} \cup K_{n/3}.$$

则

$$S_3(G) = S_3(H) = n - 3,$$

但

$$d_E(G, H) = \frac{n^2}{3}.$$

证明. K_n 的谱为 $n-1, -1, \dots, -1$, 故 $S_3(G) = n-3$ 。图 H 的三个最大特征值均为 $n/3-1$, 其和同样为 $n-3$ 。从 G 变为 H 需要删除三个顶点块之间的全部边, 因此

$$d_E(G, H) = \binom{n}{2} - 3\binom{n/3}{2} = \frac{n^2}{3}.$$

□

这个例子说明, 仅凭目标值接近无法推出图在编辑距离或 cut 距离下接近某个模板。第八章提出的六分块稳定性猜想若要成立, 必须额外利用全局极值常数、近等号条件以及第四章的灵敏度符号结构, 而不能只依赖本章的 Lipschitz 估计。

7.7 本章小结

本章建立了从矩阵 Frobenius 扰动、图编辑距离到 graphon L^2 扰动的一组统一谱和估计, 并把第五章有限阶构造加强为带首项修正 -3 的双边展开。扰动界保证目标值对小修改具有鲁棒性; 最后的反例则表明, 结构稳定性是严格更强的问题。

第八章 计算实验、结构猜想与后续问题

8.1 计算目标与范围

本章的非平衡枚举只针对

$$H(a; b_1, \dots, b_5) = K_a \vee C_5[K_{b_1}, \dots, K_{b_5}]$$

这一受限图族，不是对同阶全部简单图的穷举。由 命题 5.1，每个候选只需计算一个 6×6 实对称商矩阵的特征值。代码位于

`computation/enumerate_c5_blowups.py`。

程序使用正整数的有序组合作为外围块大小，按 C_5 的二面体群对输出代表元去重，并记录以下数据：搜索的有序组成数量、最大 S_3 、归一化值、达到最优值的二面体等价类、块大小极差以及第一个代表元的边数。

当前默认枚举参数为

$$a \in \{1, 2, 3, 5, 10\}, \quad 5 \leq b_1 + \dots + b_5 \leq 20.$$

总计计算 80 组参数、77,520 个有序组成。特征值由对称矩阵的 `eigvalsh` 计算，比较容差为 10^{-10} 。程序首先执行关键样例断言；若断言失败，就不会生成结果文件。

8.2 小阶候选的独立复核

表中的 $n = 8$ 构造要求大小为 2 的外围块内部有边，因此这两个顶点是 adjacent twins，而不是 non-adjacent twins。 $n = 9$ 的两个大小为 2 的块在 C_5 上相邻。

表 8.1: 若干小阶构造的谱数据

n	边数	图或块大小	前三大特征值	S_3
5	5	C_5	2, 0.618034, 0.618034	3.236068
6	10	$K_1 \vee C_5$	3.449490, 0.618034, 0.618034	4.685558
7	16	$K_2 \vee C_5$	4.701562, 0.618034, 0.618034	5.937630
8	21	$H(2; 2, 1, 1, 1, 1)$	5.426907, 1.117698, 0.618034	7.162639
9	27	$H(2; 2, 2, 1, 1, 1)$	6.217530, 1.208499, 1	8.426029

8.3 九阶候选构造的完整邻接表

取核心 $C = \{1, 2\}$, 外围块

$$B_1 = \{3, 4\}, \quad B_2 = \{5, 6\}, \quad B_3 = \{7\}, \quad B_4 = \{8\}, \quad B_5 = \{9\}.$$

核心为完全图并与外围完全连接; B_i 内部为完全图; 相邻外围块完全连接。完整邻接表如下:

$$N(1) = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\},$$

$$N(2) = \{1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\},$$

$$N(3) = \{1, 2, 4, 5, 6, 9\},$$

$$N(4) = \{1, 2, 3, 5, 6, 9\},$$

$$N(5) = \{1, 2, 3, 4, 6, 7\},$$

$$N(6) = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\},$$

$$N(7) = \{1, 2, 5, 6, 8\},$$

$$N(8) = \{1, 2, 7, 9\},$$

$$N(9) = \{1, 2, 3, 4, 8\}.$$

该图有 27 条边, 且

$$S_3(G) = 8.4260294336 \dots$$

这一邻接表给出了一个可直接复核的九阶候选。由于这里没有提供九阶全部简单图的枚举证书, 不能据此断言该 27 边图达到全局最大值, 也不能断言它在同构意义下唯一。

8.4 非平衡外围块的搜索结果

表8.2 列出部分结果。代表元按二面体对称取字典序最小者。

表 8.2: 受限图族中非平衡外围块的部分最优结果

a	$\sum b_i$	n	最大 S_3	一个最优代表元
2	5	7	5.937630	(1, 1, 1, 1, 1)
2	6	8	7.162639	(1, 1, 1, 1, 2)
2	7	9	8.426029	(1, 1, 1, 2, 2)
2	8	10	9.716600	(1, 1, 2, 2, 2)
2	9	11	11.018833	(1, 2, 2, 2, 2)
2	10	12	12.371115	(2, 2, 2, 2, 2)
10	12	22	24.342190	(2, 2, 3, 2, 3)
10	13	23	25.698596	(2, 3, 2, 3, 3)

在全部默认搜索范围中，每个最优代表元都满足

$$\max_i b_i - \min_i b_i \leq 1.$$

但是，多出的顶点应如何分布在五边形上会随核心大小变化。例如， $a = 2$ 、外围总大小为 7 时，两个较大块相邻；而 $a = 10$ 、外围总大小为 12 时，程序给出的两个较大块并不相邻。因此现阶段可以提出块大小平衡猜想，却没有证据支持一个与 a 无关的余数排列规则。

猜想 8.1 (受限图族的块大小平衡性). 固定 $a \geq 1$ 和外围顶点总数 $m \geq 5$ 。在所有正整数五元组 $(b_1, \dots, b_5)$ 中，若 $H(a; b_1, \dots, b_5)$ 使 S_3 最大，则至少存在一个最优五元组满足

$$\max_i b_i - \min_i b_i \leq 1.$$

更强的猜想是每个最优五元组都满足这一性质。

证明该猜想不能只比较边数，因为移动一个顶点会同时改变商矩阵的多个对角元和非对角元。第五章已经取得两个与此相关、但不能替代该猜想的严格进展：定理 5.13 排除了连续测度单纯形上的全部边界极大点，定理 5.20 证明平衡测度是完整五维空间中的非退化严格局部极大点。剩余困难是全局的：需要分类式 (5.13) 的内部解，或者构造把两个相差至少 2 的离散块拉平且不降低前三大谱和的变换。现有局部 Hessian 不能控制远离平衡点的路径。

8.5 数值稳定性与随机搜索证据

为便于独立复核，文件 `computation/generate_figures_and_evidence.py` 固定随机种子 20260831，并执行三类检查。首先，对 $18 \leq n \leq 300$ 的每个阶数在可行同余类中直接选取最优核心大小，验证显式有限阶下界；其次，在五维块测度单纯形上用中心差分计算 α_* 处 Hessian；最后，对六个块测度进行 600,000 次 $\text{Dirichlet}(1, \dots, 1)$ 随机抽样。

需要强调的是，第五章的定理 5.20 已经给出了 d_* 在完整五维测度单纯形中的解析负定 Hessian。由式 (5.17) 至 (5.19)，三个不同特征值的近似值为

$$\theta_0 \approx -1.1043349, \quad \theta_1 \approx -1.4384586, \quad \theta_2 \approx -2.0246567,$$

重数分别为 1, 2, 2，且均严格为负。下表和随机搜索只用于复核该解析结论及检查实现，不再承担证明局部极大性的逻辑作用。




图 8.1: 平衡构造的有限阶收敛证据。左图给出最优平衡族比值 $S_3(H_{a,b})/n$ 向 c_* 的趋近；右图给出缩放误差 $n(c_* - S_3/n)$ 以及推论 5.23 的显式包络。

在三种中心差分步长下，Hessian 的五个特征值如下。三组特征值均为负，且前

表 8.3: 不同差分步长下的 Hessian 特征值

h	Hessian 特征值 (按非减次序排列)				
10^{-3}	-2.0246739	-2.0246701	-1.4384746	-1.4384683	-1.1043287
10^{-4}	-2.0246568	-2.0246568	-1.4384588	-1.4384587	-1.1043348
10^{-5}	-2.0246561	-2.0246531	-1.4384593	-1.4384557	-1.1043299

两组在显示精度内稳定； $h = 10^{-5}$ 时已可观察到双精度舍入误差。该结果与第五章的

解析 Hessian 一致。随机搜索得到的最大谱和为 1.2813541054, 与 $c_* = 1.2815681969$ 的差为 2.14×10^{-4} 。完整数值输出保存在 `computation/numerical_evidence.txt`。

同一脚本还对 $4 \leq r \leq 12$ 的平衡核心-环外围模型作网格步长 5×10^{-6} 的独立扫描, 并生成图 5.2。扫描结果在 $r = 5$ 处取得唯一最大值; 这只是对 定理 5.7 闭式计算的数值复核, 环长度定理本身不依赖该有限网格实验。

这些结果只提供数值证据: 中心差分误差、有限样本随机搜索以及受限模型本身都不能推出所有 graphon 的全局最优性。论文中的全局结论仍以定理、命题和推论中明确给出的证明为准。

8.6 结论层级与逻辑边界

为避免把模型内结论外推到全体图, 下表集中列出主线中最容易混淆的层级。

表 8.4: 主要结论的证明层级与未覆盖范围

论题	正文已经建立的结论	不能据此推出的结论
全局常数的存在性	$M_3(n)/n$ 收敛, 极限等于 graphon 变分最大值	该最大值等于 c_*
平衡核心-环模型	C_5 在全部平衡环长度中唯一最优, 且核心比例唯一	任意极值 graphon 必须具有环外围
连续六分块模型	迹范数表示、边界排除、内部 KKT 方程及 d_* 的五维局部稳定性	所有内部 KKT 解都与 d_* 等价, 或 d_* 是六分块全局唯一极大点
一般 graphon	全局极大元存在并满足灵敏度核的符号必要条件	符号条件足以分类极大元, 或六分块模板全局最优
近极值结构	小 L^2 扰动导致小谱和变化	谱和接近自动蕴含 cut 距离下接近六分块模板
计算搜索	给定范围内的枚举结果和固定种子的随机样本可复现	对全部有限图、全部测度或全部 graphon 的穷尽证明

8.7 全局六分块猜想

第五章证明了平衡 clique- C_5 模型内部的精确最优值、六分块测度边界排除以及平衡点的完整五维局部稳定性，第四章给出了全局极值 graphon 必须满足的符号结构。计算搜索没有发现优于该六分块构造的少块候选，但这些事实仍然不能替代全局上界，也不能证明所有内部驻点都与平衡点等价。

猜想 8.2 (全局渐近常数的精确值). 有

$$c_3 = \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18}.$$

猜想 8.3 (六分块稳定性). 若图序列 G_n 满足

$$\frac{S_3(G_n)}{|V(G_n)|} \rightarrow \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18},$$

并且该常数确为全局极值，则在适当重标号后， W_{G_n} 应在 cut 距离下趋近于核心比例为 α_* 的 clique- C_5 六分块 graphon。

第四章已经证明定义 c_3 的有限图极限存在；第一个猜想现在只涉及这个常数的精确取值。第二个猜想比第一个强得多：即使先证明匹配上界，也还需要处理极值 graphon 的唯一性和近等号序列的结构稳定性。第五章的定理 5.20 只控制固定六分块模板中的小测度扰动；它既不是 cut 距离下的 graphon 稳定性，也不蕴含猜想 8.3。

8.8 后续研究问题

根据目前的严格结果，后续研究可沿以下方向展开。

1. 尝试加强定理 6.3。当前上界与构造下界之间的归一化差约为 0.08446；应把迹为零、0-1 邻接约束和第四章的灵敏度符号条件加入能量优化。
2. 分类式 (5.13) 的内部解。边界排除和局部负定性已经完成；若能证明所有全局候选都与 d_* 二面体等价，即可闭合连续六分块的全局平衡化。离散版本则对应猜想 8.1。
3. 单独研究二部图。第六章已经把常数压在 $[2/3, (1 + \sqrt{3})/4]$ 内，适合进一步寻找等号和稳定性。
4. 在建立谱隙、不可约性和二级极值选择后，研究第四章椭球驻点关系能否从形式变分提升为严格定理。

8.9 本章小结

计算的主要作用是复核闭式公式、整理小阶谱数据并形成可证猜想，而不是替代证明。严格结果已经把连续六分块问题从整个闭单纯形缩小到内部 KKT 解的分类，并解析证明了平衡点的局部二次稳定性；“所有内部解都平衡”仍未证明。更大的理论缺口是六分块构造下界与一般 graphon 上界之间仍有常数差距。由此，论文形成的叙事链为：精确谱对应、变分必要条件、受限图族精确优化、边界排除与局部稳定性、一般上界、可复现实验和明确的开放问题。

参考文献

- [1] K. Fan. On a theorem of Weyl concerning eigenvalues of linear transformations I. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 35 (1949), 652–655.
- [2] R. Bhatia. *Matrix Analysis*. Graduate Texts in Mathematics 169, Springer, New York, 1997.
- [3] R. A. Horn and C. R. Johnson. *Matrix Analysis*, second edition. Cambridge University Press, Cambridge, 2012.
- [4] J. Ebrahimi B., B. Mohar, V. Nikiforov, and A. S. Ahmady. On the sum of two largest eigenvalues of a symmetric matrix. *Linear Algebra and its Applications*, 429 (2008), 2781–2787.
- [5] B. Mohar. On the sum of k largest eigenvalues of graphs and symmetric matrices. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 99 (2009), 306–313.
- [6] A. E. Brouwer and W. H. Haemers. *Spectra of Graphs*. Universitext, Springer, New York, 2012.
- [7] V. Nikiforov. Beyond graph energy: Norms of graphs and matrices. *Linear Algebra and its Applications*, 506 (2016), 82–138.
- [8] L. Lovász and B. Szegedy. Limits of dense graph sequences. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 96 (2006), 933–957.
- [9] C. Borgs, J. Chayes, L. Lovász, V. T. Sós, and K. Vesztegombi. Convergent sequences of dense graphs I: Subgraph frequencies, metric properties and testing. *Advances in Mathematics*, 219 (2008), 1801–1851.
- [10] L. Lovász. *Large Networks and Graph Limits*. American Mathematical Society, Providence, 2012.

- [11] L. Liu. Graph limits and spectral extremal problems for graphs. *SIAM Journal on Discrete Mathematics*, 38 (2024), 590–608.
- [12] K. C. Das, S. A. Mojallal, and S. Sun. On the sum of the k largest eigenvalues of graphs and maximal energy of bipartite graphs. *Linear Algebra and its Applications*, 569 (2019), 175–194.
- [13] T. Kato. *Perturbation Theory for Linear Operators*, second edition. Springer, Berlin, 1976.
- [14] G. W. Stewart and J.-G. Sun. *Matrix Perturbation Theory*. Academic Press, Boston, 1990.
- [15] H. Kumar, L. Liu, H. Monderde, S. Pragada, and M. Tait. Maximum spectral sum of graphs. arXiv:2604.00512, 2026.
- [16] J. Huang and W. Wei. The exact maximum of the spectral sum of graphs. arXiv:2607.23081, 2026.