

# Números Inteiros (Notas de Aula)

Julio Cesar Moraes Pezzott

Departamento de Matemática, UEM,

E-mail: jcmpezzott2@uem.br

O texto que se encaminha é baseado nos livros citados abaixo e para uma melhor compreensão do assunto, recomendamos o estudo destes:

- H. H. Domingues. *Fundamentos de aritmética*. Florianópolis: Editora da UFSC, 2009.
- C. P. Milies e S. P. Coelho. *Números. Uma introdução à matemática*. 3ª ed. São Paulo: Edusp, 2003.

## 1 Fundamentação axiomática

Iremos denotar o conjunto dos números inteiros por  $\mathbb{Z}$ :

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}.$$

Em  $\mathbb{Z}$ , estão definidas duas operações: a *adição* “+” e a *multiplicação* “.”. O primeiro grupo de axiomas colocados aqui destaca propriedades de tais operações:

(Ax.1) (Associatividade da adição): Para quaisquer números inteiros  $a, b, c$ , temos que  $a + (b + c) = (a + b) + c$ .

(Ax.2) (Elemento neutro da adição): Existe um único elemento em  $\mathbb{Z}$ , o qual é denotado por 0 e chamado de *zero* ou *elemento neutro da adição*, tal que  $a + 0 = a$ , para todo  $a \in \mathbb{Z}$ .

(Ax.3) (Existência do Oposto): Para cada  $a \in \mathbb{Z}$ , existe um único elemento em  $\mathbb{Z}$ , o qual é denotado por  $-a$  e chamado de *oposto* de  $a$ , tal que  $a + (-a) = 0$ .

(Ax.4) (Comutatividade da adição): Para quaisquer números inteiros  $a$  e  $b$ , temos que  $a + b = b + a$ .

(Ax.5) (Associatividade da multiplicação): Para quaisquer números inteiros  $a, b, c$ , temos que  $a(bc) = (ab)c$ .

(Ax.6) (Elemento neutro da multiplicação): Existe um único elemento em  $\mathbb{Z}$ , o qual é diferente de 0 e denotado por 1, tal que  $1 \cdot a = a$ , para todo  $a \in \mathbb{Z}$ . Tal elemento é chamado de *elemento neutro da multiplicação*.

(Ax.7) (Lei do cancelamento para a multiplicação): Para

quaisquer números inteiros  $a, b$  e  $c$  tais que  $a \neq 0$ , temos que: se  $ab = ac$ , então  $b = c$ .

(Ax.8) (Comutatividade da multiplicação): Para quaisquer números inteiros  $a$  e  $b$ , temos que  $ab = ba$ .

(Ax.9) (Distributividade) Para quaisquer números inteiros  $a, b$  e  $c$ , temos que  $a(b + c) = ab + ac$ .

Utilizando tais axiomas, podemos provar alguns fatos.

**Proposição 1.1.** (Lei do cancelamento para a adição): Para quaisquer números inteiros  $a, b$  e  $c$  temos que: se  $a + b = a + c$ , então  $b = c$

*Demonstração.* Por hipótese,  $a + b = a + c$ . Somamos o oposto de  $a$  em ambos os lados dessa igualdade; desse modo,  $(-a) + (a + b) = (-a) + (a + c)$ . Usando o Axioma (Ax.1), obtemos  $[(-a) + a] + b = [(-a) + a] + c$ , ou seja,  $0 + b = 0 + c$ , o que nos permite concluir que  $b = c$ .  $\square$

**Proposição 1.2.** Para todo  $a \in \mathbb{Z}$ , temos que  $a \cdot 0 = 0$ .

*Demonstração.* Pelo Axioma (Ax.9), temos

$$a \cdot 0 + a \cdot 0 = a(0 + 0) = a \cdot 0 = a \cdot 0 + 0,$$

ou seja,  $a \cdot 0 + a \cdot 0 = a \cdot 0 + 0$ . Segue da Proposição 1.1 que  $a \cdot 0 = 0$ .  $\square$

**Proposição 1.3.** Se  $a, b \in \mathbb{Z}$  são tais que  $ab = 0$ , então  $a = 0$  ou  $b = 0$ .

*Demonstração.* Como  $ab = 0$ , podemos escrever, por conta da Proposição 1.2,  $ab = a0$ . Se  $a = 0$ , temos o resultado. Se  $a \neq 0$ , então, como  $ab = a0$ , segue do Axioma (Ax.7) que  $b = 0$ .  $\square$

**Proposição 1.4.** (Regra dos Sinais): Dados inteiros  $a$  e  $b$ , são verdadeiras as seguintes afirmações:

(i)  $-(-a) = a$

(ii)  $(-a)b = -(ab) = a(-b)$

(iii)  $(-a)(-b) = ab$

Em  $\mathbb{Z}$ , também supomos que seja conhecida a relação “*menor que ou igual*”, denotada por “ $\leq$ ”. Os axiomas apresentados na sequência abordam tal relação.

(Ax.10) (Propriedade Reflexiva): Para qualquer número inteiro  $a$ , temos que  $a \leq a$ .

(Ax.11) (Propriedade Antissimétrica): Para quaisquer números inteiros  $a$  e  $b$ , temos que se  $a \leq b$  e  $b \leq a$ , então  $a = b$ .

(Ax.12) (Propriedade Transitiva) Para quaisquer números inteiros  $a, b$  e  $c$ , temos que se  $a \leq b$  e  $b \leq c$ , então  $a \leq c$ .

Quando  $a \leq b$  e  $a \neq b$ , escreveremos  $a < b$  e diremos que  $a$  é *menor que*  $b$ . Além disso, quando conveniente, escreveremos  $b \geq a$  no lugar que  $a \leq b$  e diremos que  $b$  é *maior que ou igual a*  $a$ . De modo análogo, podemos escrever  $b > a$  no lugar de  $a < b$  e dizer que  $b$  é *maior que*  $a$ .

(Ax.13) (Tricotomia) Para quaisquer números inteiros  $a$  e  $b$ , temos que ou  $a < b$  ou  $a = b$  ou  $b < a$

Diante dos axiomas (Ax.10), (Ax.11), (Ax.12) e (Ax.13), vemos que a relação  $\leq$  é uma *relação de ordem total*.

Aqui, vamos fixar as seguintes notações:

- $\mathbb{Z}_+ = \{x \in \mathbb{Z} : x > 0\}$  é o conjunto dos *números inteiros positivos*.
- $\mathbb{Z}_- = \{x \in \mathbb{Z} : x < 0\}$  é o conjunto dos *números inteiros negativos*.

Os próximos dois axiomas vinculam a relação de ordem  $\leq$  com as operações de adição e multiplicação em  $\mathbb{Z}$ .

(Ax.14) Para quaisquer números inteiros  $a, b$  e  $c$ , temos que se  $a \leq b$ , então  $a + c \leq b + c$ .

(Ax.15) Para quaisquer números inteiros  $a, b$  e  $c$ , temos que se  $a \leq b$  e  $0 \leq c$ , então  $ac \leq bc$ .

**Proposição 1.5.** *Dado  $a \in \mathbb{Z}$ , vale que:*

- se  $a \leq 0$ , então  $-a \geq 0$ ;*
- se  $a \geq 0$ , então  $-a \leq 0$ ;*
- $a^2 \geq 0$ ;*
- $1 > 0$ .*

*Demonstração.* (i) Se  $a \leq 0$ , então segue do Axioma (Ax.14) que  $a + (-a) \leq 0 + (-a)$ . Como  $a + (-a) = 0$  e  $0 + (-a) = -a$ , obtemos  $0 \leq -a$ .

(ii) Exercício!

(iii) Aqui, vamos dividir em dois casos:

Caso 1:  $a \geq 0$ . Se  $a \geq 0$ , segue do Axioma (Ax.15) que

$$a^2 = a \cdot a \geq a \cdot 0 = 0.$$

Caso 2:  $a \leq 0$ . Se  $a \leq 0$ , então  $-a \geq 0$  (pelo item (i) acima) e, assim,  $(-a)(-a) = (-a)^2 \geq 0$  (pelo Caso 1). Usando a Regra dos Sinais (item (iii) da Proposição 1.4), obtemos  $(-a)^2 = a^2$ . Logo  $a^2 \geq 0$ .

(iv) Como  $1 = 1 \cdot 1$  e  $1 \cdot 1 > 0$  (pelo item (iii)), temos  $1 > 0$ .  $\square$

Como consequência, temos:

- $\mathbb{Z}_+ = \{x \in \mathbb{Z} : x > 0\} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$
- $\mathbb{Z}_- = \{x \in \mathbb{Z} : x < 0\} = \{\dots, -4, -3, -2, 1\}$

(Ax.16) (Princípio da Boa Ordem): Todo conjunto não-vazio de inteiros não-negativos possui um elemento mínimo. Ou seja, se  $A$  é um subconjunto de  $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$ , então existe  $k \in A$  tal que  $k \leq a$ , para todo  $a \in A$ .

Demonstrações para os próximos resultados desta seção podem ser encontradas em [2].

**Proposição 1.6.** *Se  $a, b \in \mathbb{Z}$  são tais que  $a \leq b \leq a + 1$ , então  $a = b$  ou  $b = a + 1$ . Consequentemente, se  $0 \leq a \leq 1$ , então  $a = 0$  ou  $a = 1$ .*

**Proposição 1.7.** (Propriedade Arquimediana): *Dados inteiros positivos  $a$  e  $b$ , existe um inteiro positivo  $n$  tal que  $na > b$ .*

**Proposição 1.8.** *Todo subconjunto não-vazio de  $\mathbb{Z}$  limitado inferiormente possui elemento mínimo. Analogamente, Todo subconjunto não-vazio de  $\mathbb{Z}$  limitado superiormente possui elemento máximo.*

**Exercício 1.9.** Sejam  $a, b \in \mathbb{Z}$ . Mostre que:

- $(-1)a = -a$ .
- Se  $a^2 = 0$ , então  $a = 0$ .
- Se  $a^2 = a$ , então  $a = 0$  ou  $a = 1$ .
- $a + x = b$  tem solução única em  $\mathbb{Z}$ .
- Se  $a < b$ , então  $-a > -b$ .

Antes de passarmos para a próxima seção, destacamos mais duas definições.

- Muitas vezes, escreveremos  $a - b$  para indicar a soma  $a + (-b)$ . Essa é a conhecida operação de *subtração*.
- O *módulo* de um número inteiro  $a$ , denotado por  $|a|$ , é definido por  $|a| = \begin{cases} a, & \text{se } a \geq 0; \\ -a, & \text{se } a < 0. \end{cases}$

**Proposição 1.10.** *Sejam  $a$  e  $b$  números inteiros. Temos que:*

- $|a| \geq 0$ . Além disso,  $|a| = 0$  se, e somente se,  $a = 0$ .
- $|ab| = |a||b|$ .
- $|a + b| \leq |a| + |b|$ .

## 2 Divisibilidade e o Algoritmo da Divisão

**Definição 2.1.** Sejam  $a$  e  $b$  números inteiros. Dizemos que  $b$  divide  $a$  (ou que  $a$  é divisível por  $b$ ) se existe um número inteiro  $q$  tal que  $a = bq$ .

- Quando  $b$  divide  $a$ , escrevemos  $b \mid a$ . Se  $b$  não divide  $a$ , escrevemos  $b \nmid a$ .
- Se  $b \mid a$ , diremos também que  $a$  é múltiplo de  $b$  e que  $b$  é um divisor de  $a$ .
- Se  $b \mid a$  e  $b \neq 0$ , então existe um único  $q \in \mathbb{Z}$  tal que  $a = bq$ . De fato, se existisse outro  $q' \in \mathbb{Z}$  tal que  $a = bq'$ , teríamos  $bq = bq'$  e, usando a Lei do Cancelamento (Ax.7), obteríamos  $q = q'$ . Por conta dessa unicidade, o número  $q$ , neste caso, recebe o nome de *quociente* de  $a$  por  $b$ ; algumas vezes, escreveremos  $q = a/b = \frac{a}{b}$ .
- Notemos que  $0 \mid a$  se, e somente se,  $a = 0$ . Neste caso, o quociente não é único, uma vez que  $0 = 0 \cdot q$ , para todo  $q \in \mathbb{Z}$ . Por conta disso, assumiremos, a partir daqui, que todos os divisores considerados neste texto são diferentes de zero.

**Proposição 2.2.** Se  $b \mid a$  e  $a \neq 0$ , então  $|b| \leq |a|$ .

*Demonstração.* Se  $b \mid a$ , então existe  $q \in \mathbb{Z}$  tal que  $a = bq$ . Daí,  $|a| = |bq| = |b||q|$ . Como  $a \neq 0$ , temos  $|a| > 0$  e, assim,  $|q| > 0$ , ou seja,  $1 \leq |q|$ . Multiplicando ambos os lados dessa última desigualdade por  $|b|$ , obtemos  $|b| \leq |b||q| = |a|$ .  $\square$

**Corolário 2.3.** São verdadeiras as afirmações:

- Os únicos divisores de 1 são 1 e  $-1$ .
- Se  $a \mid b$  e  $b \mid a$ , então  $a = \pm b$ .

*Demonstração.* (i) Se  $b \mid 1$ , então  $b \neq 0$  e segue da Proposição 2.2 que  $|b| \leq 1$ . Logo,  $0 < |b| \leq 1$  e, assim, pela Proposição 1.6, temos  $|b| = 1$ . Portanto,  $b = \pm 1$ .

(ii) Se  $b \mid a$  e  $a \mid b$ , então existem  $q, s \in \mathbb{Z}$  tais que  $a = bq$  e  $b = as$ . Daí,  $a = bq = (as)q = a(sq)$ . Como  $a \neq 0$ , obtemos  $1 = sq$ , ou seja,  $q$  divide 1. Pelo item (i), temos  $q = \pm 1$ , o que nos fornece  $a = \pm b$ .  $\square$

**Proposição 2.4.** Sejam  $a, b, c$  e  $d$  números inteiros. São verdadeiras as seguintes afirmações:

- $a \mid a$ .
- Se  $a \mid b$  e  $b \mid c$ , então  $a \mid c$ .
- Se  $a \mid b$  e  $c \mid d$ , então  $ac \mid bd$ .
- Se  $a \mid b$  e  $a \mid c$ , então  $a \mid (b + c)$ .

(v) Se  $a \mid b$  então  $a \mid bm$ , para todo  $m \in \mathbb{Z}$ .

(vi) Se  $a \mid b$  e  $a \mid c$ , então  $a \mid (bm + cn)$ , para quaisquer  $m, n \in \mathbb{Z}$ .

*Demonstração.* (i) Basta observar que  $a = 1 \cdot a$ .

(ii) Se  $a \mid b$  e  $b \mid c$ , então existem inteiros  $q$  e  $s$  tais que  $b = aq$  e  $c = bs$ . Daí  $c = bs = (aq)s = a(qs)$  e isso nos diz que  $a \mid c$ .

(iii) Se  $a \mid b$  e  $c \mid d$ , então existem inteiros  $q$  e  $s$  tais que  $b = aq$  e  $d = cs$ . Assim,  $bd = (aq)(cs) = ac(qs)$ ; logo  $ac \mid bd$ .

(iv) Se  $a \mid b$  e  $a \mid c$ , então existem  $q, s \in \mathbb{Z}$  tais que  $b = aq$  e  $c = as$ . Disso resulta que  $b + c = aq + as = a(q + s)$  e isso prova que  $a \mid (b + c)$ .

(v) Se  $a \mid b$ , então  $b = aq$ , para algum  $q \in \mathbb{Z}$ . Assim, para qualquer  $m \in \mathbb{Z}$ , obtemos  $bm = aqm = a(qm)$ , isto é,  $a \mid bm$ .

(vi) Exercício!  $\square$

**Exercício 2.5.** Suponha que o inteiro  $b$  divide os inteiros  $a_1, a_2, \dots, a_n$ . Mostre que, para quaisquer inteiros  $m_1, m_2, \dots, m_n$ ,  $b$  divide a soma  $a_1m_1 + a_2m_2 + \dots + a_nm_n$ .

Nosso objetivo agora é provar o Algoritmo da Divisão. Para isso, precisaremos do seguinte lema.

**Lema 2.6.** Sejam  $a$  e  $b$  números inteiros tais que  $a \geq 0$  e  $b > 0$ . Então existem  $q, r \in \mathbb{Z}$  tais que  $a = bq + r$ , com  $0 \leq r < b$ .

*Demonstração.* Consideremos o seguinte conjunto

$$S = \{a - bx : x \in \mathbb{Z} \text{ e } a - bx \geq 0\}.$$

Se  $x = 0$ , então  $a - bx = a \geq 0$ . Assim,  $a \in S$ , ou seja,  $S \neq \emptyset$ . Como  $S$  é formado apenas por inteiros não-negativos, segue do Princípio da Boa Ordem (Ax.16) que existe  $r = \min S$ . Já que  $r \in S$ , temos que  $r$  é da forma  $r = a - bq \geq 0$ , para algum  $q \in \mathbb{Z}$ .

Afirmamos que  $r < b$ . De fato, se ocorresse  $r \geq b$ , teríamos  $a - b(q + 1) = a - bq - b = r - b \geq 0$  e daí  $a - b(q + 1) \in S$ . Neste caso, temos a contradição  $a - b(q + 1) = r - b < r = \min S$ . Portanto,  $r < b$ .  $\square$

**Teorema 2.7.** (Algoritmo da Divisão) Sejam  $a, b \in \mathbb{Z}$  tais que  $b \neq 0$ . Então existem inteiros  $q$  e  $r$  tais que  $a = bq + r$   $0 \leq r < |b|$ . Mais:  $q$  e  $r$  são únicos com tais propriedades.

*Demonstração.* Primeiramente, vamos provar que  $q$  e  $r$  podem ser determinados no caso em que  $b > 0$  e  $a$  é um inteiro qualquer. O caso  $a \geq 0$  foi resolvido no lema anterior. Por isso, podemos supor  $a < 0$ . Daí  $|a| > 0$  e, pelo lema acima,

existem  $q', r' \in \mathbb{Z}$  tais que  $|a| = bq' + r'$ , com  $0 \leq r' < |b| = b$ . Se  $r' = 0$ , então  $-|a| = a = -(bq') = b(-q') + 0 = b(-q') + r'$  e, assim, fazendo  $q = -q'$  e  $r = r'$ , temos o desejado. Se  $r' > 0$ , temos que

$$a = -|a| = -(bq' + r') = b(-q') - r' = b(-q') - b + b - r' = b(-q' - 1) + (b - r').$$

De  $0 < r' < b$  vem que  $0 < b - r' < b$ . Aqui,  $q = -q' - 1$  e  $r = b - r'$  verificam as condições exigidas no enunciado do teorema.

Analise agora o caso  $b < 0$ . Para todo  $a \in \mathbb{Z}$ , segue do que vimos acima que existem inteiros  $q'$  e  $r'$  tais que  $a = |b|q' + r'$ , com  $0 \leq r' < |b|$ . Como  $b < 0$ , temos  $|b| = -b$  e daí  $a = |b|q' + r' = (-b)q' + r' = b(-q') + r'$ . Fazendo  $q = -q'$  e  $r = r'$ , obtemos o desejado.

**Unicidade:** Suponha que existam  $q, q', r, r' \in \mathbb{Z}$  tais que  $a = bq + r$  e  $a = bq' + r'$ , com  $0 \leq r < |b|$  e  $0 \leq r' < |b|$ . Daí  $bq + r = bq' + r'$ . Sem perda de generalidade, vamos supor  $r' \geq r$ . Daí,  $(q - q')b = r' - r \geq 0$ . Como  $|b| > r'$ , temos  $r' - r < |b|$  e disso resulta que  $(q - q')b = r' - r < |b|$ ; logo,  $0 \leq |q - q'| |b| < |b|$ . Sendo  $|b| > 0$ , obtemos  $0 \leq |q - q'| < 1$ , o que nos fornece  $|q - q'| = 0$ , ou seja,  $q = q'$ . Da igualdade  $bq + r = bq' + r'$  vem que  $r = r'$  e provamos assim a unicidade.  $\square$

**Definição 2.8.** Os inteiros  $q$  e  $r$  determinados no teorema acima são chamados, respectivamente, de *quociente* e *resto* da divisão de  $a$  por  $b$ .

**Exercício 2.9.** Determinar o quociente  $q$  e o resto  $r$  da divisão de  $a$  por  $b$  nos seguintes casos:

- (i)  $a = 138, b = 7$
- (ii)  $a = -138$  e  $b = 7$
- (iii)  $a = 138$  e  $b = -7$

**Solução:** (i) Aqui,

$$\begin{array}{r} 138 \overline{) 7} \\ \underline{-7} \phantom{00} 19 \\ 68 \\ \underline{-63} \\ 5 \end{array}$$

Logo,  $138 = 7 \cdot 19 + 5$ ; daí  $q = 19$  e  $r = 5$ .

(ii) Pelo item (i),  $138 = 7 \cdot 19 + 5$  e, assim,

$$\begin{aligned} -138 &= -(7 \cdot 19 + 5) = -(7 \cdot 19) - 5 = 7(-19) - 5 = \\ &= 7 \cdot (-19) - 7 + 7 - 5 = 7(-19) + 7(-1) + 2 = \\ &= 7(-20) + 2. \end{aligned}$$

Daí  $q = -20$  e  $r = 2$ .

(iii)  $138 = 7 \cdot 19 + 5 = (-7)(-19) + 5$ ; logo  $q = -19$  e  $r = 5$ .

**Definição 2.10.** Um número inteiro divisível por 2 é dito *par*. Quando um número inteiro não for divisível por 2, este será chamado *ímpar*.

**Observação 2.11.** Dado um número inteiro  $a$ , segue do Algoritmo da Divisão que existem inteiros  $q$  e  $r$  tais que  $a = 2q + r$ , com  $0 \leq r < 2$ . Logo  $r \in \{0, 1\}$ . Se  $r = 0$ , então  $a$  é par. Se  $r = 1$ , então  $a$  é um número ímpar. Ou seja, todo número ímpar é da forma  $2q + 1$ , para algum inteiro  $q$ .

**Exercício 2.12.** Mostre que todo inteiro ímpar é da forma  $4k + 1$  ou  $4k + 3$ .

**Solução:** Dado um número inteiro  $a$ , segue do Algoritmo da Divisão que existem inteiros  $q$  e  $r$  tais que  $a = 4q + r$ , com  $0 \leq r < 4$ . Analisemos os possíveis valores de  $r$ :

- se  $r = 0$ , então  $a = 4q = 2(2q)$  é par;
- se  $r = 1$ , então  $a = 4q + 1 = 2(2q) + 1$  é ímpar;
- se  $r = 2$ , então  $a = 4q + 2 = 2(2q + 1)$  é par;
- se  $r = 3$ , temos  $a = 4q + 3 = 2(2q + 1) + 1$  é ímpar.

Portanto,  $a$  é ímpar se, e somente se,  $r \in \{1, 3\}$ . Em tais casos, vemos que  $a$  é da forma  $a = 4k + 1$  ou  $4k + 3$ .

**Exercício 2.13.** Mostre que o quadrado de um número inteiro é da forma  $3k$  ou  $3k + 1$ .

**Exercício 2.14.** Sabe-se que o resto da divisão do inteiro  $a$  por 8 é 3. Determine o resto da divisão de  $a^2 + 1$  por 4.

**Solução:** Temos que  $a = 8q + 3$ , para algum  $q \in \mathbb{Z}$ . Assim,

$$\begin{aligned} a^2 + 1 &= (8q + 3)^2 + 1 = (64q^2 + 48q + 9) + 1 = \\ &= 4(4q^2) + 4(12q) + 4 \cdot 2 + 2 = 4(4q^2 + 12q + 2) + 2. \end{aligned}$$

O resto é 2.

**Exercício 2.15.** Sabe-se que o resto da divisão do inteiro  $a$  por 6 é 4. Determine o resto da divisão de  $a^2 + 1$  por 6.

**Exercício 2.16.** Prove que:

- (i) Dado  $a \in \mathbb{Z}$ , um dos inteiros  $a, a + 2$  ou  $a + 4$  é múltiplo de 3.
- (ii) Se  $a$  é ímpar, então  $24 \mid a(a^2 - 1)$ .
- (iii) Se 2 não divide  $a$ , então 8 divide  $a^2 - 1$ .

**Exercício 2.17.** Determine números inteiros  $a$  e  $b$  tais que  $a - b = 184$ , e o quociente e o resto da divisão de  $a$  por  $b$  sejam, respectivamente,  $q = 16$  e  $r = 4$ .

### 3 Representação dos números em outras bases

**Teorema 3.1.** *Seja  $b$  um inteiro,  $b \geq 2$ . Todo inteiro positivo  $a$  pode ser escrito de modo único na forma*

$$a = r_n b^n + r_{n-1} b^{n-1} + \dots + r_1 b + r_0,$$

em que  $n \geq 0$ ,  $r_n \neq 0$  e, para todo índice  $i \in \{0, 1, \dots, n\}$ , tem-se  $0 \leq r_i < b$

*Demonstração. Existência:* Dividindo  $a$  por  $b$ , obtemos  $q_0, r_0 \in \mathbb{Z}$  tais que  $a = bq_0 + r_0$ , com  $0 \leq r_0 < b$ . Na sequência, dividimos  $q_0$  por  $b$  e obtemos inteiros  $q_1$  e  $r_1$  tais que  $q_0 = bq_1 + r_1$ , com  $0 \leq r_1 < b$ . Repetimos o processo até obtermos um quociente nulo. Isso deve ocorrer em algum passo, pois cada quociente obtido é maior ou igual a zero e menor que o quociente obtido anteriormente.

Suponha que o primeiro quociente nulo seja o  $n$ -ésimo termo. Assim, temos:

$$a = bq_0 + r_0, \quad 0 \leq r_0 < b$$

$$q_0 = bq_1 + r_1, \quad 0 \leq r_1 < b$$

$$q_1 = bq_2 + r_2, \quad 0 \leq r_2 < b$$

$\vdots$

$$q_{n-2} = bq_{n-1} + r_{n-1}, \quad 0 \leq r_{n-1} < b$$

$$q_{n-1} = b \cdot 0 + r_n, \quad 0 < r_n < b$$

Logo

$$\begin{aligned} a &= bq_0 + r_0 = b(bq_1 + r_1) + r_0 = \\ &= b^2 q_1 + br_1 + r_0 = b^2(bq_2 + r_2) + br_1 + r_0 = \\ &= b^3 q_2 + b^2 r_2 + br_1 + r_0 = \dots = \\ &= b^n r_n + b^{n-1} r_{n-1} + b^{n-2} r_{n-2} + \dots + b^2 r_2 + br_1 + r_0. \end{aligned}$$

*Unicidade:* Será omitida.  $\square$

O número  $b$  dado no teorema acima é chamado de *base* e vamos escrever  $(r_n r_{n-1} r_{n-2} \dots r_0)_b$  para indicar como que o número  $a$  é representado na base  $b$ .

Estamos acostumados a expressar números na base 10. Por exemplo, o símbolo 5672 representa o número inteiro  $5 \cdot 10^3 + 6 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10 + 2$ . Quando não explicitarmos a base  $b$  na expressão de  $a$ , assumimos que a base considerada é a base 10.

**Exercício 3.2.** Escreva 1329 na base 5.

*Solução:*

1329 $\overline{) 5}$	265 $\overline{) 5}$	53 $\overline{) 5}$	10 $\overline{) 5}$	2 $\overline{) 5}$
* 265	* 53	* 10	* 2	* 0
4	0	3	0	2

Portanto,  $1329 = (20304)_5$ .

**Exercício 3.3.** Escreva 127 na base 4.

*Solução:*

127 $\overline{) 4}$	31 $\overline{) 4}$	7 $\overline{) 4}$	1 $\overline{) 4}$
* 31	* 7	* 1	* 0
3	3	3	1

Logo,  $127 = (1333)_4$ .

**Exercício 3.4.** Escreva 855 na base 12.

*Solução:* Aqui, precisamos de mais dois algarismos para representarmos os inteiros 10 e 11. Façamos  $\alpha = 10$  e  $\beta = 11$

855 $\overline{) 12}$	71 $\overline{) 12}$	5 $\overline{) 12}$
* 71	* 5	* 0
3	11	5

Logo,  $855 = (5\beta 3)_{12} = (5(11)3)_{12}$ .

**Observação 3.5.** Note que

$$(5113)_{12} = 5 \cdot 12^3 + 1 \cdot 12^2 + 1 \cdot 12 + 3 = 1887 \neq 855,$$

ou seja,  $855 \neq (5113)_{12}$ . Agora,

$$(5(11)3)_{12} = 5 \cdot 12^2 + 11 \cdot 12 + 3 = 855.$$

**Exercício 3.6.** Escreva  $(1245)_6$  na base 10.

$$\text{Solução: } (1245)_6 = 1 \cdot 6^3 + 2 \cdot 6^2 + 4 \cdot 6 + 5 = 317.$$

**Exercício 3.7.** Escreva o número  $a$  na base  $b$ :

(i)  $a = 1472$ ,  $b = 5$ .

(ii)  $a = 114$ ,  $b = 2$ .

(iii)  $a = 15422$ ,  $b = 12$ .

(iv)  $a = (2356)_7$ ,  $b = 10$ .

(v)  $a = (532)_6$ ,  $b = 8$ .

(vi)  $a = (21)_3$ ,  $b = 12$ .

### 4 Máximo divisor comum

Sejam  $a$  e  $b$  inteiros não ambos iguais a zero. Dizemos que um inteiro  $c$  é um *divisor comum* de  $a$  e  $b$  se  $c \mid a$  e  $c \mid b$ .

Fixemos as seguintes notações:

$$D(a) = \{d \in \mathbb{Z} : d \mid a\}$$

$$D(b) = \{d \in \mathbb{Z} : d \mid b\}$$

$$D(a, b) = \{d \in \mathbb{Z} : d \mid a \text{ e } d \mid b\}$$

Vemos que  $D(a, b) = D(a) \cap D(b)$ . Além disso,  $D(a, b)$  é limitado superiormente, pois se  $a \neq 0$ , então  $c \leq |a|$ , para todo  $c \in D(a, b)$ . Logo, o conjunto  $D(a, b)$  possui elemento máximo. Disso segue a seguinte definição: