

$$E[X] = \begin{cases} \sum x_i P(x_i) & w_i \rightarrow 0 < w_i < 1 \\ & \sum w_i = 1 \\ \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) dx \end{cases}$$

$$E[(X-\mu)^2] = E[X^2] - \mu^2$$

Ex 3.13 > Geometric distribution

Random Variable  $K$  : # of trials until the 1st success.

첫 번째로 성공할 때까지 시행한 횟수.

ex) Tossing a die repeatedly until 1st "6"

$$K=1 \rightarrow P$$

$$K=2 \rightarrow (1-P)P$$

$$K=3 \rightarrow (1-P)(1-P)P$$

⋮

$$P_K(k) = \underbrace{(1-P)^{k-1} \cdot P}_{\text{1부터 시작}}, \quad k=1, 2, 3, 4, \dots$$

$$(a) \sum_{k=1}^{\infty} P(1-P)^{k-1} = 1$$

$$(b) P(K > 5) = \sum_{k=6}^{\infty} P(1-P)^{k-1}$$

$$P(K \leq 5) = F_K(5) = \sum_{k=1}^5 P(1-P)^{k-1} \rightarrow \text{확률값만 정확하게 구하면, discrete case를 정확하게 구할 수 있다.}$$

$$(c) E[K] = \sum_{k=1}^{\infty} k P(1-P)^{k-1} = P \cdot \frac{1}{P^2} = \frac{1}{P}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} (1-P)^k = \frac{1-P}{P} \quad (\text{무한 등비 합})$$

$$\frac{d}{dk} \downarrow$$

$$+ \sum_{k=1}^{\infty} k (1-P)^{k-1} = + \frac{1}{P^2}$$

$$\sigma_K^2 = E[K^2] - \mu^2 = \frac{1-P}{P^2}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^2 (1-P)^{k-1} P = \frac{1}{P} + \frac{2(1-P)}{P^2}$$


$$- \sum k(k-1)(1-P)^{k-2} = - \frac{2}{P^2}$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} k^2 (1-P)^{k-2} = \sum_{k=1}^{\infty} k (1-P)^{k-2} + \frac{2}{P^2}$$

$$\times P(1-P)$$

$$\times P(1-P)$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^2 (1-P)^{k-1} P = \sum_{k=1}^{\infty} k (1-P)^{k-1} P + \frac{2(1-P)}{P^2}$$



Digital camera 에 실물을 찾아내는 기능이 있다.

실물인지 아닌지 판단하려고 할 때, 무엇을 가지고 판단할까?

$$\sum (\underbrace{\text{평균 값}}_{\text{예측-추정}} - \text{실제값})^2 \rightarrow \text{minimum}$$

error model  
(값)<sup>2</sup> → energy.

"차이 제곱하는 energy가"

minimum 이 되도록 하자!"

⇒ 무엇인가를 판단하고 선택하는 기준은

직관적으로 하는 것이 아니라,

수치 모델을 세워서 수치 모델에

해당해 값이 가능하면 일정한 기준보다

작을 수록 '좋다' 라고 판단하는 것.

$$\min_x f(x) = \underbrace{p(a_1)}_{\text{예측하려는 값}} (x - a_1)^2 + \underbrace{p(a_2)}_{\text{눈이 잘 맞은 것}} (x - a_2)^2 + \underbrace{p(a_3)}_{\text{코가 잘 맞은 것}} (x - a_3)^2 + \dots + \underbrace{p(a_n)}_{\text{입이 잘 맞은 것}} (x - a_n)^2 \Rightarrow \text{error model data, energy.}$$

f(x)를 최소화 만드는 x 값 :  $a_1$ ,  $\frac{a_1 + a_2}{2}$ , ...

$$\hat{x} = \frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n} \quad \text{일 때 } f(x) \text{가 최소가 된다.}$$

↓  
평균!


$$f(\hat{x}) = \frac{\sum_{i=1}^n (a_i - \hat{x})^2}{n} \sim n \sigma_n^2 \sim \text{분산!}$$

Data가 얼마나 퍼져있는가.

정확도를 예측 한다면, 분산이 작으면 좋겠다.

energy model 이 minimum 이 되도록 만들어주는 것 : data 값들의 평균.

평균의 값들을 대입했을 때 minimum energy는 분산이 된다.




눈에 해당하는 위치의 error 값 } 눈은 잘 맞는데, 입이 잘 안맞을 수도 있다.  
코에 해당하는 위치의 error 값 } 등에게 잘 맞을 것 같은 것은 아니다.  
입에 해당하는 위치의 error 값 } 어느 해든 잘 안맞을지 모르지만, 전체적으로 잘 설명된 값을 찾자.

판단, 선택해야 하는  
⇒ 문제가 다른 model을 쓴다.

Median : 데이터 값들의 중간 값. 1, 2, 4, 5, 7

$$\min g(x) = p(a_1) |x - a_1| + p(a_2) |x - a_2| + p(a_3) |x - a_3| \sim \text{'평균' 같은 기준치가 없으면 단순히 } a_1, a_2, a_3 \text{ 의}$$

g(x)를 최소화 만드는 값 :  $a_1$ ,  $a_1$ 과  $a_2$  사이에 있는 모든 값.



위치만으로 판단할 수 없고, 가중치를 따져서

0.5 정도의 확률 위치에 대한 중간값이 median 이 된다.

### 3.5 Conditional Mean

$$E[X|A] = \sum_{x_i \in A} x_i P(x_i|A) = \sum_{x_i \in A} x_i \frac{P(x_i \cap A) + P(x_i)}{P(A)} \quad \rightarrow \text{discrete 한 경우 Conditional mean 이므로 이야기 한다.}$$

새로운 sample space A를 뽑거나지 않는 변수값들에 대해서만

조건부 확률을 구해서 평행을 구한다.

for continuous case : conditional mean 이 복잡해진다.

$$E[X|A] = \int x \cdot f_x(x|A) dx$$

conditional density를 구해야 한다.  
이것이 문제.

$$f_x(x|A) = \frac{d}{dx} F_x(x|A) \quad \rightarrow \text{conditional density는 conditional CDF에서 구한다. CDF를 미분하면 density가 나오므로.}$$

$$= \frac{d}{dx} P(X \leq x | A) \quad \rightarrow \text{conditional CDF를 형태로 바꾸는 것.}$$


$$= \frac{d}{dx} \frac{P(X \leq x \cap A)}{P(A)}$$

"A"라는 event가 어떻게 주어지느냐에 달려 있다."

Ex 3.14 >  $A = \{X \leq a\}$


$$f_x(x|X \leq a) = \frac{d}{dx} \frac{P(X \leq x \cap X \leq a)}{P(X \leq a)}$$

(i)  $x > a$



$$\frac{d}{dx} \frac{P(X \leq x \cap X \leq a)}{P(X \leq a)} \Rightarrow \frac{d}{dx} \frac{P(X \leq a)}{P(X \leq a)} = \frac{d}{dx} \cdot 1 = 0$$


(ii)  $x \leq a$



$$\frac{d}{dx} \frac{P(X \leq x \cap X \leq a)}{P(X \leq a)} \Rightarrow \frac{d}{dx} \frac{P(X \leq x)}{P(X \leq a)} \Rightarrow \frac{d}{dx} \frac{F_x(x)}{F_x(a)} = \frac{f_x(x)}{F_x(a)}$$

Ex 3.15 >  $f_x(x) = \frac{1}{20}$ ,  $40 \leq x \leq 60$   $A = \{X \leq 55\}$

$$E[X|A] = \int_{x \in A} x \cdot f_x(x|A) dx = \int_{40}^{55} x \cdot \frac{\frac{1}{20}}{\frac{1}{20}} dx = 47.5$$



47.5 conditional mean 의 값.


$$\left( \frac{40+55}{2} \right)$$

$$1) x > a$$


$$F_x(x|A) = \frac{P(x \leq x \cap x > a)}{P(x > a)}$$

$$\Rightarrow \frac{P(a < x \leq x)}{1 - F_x(a)}$$

$$= \frac{F_x(x) - F_x(a)}{1 - F_x(a)}$$



$$2) x \leq a$$



$$CDF = \frac{0}{P(x > a)} \quad f_x(x|A) = \frac{f_x(x)}{1 - F_x(a)}$$