

R8 — Acoplamiento cerebro × experiencia subjetiva (MEQ30 + EBI × Δbrain)

Informe de resultados. Pipeline productor: PsyConn 6.6 (ds006072). Estado de los archivos: primera ejecución del chunk tras la cadena de correcciones aplicadas en la ronda 1 de 6.6 (mapping MEQ verificado contra Barrett 2015 Fig. 1, EBI scoring como media según Roseman 2019 p. 5, bootstrap percentil semilla GLOBAL_SEED, p de permutación diagnóstica, na.rm = TRUE con NA-check explícito). Fecha de la última (y única) ejecución del bloque principal de archivos consumidos: 2026-05-25 12:26–12:27, posterior a la cascada que regeneró STATS_13_1 (6.1 r3 a las 10:55), ADVANCED_METRICS (3.1) y los synch_* (synch_summary con synch_entropy_assoc per-sujeto).

Ronda 2 (2026-05-26): se añaden dos artefactos derivados del cor_data ya construido — correlations_loo_robust.csv y correlations_loo_influence.csv — que aplican el contrato r3 de 6.1.3 (regla $|z| > 2\sigma$ de Tukey 1977) adaptado a ρ Spearman. La hipótesis abierta «el brazo REDCap de sub-P3 codificó dose_1/dose_2 con un mapping que merece revisión externa» queda descartada por triangulación contra tres fuentes (README ORDER de ds006072 + PPFM_MEQ_DATA.xlsx de Siegel + CSV REDCap crudo): el mapping de sub-P3 — ses-8 = MTP (dose_1), ses-12 = PSIL (dose_2) — es consistente entre las tres fuentes; sub-P3 reporta una respuesta fenomenológica genuinamente atípica (MEQ_total dose_1 = 80, dose_2 = 38.5), no producto de un mapping incorrecto.

Hallazgos

La pregunta nuclear de 6.6 — *¿la magnitud de los cambios topológicos cerebrales bajo psilocibina covaría con la intensidad de la experiencia subjetiva?* — se opera sobre dos métricas cerebrales pareadas (una de integración funcional, otra de entropía dinámica de la sincronía) cruzadas con seis predictores subjetivos (cinco escalas del MEQ30 y el EBI total). El emparejamiento exige presencia de los tres bloques de datos (cuestionario PSIL + cuestionario MTP + matrices de conectividad PSIL/MTP) en el mismo sujeto: la intersección deja $N = 6$ (sub-P1, P3, P4, P5, P6, P7), el mismo subconjunto que sostiene R3 a R7 y que cierra el contrato PFM del proyecto. El test es Spearman (rango), bootstrap percentil con $R = 10\,000$ réplicas para CI al 95 %, p asintótica de cor.test con exact = FALSE, p por permutación etiqueta-aleatoria ($R = 10\,000$) reportada en paralelo como diagnóstico, y FDR de Benjamini–Hochberg sobre la familia de 12 tests (6×2). Con cuatro grados de libertad efectivos, las correlaciones son **exploratorias por construcción** y se reportan como tales en la callout-warning del propio chunk: para detectar $\rho = 0.7$ con potencia 0.8 a $\alpha = 0.05$ se requieren $N \approx 12$ (Bonett & Wright 2000, lineage bonett_2002); con $N = 6$ cualquier estimación viene con una incertidumbre que el bootstrap deja a la vista.

Validación del placebo activo: el sham no es totalmente inerte

Antes de leer las correlaciones conviene mirar el sham check, porque condiciona la limpieza del contraste:

Condición	MEQ_total (media ± SD)	MEQ_Mystical	MEQ_Positive_Mood	MEQ_Time_Space	MEQ_Ineffability	EBI_total
MTP	19.0 ± 30.3	8.7 ± 17.0	5.9 ± 5.2	1.8 ± 3.5	2.6 ± 4.9	5.9 ± 6.0
PSIL	104.7 ± 35.4	49.1 ± 17.6	21.3 ± 5.4	22.9 ± 9.1	11.3 ± 5.8	39.6 ± 32.7

A nivel de grupo la separación es enorme y consistente con la literatura de validación de los instrumentos: MEQ_total bajo psilocibina ronda los dos tercios del techo de 150 (Barrett, Johnson & Griffiths 2015 reportan medias 90–110 en dosis altas), MEQ_Mystical se sitúa por encima del 60 % del rango (criterio convencional de “experiencia mística completa”, Griffiths et al. [5]) y EBI_total roza los 40 puntos sobre 100, en el rango de los estudios de Roseman et al. [2] que validaron el inventario contra outcomes clínicos en psilocibina-asistida. La caja MTP, sin embargo, no es estrictamente inerte fenomenológicamente: la SD del MEQ_total bajo metilfenidato (30.3) es del mismo orden que la media, indicando una distribución muy heterogénea. La inspección por sujeto explica de dónde sale ese ruido — sub-P3 reporta MEQ_total_MTP = 80 (más alto que su propio MEQ_total bajo PSIL, que fue 38.5), con MEQ_Mystical_MTP = 43 y MEQ_Positive_Mood_MTP = 15.5; el resto del grupo se mantiene en rangos bajos (MEQ_total_MTP ≤ 13 en P1, P4, P5, P6, P7). Esto no es un bug del scoring: ya el chunk advierte (callout y comentarios H11) que na.rm = TRUE puede sesgar los scores si hay NAs en la fila MTP de algún sujeto, pero el NA-check empírico ejecutado en línea (impreso al ejecutar 6.6) descarta esa hipótesis al reportar cero NAs en items MEQ/EBI bajo cualquiera de las dos condiciones. Tampoco es un bug del mapping dose_x → drug: la verificación triangulada de ronda 2 contra tres fuentes — README ORDER de ds006072 (Drug1 = MTP, Drug2 = PSIL para P3), PPFM_MEQ_DATA.xlsx

de Siegel et al. (Event Name “MTP” para PS16 con scores Mystical = 2.87, “PSIL” con Mystical = 1.13), y el CSV REDCap crudo (dose_1_arm_2 suma MEQ = 80.0, dose_2_arm_2 suma MEQ = 38.5) — muestra coincidencia íntegra entre las tres fuentes y con participants.tsv generado por PsiloData 5.1. La explicación más parsimoniosa es entonces que sub-P3 tuvo una respuesta atípica genuina — sea por sugestionabilidad alta, por expectativa, o por baja respuesta a la dosis de psilocibina. El hallazgo es **un caveat de fondo del contraste**, no de R8 en concreto: cualquier comparación PSIL – MTP en este sujeto vive sobre un MTP que ya tiene una respuesta fenomenológica grande.

Δbrain por sujeto: dos métricas, dos firmas distintas

Sujeto	Δglobal_efficiency	Δsynch_entropy_assoc
sub-P1	+0.106	−0.654
sub-P3	−0.070	+0.295
sub-P4	+0.399	−1.229
sub-P5	+0.165	−0.372
sub-P6	+0.095	−0.508
sub-P7	+0.117	−0.577

La integración funcional global (Δglobal_efficiency) reproduce a nivel inter-individual la firma de grupo que R3 ya reportó: cinco de seis sujetos tienen $\Delta > 0$, con un promedio del orden de +0.14 — coherente con el patrón Müller et al. [6] y Daws et al. [7] de mayor integración global bajo psicodélicos serotoninérgicos. Sub-P3 vuelve a ser el caso atípico también en este plano (único Δ negativo, −0.07), lo cual no sorprende dado el sham check anterior: si MTP ya operó como un estado con cierta carga fenomenológica en este sujeto, el contraste PSIL – MTP se atenúa o se invierte aunque el patrón cerebral bajo PSIL sea típico.

La entropía dinámica de la sincronía intra-red de asociación (Δsynch_entropy_assoc), en cambio, **no replica la dirección predicha por Carhart-Harris et al. (2014, Fig. 6)** ni a nivel de grupo ni a nivel inter-individual. El paper original predice ↑ entropía bajo psilocibina en redes de asociación; la métrica de 3.1 implementa esa definición de forma literal (entropía de Shannon de la distribución temporal de la varianza intra-red, agregada sobre Default + Cont + SalVentAttn), y sin embargo cinco de seis sujetos tienen $\Delta < 0$ (PSIL menos entrópica que MTP en este eje), con un descenso medio del orden de −0.51 bits. Sub-P3 es el único con $\Delta > 0$ (+0.295) — coincidiendo de nuevo con un sham parcialmente fallido. La discrepancia con el paper original no se cierra desde R8 (eso es lectura de 3.1 propiamente dicha) pero es la pieza que ordena la dirección de toda la cara izquierda del heatmap de correlaciones.

Lectura central del heatmap: una asociación negativa fuerte con la entropía

La firma agregada se aprecia de un vistazo en el heatmap: las correlaciones con Δglobal_efficiency (columna izquierda) son **positivas en los seis predictores** (rango ρ entre +0.31 y +0.71), las correlaciones con Δsynch_entropy_assoc (columna derecha) son **negativas en los seis predictores** (rango ρ entre −0.39 y −0.89), y dos celdas de la columna derecha llevan el marcador • de $p < 0.05$ sin corregir:

Predictor (on-PSIL)	Δbrain	ρ	CI 95 % bootstrap	p asintótica	p_perm	p_FDR
MEQ_total	Δsynch_entropy	0.886	[−1.00, −0.20]	0.019	0.031	0.113
MEQ_Mystical	Δsynch_entropy	0.886	[−1.00, −0.20]	0.019	0.034	0.113
MEQ_Time_Space	Δsynch_entropy	0.812	[−1.00, 0.00]	0.050	0.072	0.199
MEQ_Positive_Mood	Δsynch_entropy	0.711	[−1.00, +0.09]	0.072	0.101	0.217
MEQ_Positive_Mood	Δglobal_efficiency	0.714	[−0.33, +1.00]	0.111	0.142	0.266
EBI_total	Δglobal_efficiency	0.657	[−0.60, +1.00]	0.156	0.179	0.312
MEQ_total	Δglobal_efficiency	0.600	[−0.80, +1.00]	0.208	0.245	0.346
MEQ_Ineffability	Δglobal_efficiency	0.577	[−0.87, +1.00]	0.231	0.242	0.346
EBI_total	Δsynch_entropy	0.465	[−1.00, +1.00]	0.329	0.351	0.438
MEQ_Ineffability	Δsynch_entropy	0.355	[−1.00, +0.89]	0.439	0.447	0.526
MEQ_Time_Space	Δglobal_efficiency	0.348	[−0.83, +1.00]	0.499	0.493	0.544
MEQ_Mystical	Δglobal_efficiency	0.314	[−1.00, +1.00]	0.544	0.569	0.544




Figura 1: Heatmap ρ Spearman — MEQ/EBI on-PSIL $\times$ Δ brain (PSIL – MTP), $N=6$

Ninguna celda sobrevive a la corrección FDR-BH ($p_{\text{FDR}} \text{ mínima} = 0.113$, compartida por las dos asociaciones empatadas en $p = -0.886$). El marcador * por tanto no aparece en el heatmap. Las dos asociaciones con $p < 0.05$ nominal son **MEQ_total** y **MEQ_Mystical**, ambas contra $\Delta\text{synch_entropy_assoc}$, ambas con $p = -0.886$ exacto. El empate no es casualidad: las 15 ítems del bloque *Mystical* pesan la mitad del MEQ_total (75 puntos sobre 150) y el rango Spearman, al estar dominado por la jerarquía de magnitudes y no por la magnitud absoluta, queda invariante ante esa transformación lineal en una muestra tan pequeña — los seis sujetos se ordenan exactamente igual en MEQ_total y en MEQ_Mystical, así que ambos tests son numéricamente el mismo test bajo el rango. La p asintótica de `cor.test` con `exact = FALSE` reporta 0.019 (aproximación normal del estadístico de rango), la p de permutación reporta 0.031 — saturación del Wilcoxon-tipo exacto con $N = 6$ (la fracción mínima permutacional posible con dos vectores de 6 elementos y $|p|$ extremo es $2/720 = 0.0028$, pero el patrón de empates desplaza la cota efectiva a 0.031 — coherente con la teoría de Phipson y Smyth [9] sobre p exactos). El CI bootstrap percentil cae en $[-1.00, -0.20]$: el extremo inferior está literalmente saturado en el límite del coeficiente, y el extremo superior (-0.20) cae muy cerca del intervalo de signo positivo. La interpretación honesta es que el efecto es consistente en signo pero con incertidumbre enorme — la lectura puntual $p = -0.886$ no es generalizable más allá de este N , pero la **dirección negativa** sí es lo que la data sostiene.

El panel de dispersión visualiza por qué la firma sale tan limpia: en los seis paneles de la columna derecha (vs $\Delta\text{synch_entropy_assoc}$) sub-P3 ocupa la esquina superior izquierda (único MEQ bajo, único Δ positivo) y los cinco restantes forman un cluster compacto en el rango inferior derecho (MEQ alto, Δ negativo). La inversión direccional respecto a la predicción 1 del *entropic brain* es por tanto **una propiedad del grupo, no un artefacto de un sujeto único** — un Spearman calculado descartando sub-P3 ($N = 5$) sostiene $p \approx -0.80$ con la misma jerarquía monótona; el único sujeto que se desvía del orden inverso entre los cinco restantes es sub-P5 (MEQ = 105, segundo desde abajo en MEQ pero con $\Delta\text{synch} = -0.372$, más alto que P6 y P7), discrepancia pequeña frente al patrón global.

La columna izquierda (vs $\Delta\text{global_efficiency}$) cumple la predicción 2 a priori — $\text{MEQ} \uparrow \Rightarrow \Delta\text{global_efficiency} \uparrow$ (Müller et al. [6], Lord et al. [10]) — pero sin atravesar el umbral nominal: p entre $+0.31$ y $+0.71$, $p \geq 0.111$ en los seis predictores, CI bootstrap simétricamente abiertos a ambos lados del cero. El mejor candidato es $\text{MEQ_Positive_Mood} \times \Delta\text{global_efficiency}$ ($p = +0.71$, $p = 0.111$, $p_{\text{FDR}} = 0.266$), una asociación de magnitud grande pero sin potencia para distinguirse del cero. $\text{EBI_total} \times \Delta\text{global_efficiency}$ ($p = +0.66$) está en la misma línea — la **ruptura emocional** y la **integración global** covarían en la dirección esperada, pero el N no permite afirmarlo.

Las predicciones a priori, contrastadas

La sección 6.6 declara dos predicciones, ambas anteriores a la inspección de los datos:


1. $\text{MEQ_total} \uparrow \Rightarrow \Delta\text{synch_entropy_assoc} \uparrow$ — experiencia mística intensa $\Rightarrow$ mayor desorden de la sincronía intra-red en redes de asociación, réplica directa de Carhart-Harris (2014, Fig. 6).
2. $\text{MEQ_total} \uparrow \Rightarrow \Delta\text{global_efficiency} \uparrow$ — mayor integración global [6,10].

La predicción 1 **no se replica en signo**. La data muestra $p = -0.886$ con $p_{\text{perm}} = 0.031$, dirección opuesta a la predicción y a la vez la única correlación de toda la familia que cruza el umbral nominal. Eso obliga a discutir tres explicaciones no excluyentes. **Primera**, la operacionalización: Carhart-Harris et al. [8] usaron 9 redes ICA de Smith et al. (2009) sobre BOLD crudo de un EPI single-echo a 3 T con $N = 15$ (psilocibina IV); 3.1 implementa la misma definición sobre 8 redes (7 Yeo corticales + Subcortex Tian S2) computadas sobre series TEDANA + aCompCor z-scoreadas por ROI bajo Schaefer-200 + matrices de FC pareadas dentro de PFM ($N = 6$, dosis 25 mg oral, multi-echo a 3 T). Las dos cadenas no son intercambiables: el callout-note de 3.1 ya documenta que los valores absolutos de H_N no son comparables 1:1 con la Fig. 6 del paper original (la z-score por ROI cambia la escala de varianza espacial; los bordes de bin son comunes intra-sujeto pero distintos entre sujetos, así que el agregado $\text{synch_entropy_assoc}$ está bien definido como índice pareado within-subject pero su magnitud absoluta no es intercambiable entre sujetos). **Segunda**, el régimen experimental: PFM con dosis 25 mg de psilocibina oral y placebo activo metilfenidato no es el mismo experimento que la dosis IV de 2 mg con placebo salino sobre dosis única. Daws et al. [7] ya mostraron que la firma de integración global se preserva entre dosis y vías de administración pero no garantizan que la firma de entropía intra-red lo haga. **Tercera**, el régimen de ruido del sham: si el placebo activo MTP genera por sí mismo niveles no despreciables de actividad fenomenológica (como acaba de mostrar el sham check en sub-P3) y, además, una actividad cerebral comparable a PSIL en algunos sujetos, el contraste pareado PSIL – MTP puede atenuar o invertir el signo del Δ entrópico aunque la condición PSIL aislada sea coherente con Carhart-Harris 2014. R8 no separa estos efectos — un test no pareado contra una muestra control no-MTP no existe en este dataset; el sham parcialmente fallido es una limitación de diseño que pesa sobre la interpretación.

La predicción 2 **se replica en signo pero no en potencia**. Las seis correlaciones $\rho(\text{MEQ}/\text{EBI}, \Delta\text{global_efficiency})$ son positivas, en el rango $+0.31$ a $+0.71$, con MEQ_Positive_Mood , MEQ_total y EBI_total liderando la cabecera. La firma direccional es la

[GRUPO] Correlación cerebro × experiencia subjetiva

Spearman ρ con bootstrap CI 95 % y p_{perm} (R=10 000)



Filas: MEQ_total, Mystical, Positive Mood, Time/Space, Ineffability, EBI_total - Δ brain = PSIL - MTP

Figura 2: Panel de dispersión MEQ/EBI on-PSIL × Δ brain (PSIL – MTP), N=6 — 6 predictores × 2 Δ brain

que la literatura de cerebro entrópico predice [11], pero con $N = 6$ ninguna asociación cruza ni el umbral nominal ni FDR. Si se acepta el patrón direccional como exploratorio, la lectura es que **la intensidad de la experiencia subjetiva covaría con la magnitud del incremento de integración global** — la pieza fenomenológica del marco REBUS de Carhart-Harris y Friston [11] en línea con la firma cerebral, sin sostén inferencial confirmatorio.

Lectura integrada R3 + R5 + R8

R3 cerró el contrato del cerebro entrópico a nivel de métricas globales/nodales: dirección coherente con la hipótesis ($\uparrow$ mean_strength, $\uparrow$ global_efficiency, $\downarrow$ char_path_length, $\uparrow$ clustering, $\downarrow$ modularity, $\uparrow$ eigenvector, $\downarrow$ betweenness, $\downarrow$ participation) sin supervivientes FDR. R5 mostró la misma dirección a nivel de redes y POS/NEG (POS $\uparrow$ por red sin FDR, DMN-DAN p pareado one-sided $p = 0.027$). R8 conecta los dos planos con la fenomenología: la integración global covaría con la experiencia subjetiva en la dirección esperada (no significativa, $N = 6$), pero la entropía dinámica intra-red — la métrica que da nombre a la *entropic brain hypothesis* — se mueve en dirección opuesta a la predicción y, en su asociación con MEQ_total/MEQ_Mystical, es **la única asociación que cruza el umbral nominal** en todo R8. La conclusión natural para la sección de Resultados de la Memoria es que el marco entrópico se confirma **direccionalmente** en el plano topológico (R3 + R5 + R6) pero **se cuestiona** en el plano de la entropía de sincronía dinámica (3.1 + R8) — una grieta interesante a nivel de TFM, porque obliga a discutir si la “entropía” del paper de 2014 es operacionalmente la misma que la implementada aquí, o si la divergencia abre una pregunta empírica a futuro.

Limitaciones y caveats

R8 vive con cuatro limitaciones que su prosa no puede esquivar.

La primera es **el $N = 6$** . Una correlación Spearman con cuatro grados de libertad efectivos no es un test confirmatorio en ningún sentido razonable: el bootstrap percentil produce CI que en varias celdas se saturan en $[-1, +1]$ (literalmente vacíos como inferencia), la p asintótica de `cor.test` con `exact = FALSE` reposa sobre una aproximación normal del rango cuya validez con $N = 6$ es marginal, y la p de permutación se topa con un suelo combinatorio que no permite $p < 0.031$ incluso para $|p|$ extremo. El callout-warning del propio chunk lo explicita: las correlaciones de 6.6 se reportan como **exploratorias y descriptivas**, no confirmatorias. La replicación a $N \approx 12$ — sea integrando el subset 2 de ds006072 (los participantes P1R–P5R del README, $N \approx 4$ adicionales) o triangulando contra un dataset independiente de psilocibina — es la condición sin la cual R8 no debería entrar en una sección de Resultados de una Memoria de TFM más que como prueba de concepto.

La segunda es **el sham parcialmente fallido en sub-P3**. El placebo activo metilfenidato debería puntuar ≈ 0 en MEQ/EBI si el cuestionario es específico del estado psicodélico (validación interna del *active placebo*; Roseman et al. [2], p. 1080); sub-P3 reporta MEQ_total_MTP = 80 y MEQ_Mystical_MTP = 43, con MEQ_Mystical_PSIL = 17 — es decir, **menos** mística bajo PSIL que bajo MTP. Eso colapsa el contraste pareado en este sujeto en MEQ (MEQ_total_PSIL – MEQ_total_MTP = -41.5 , único Δ negativo del grupo) y, en paralelo, sub-P3 es el único sujeto con Δ synch_entropy_assoc > 0 ($+0.295$) y con Δ global_efficiency < 0 (-0.07). Las dos anomalías cerebrales y la anomalía conductual van juntas, lo cual es a la vez una validación del marco (las firmas cerebral y subjetiva covarían dentro del sujeto) y un caveat (la generalizabilidad del resultado de grupo depende de cómo se trate este caso). La opción de excluirlo en una versión confirmatoria deja $N = 5$, lo que no resuelve el problema de potencia; lo correcto es **declararlo y replicar**. El sham check no estaba listado como una cuestión bloqueante en Fase B porque los archivos son técnicamente correctos, pero la lectura limpia del contraste depende de esta discusión.

La tercera era **la ausencia de LOO formal sobre las correlaciones**, resuelta en la ronda 2 (2026-05-26). El contrato r3 de 6.1.3 (regla $|z| > 2\sigma$ de Tukey 1977) se adapta a p Spearman definiendo `loo_influence_i = |p_full - p_{-i}|`, estandarizando sobre los N valores y marcando influyente con $|z| > 2$. El resultado se materializa en `correlations_loo_robust.csv` (12 filas, una por celda predictor $\times \Delta$ brain) y `correlations_loo_influence.csv` (72 filas = 12 celdas $\times 6$ sujetos): **$n_{\text{influential}} = 0$ en las doce celdas**, $p_{\text{full}} = p_{\text{no_infl}}$ en las doce, y `agreement = TRUE` en las doce. Sub-P3 aparece como el sujeto con mayor `loo_influence` en nueve de las doce celdas, lo que valida cuantitativamente su rol especial; el máximo `loo_zscore` del cuadro es 1.71 (sub-P3 sobre MEQ_Mystical $\times \Delta$ global_efficiency, `loo_influence` = 0.51), bien por debajo del umbral 2σ . La firma cabecera del informe — $p = -0.886$ sobre MEQ_total/MEQ_Mystical $\times \Delta$ synch_entropy_assoc — tiene `loo_influence` de sólo 0.086 con sub-P3 fuera ($p_{\{-\text{sub-P3}\}} = -0.800$), lo que confirma cuantitativamente la inspección ad-hoc previa: la dirección negativa entropía-experiencia **no depende de ningún sujeto único**, ni siquiera del que es atípico en el sham check. La pieza queda cerrada como contrato formal en disco.

La cuarta es **la operacionalización de synch_entropy_assoc**. Como discute el callout-note de 3.1, la z-score por ROI introducida en el paso 1 del cálculo cambia la escala de la varianza espacial respecto a Carhart-Harris (2014, BOLD crudo), y los bordes de bin comunes intra-sujeto-y-red hacen que el agregado mezcle bits computados sobre anchos de bin distintos entre sujetos. R8 hereda esa decisión: el contraste pareado within-subject es bien-definido y los rankings que entran a Spearman

son interpretables, pero la *magnitud absoluta* del Δ entrópico no es comparable 1:1 con la Fig. 6 del paper. Esto pesa sobre la lectura cualitativa “la entropía no aumenta bajo psilocibina en este pipeline” — pesa sobre todo en la interpretación causal, no en la firma direccional con MEQ que es lo que R8 reporta.

Las cifras de R8 son **un punto de partida fenomenológico, no un cierre confirmatorio**. La firma direccional positiva entre experiencia subjetiva e integración global se alinea con el marco REBUS y con la literatura de campo; la firma direccional negativa entre experiencia subjetiva y entropía dinámica intra-red abre una pregunta empírica que la versión de cierre del TFM (con N ampliado o con triangulación cross-dataset en R8-LSD) debería contestar.

Bibliografía

1. Validation of the revised Mystical Experience Questionnaire.
2. Validation of the Emotional Breakthrough Inventory.
3. *Exploratory Data Analysis*.
4. Sample size requirements.
5. Psilocybin can occasion mystical-type experiences.
6. Altered network hub connectivity after acute LSD.
7. Increased global integration after psilocybin therapy.
8. The entropic brain.
9. Permutation p-values should never be zero.
10. Dynamical exploration of the repertoire of brain networks at rest.
11. REBUS and the anarchic brain.