连花清瘟胶囊功效详解报告

一、概述

连花清瘟胶囊（Lianhua Qingwen Jiaonang）是石家庄以岭药业股份有限公司自主研发的创新中药之一，于 2003 年在 SARS 疫情期间研发成功。该药物汲取汉代张仲景《伤寒论》麻杏石甘汤、明代吴又可《温疫论》、清代吴鞠通《温病条辨》银翘散三朝名方精华，结合现代药理研究创制而成。组方遵循中医"肺与大肠相表里"的理论，体现了中医药治疗疫病独特的学术思想。

项目	详情
通用名称	连花清瘟胶囊
批准文号	国药准字 Z20040063
执行标准	《中国药典》2020 年版一部
专利号	CN03143211.5（专利申请日：2003 年 7 月 1 日）
研发背景	2003 年 SARS 期间研发，基于中医络病理论
有效期	30 个月
包装规格	铝塑板装，2×12 粒/板/盒（每粒装 0.35 克）

二、主要功效与作用机制

2.1 中医功效

连花清瘟胶囊的核心功效为：**清瘟解毒，宣肺泄热。**

该药主要用于治疗流行性感冒属热毒袭肺证，以及新型冠状病毒肺炎轻型、普通型引起的发热、咳嗽、乏力等症状。在中医理论框架下，本方适用于外感温热之邪、内蕴郁热所致的各类呼吸道传染病。

2.2 现代药理作用机制

（1）多靶点协同作用

连花清瘟胶囊通过多药味、多靶点、多信号通道和多生物学功能发挥综合疗效。研究表明，其关键活性成分包括槲皮素、芦荟大黄素、汉黄芩素等，其中槲皮素度值最大、靶点数最多，具有抗炎、抗病毒和免疫调节等多重药理学作用。

（2）核心靶点蛋白结合

通过分子对接技术研究发现，以下关键靶点在药效发挥中起重要作用：

- **HSP90AA1**：来自连翘、甘草、苦杏仁、广藿香、绵马贯众的 30 个化学成分与该靶点蛋白分子对接 Total Score > 5.0，可触发自噬控制病毒感染
- **TLR9**：来自板蓝根、甘草、苦杏仁的 14 个化学成分与该靶点蛋白分子对接 Total Score > 5.0，可激活固有免疫系统，预防疾病进展和炎症并发症
- **ACE2**：苦杏仁苷、野黑樱苷、甘草酸、连翘苷 A、连翘苷 I、大黄酸、芦荟大黄素等 85 个体内成分可与 ACE2 结合，有效影响 ACE2 和 S 蛋白之间的结合而抑制新冠病毒入侵
- **MAPK1、IL6、NLRP3、AKT1** 等 12 个靶点蛋白也可形成稳定构象，具有较好结合活性

（3）分子对接关键化合物

研究表明，多个药材组合与靶蛋白形成了强效结合： - 连翘-MAPK1 - 甘草-MAPK1 - 金银花-NLRP3 - 甘草-苦杏仁-HSP90AA1 - 板蓝根-TLR9 - 金银花-AKT1

以上组合的 Total Score 均≥9.0，展现了强大的结合活性和药效潜力。

三、适应证与临床应用

3.1 官方批准适应证

（1）流行性感冒

用于治疗流行性感冒属热毒袭肺证，症见： - **发热或高热** - **恶寒** - **肌肉酸痛** - **鼻塞流涕** - **咳嗽** - **头痛** - **咽干咽痛** - **舌偏红，苔黄或黄腻**等

（2）新型冠状病毒肺炎

2020 年 4 月 12 日，经国家药品监督管理局批准，连花清瘟胶囊新增适应症——用于**新型冠状病毒肺炎轻型、普通型引起的发热、咳嗽、乏力。**这一审批标志着该药正式纳入新冠治疗方案。

（3）其他临床应用

- **急性咽炎**：感受风热毒邪引起，症见咽干、咽痛、咳嗽，或有发热，舌偏红，苔黄或黄腻
- **SARS（非典）**：曾在 2003 年非典疫情中大量使用
- **支气管肺炎**
- **上呼吸道感染**

3.2 重要临床研究证据

（1）新冠肺炎多中心随机对照研究（钟南山院士领衔）

由中国工程院院士钟南山团队主导的多中心、随机、对照临床研究显示：

- **研究对象**：纳入 284 例患者，分为连花清瘟组和常规治疗组
- **临床症状改善**：治疗 14 天后，主要临床症状（发热、乏力、咳嗽）消失率达 **91.5%**
- 治疗 7 天达 57.7%
- 治疗 10 天达 80.3%

- 治疗 14 天达 91.5%
- **影像学改善**：明显改善肺部 CT 影像学特征，治愈率显著提高
- **转重型率降低**：联合应用连花清瘟治疗的患者转重型率较对照组下降 50%
- **核酸转阴率**：联合应用连花清瘟治疗 14 天后，核酸转阴率达 **76%**

（2）甲型 H1N1 流感双盲对照研究

首都医科大学附属佑安医院完成的双盲、多中心、与磷酸奥司他韦对照的随机对照临床试验证实：

- 病毒核酸转阴时间与磷酸奥司他韦相当
- **咳嗽、咽痛、乏力、肌肉酸痛等症状缓解时间优于奥司他韦**
- 安全性良好，不良反应发生率较低

（3）奥密克戎变异株体外研究

2022 年 3 月的研究证实，连花清瘟对奥密克戎（Omicron）变异株具有显著抑制作用，对奥密克戎造成细胞损伤也有明显的改善作用。这为该药在新型变异株流行期间的持续应用提供了科学依据。

四、成分组成与方解

4.1 全方组成

药材名称	含量（每粒）	类别定位
北板蓝根	255 毫克	清热解毒主力
金银花	255 毫克	疏散风热
连翘	255 毫克	清热解毒
鱼腥草	255 毫克	清热解毒

药材名称	含量（每粒）	类别定位
绵马贯众	255 毫克	清热解毒
石膏	255 毫克	清热泻火
红景天	85 毫克	扶正固本
广藿香	85 毫克	芳香化湿
炙麻黄	85 毫克	宣肺平喘
甘草	85 毫克	调和诸药
炒苦杏仁	85 毫克	止咳平喘
大黄	51 毫克	通腑泻热
薄荷脑	7.5 毫克	疏散风热

辅料：玉米淀粉

4.2 方剂配伍解析

本方由十三味中药组成，配伍严谨，层次分明：

清热解毒主力组

- **连翘、金银花、板蓝根、鱼腥草**——疏散风热、清热解毒，针对外感温热毒邪发挥直接的抗感染作用

宣肺平喘组（麻杏石甘汤核心）

- **炙麻黄、炒苦杏仁、石膏**——宣肺泄热、止咳平喘，针对肺气壅滞、咳嗽气促发挥治疗作用

通腑泻热组

- **大黄**——通腑泄热，体现中医"肺与大肠相表里"的经典理论，借鉴明代名医吴又可治疫病用大黄的用药经验，通过通腑实现清肺、安肺的目的

芳香化湿组

- **广藿香**——化湿浊、辟秽浊，针对瘟疫期间湿浊内蕴的病机特点

扶正固本组

- **红景天**——调节免疫、抗炎、抗氧化应激、改善循环，增强机体抗病能力，防止正气受损

调和诸药组

- **甘草**——调和各药药性，缓和其他药物的烈性，保障整体用药的安全性

五、用法用量

5.1 连花清瘟胶囊

- **规格**：每粒装 0.35 克
- **用法**：口服，**一次 4 粒，一日 3 次**
- **建议**：餐后服用，以减少胃肠道刺激
- **疗程**：遵医嘱

5.2 连花清瘟颗粒（补充信息）

- **规格**：6g/袋
- **用法**：温水冲服，每次一袋，一日 3 次
- **建议**：餐后服用

5.3 疗程参考

- **流行性感冒**：一般遵医嘱服用
- **新型冠状病毒肺炎（轻型、普通型）**：疗程一般为 **7～10 天**

六、药理作用研究详述

6.1 抗病毒作用

连花清瘟胶囊展现出广谱的抗病毒活性：

- **抗流感病毒**：在体外对人甲型流感病毒具有预防病毒吸附、吸附后病毒增殖和直接杀伤三重作用，在 0.031g/ml 时可完全抑制病毒活性。对甲型流感病毒 H3N2 亚型和呼吸道合胞病毒也具有显著的抑制效果
- **抗新冠病毒（SARS-CoV-2）**：
- 半抑制浓度（IC_{50}）为 411.2μg/ml
- 显著抑制新冠病毒复制，影响病毒形态
- 显著抑制 SARS-CoV-2 诱导的炎症因子 TNF-α、IL-6、MCP-1 和 IP-10 的 mRNA 过度表达，呈剂量依赖关系
- 对奥密克戎（Omicron）变异株感染诱导的细胞病变有明显抑制作用
- **历史病原微生物**：既往研究表明可能对 MERS-CoV、SARS-CoV 等多种病毒有抑制活性

6.2 免疫调节作用

- 增强流感病毒感染小鼠的免疫功能
- 增加肺组织中干扰素-γ（IFN-γ）含量
- 增加 T 淋巴细胞群中 $CD4^+$含量和 $CD4^+/CD8^+$比值
- 通过 TLR9 靶点激活固有免疫系统

6.3 解热作用

- 可降低大肠埃希菌内毒素致发热家兔的体温，证实了其退热功效

6.4 抗炎作用

连花清瘟胶囊的抗炎机制涉及多条信号通路：

- 减轻急性放射性肺损伤大鼠的肺组织炎症反应

- 减少肺组织和血清中单核细胞趋化蛋白-1（MCP-1）表达和巨噬细胞的聚集
- 使 IL-6、TNF-α水平降低
- 对 LPS 致急性肺损伤小鼠能减轻肺组织炎性病变
- 减少外周血 T 细胞中 TNF-α、IL-1β、IL-8、IL-6 阳性细胞表达
- 升高肺组织中 Cx43、闭锁蛋白和 ZO-1 的表达
- 降低肺组织中 NF-κB、IκBα、IKKβ蛋白表达
- 通过调节多种炎症因子和信号炎症相关通路而抑制肺损伤

6.5 抑菌作用

- 有效抑制金黄色葡萄球菌、流感杆菌、肺炎球菌等常见呼吸道病原菌
- 破坏耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）生物膜形成（MIC 值为 20g/L）
- 抑制病毒叠加细菌感染导致的肺上皮细胞黏附因子表达
- 缓解 H1N1 继发性金黄色葡萄球菌感染所致肺损伤

6.6 其他药理作用

- 抑制体外培养乳腺癌 MCF-7 细胞增殖，引起细胞染色质异常和核固缩（初步研究）
- 红景天成分提供改善循环和抗氧化应激作用

七、注意事项与禁忌

7.1 不良反应

根据国家药品不良反应监测数据显示：

胃肠道反应（最常见）

约占所有不良反应的多数，多发生在服药后 3 小时以后，多为空腹服用导致；最迟在服药后一天后发生。具体表现为： - 恶心 - 呕吐 - 腹痛 - 腹泻 - 腹胀 - 反胃

其他不良反应

- **皮疹**：主要发生在服药后 30 分钟以内，且大都出现在初次服药后
- **瘙痒**
- **口干**
- **头晕**

提示：上述不良反应停药后可以自行缓解，无需特殊处理。

7.2 禁忌人群

- **对本品及本品成分过敏者忌服**

7.3 慎用人群（需在医师指导下服用）

慎用人群	原因说明
风寒感冒者	本品性味偏于寒凉，风寒感冒不适用
高血压患者	含有麻黄，有升高血压的作用
心脏病患者	麻黄可能加重心脏负担
过敏体质者	存在过敏风险
运动员	含有麻黄成分，可能构成违禁物质
生理期妇女	寒凉药物可能影响月经
肝肾功能不全严重者	未经控制者慎用
有慢性病患者	肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者需遵医嘱
儿童	应在医师指导下调整剂量
孕妇、哺乳期妇女	缺乏充分的安全性数据
年老体弱及脾虚便溏者	药物偏寒凉，易伤脾胃

7.4 日常注意事项

1. **饮食禁忌**：忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物
2. **中药配伍禁忌**：不宜在服药期间同时服用滋补性中药
3. **药物联用禁忌**：不宜与其他清热解毒药物一起服用（可能因寒凉过度造成便溏、腹泻等不良反应，如菊花、苦瓜、鱼腥草等）
4. **严格控量**：严格按用法用量服用，不宜长期服用
5. **非预防用药**：本品为治疗用药，非预防用药——无症状不推荐服用
6. **及时就医**：发热体温超过 38.5℃的患者，应去医院就诊
7. **限期观察**：服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊
8. **检查性状**：本品性状发生改变时禁止使用
9. **儿童监护**：儿童必须在成人监护下使用
10. **安全存放**：请将本品放在儿童不能接触的地方
11. **咨询专业人士**：如正在使用其他药品，使用前请咨询医师或药师
12. **防潮保存**：打开防潮袋后，请注意防潮

7.5 贮藏条件

密封，置阴凉处（不超过 20℃）

八、总结

连花清瘟胶囊作为我国自主研发的创新中药，经过二十余年的临床验证和科学研究，其在治疗流行性感冒和新型冠状病毒肺炎方面显示了良好的疗效。其独特之处体现在以下几个方面：

1. **古今融合**：汲取三朝名方精华，融合了古代经典方剂的智慧和现代医药科学的验证
2. **多靶点协同**：通过 13 味中药的复杂配伍，实现了多靶点、多维度的抗病毒和抗炎作用
3. **循证医学支撑**：拥有多项高质量临床研究证据支持，包括钟南山院士领衔的多中心随机对照试验

4. **安全性总体可控**：不良反应以胃肠道反应为主，停药后可恢复，整体安全性评价良好
5. **公共卫生价值**：自 2003 年 SARS 以来，已在多次公共卫生事件中大显身手，为我国中医药参与疫病防控做出了重要贡献

免责声明

以上内容来源于公开的网络检索资料及学术研究文献整理，仅供健康科普参考，不作为医疗诊断和治疗依据。

药品使用须严格遵循医嘱，消费者应仔细阅读药品说明书并在医生或药师指导下合理用药。如有不适或疑问，请及时就医或咨询专业医疗人员。

报告编制日期：2024 年 数据来源：网络公开检索资料、学术文献、临床研究报道