

Retained
Reversed
Attenuated / uncertain
a
Pairs with ≥x molecules
Complete IC50
Filtered repeats
85% singleton pairs
Shared molecules / pair
b
Same doc.
n=68,444; m=0.48
Cross doc.
n=11,366; m=0.48
|B − A| (pIC50)
c
12,392 pairs
Median MAD=0.18
Within-pair MAD (pIC50)
Pair median shift (pIC50)
d
n=73,950; loss=19.9%
A-oriented B gap (pIC50)
Assay-A gap (pIC50)
e
2,596 pairs
SAR-loss fraction
Analogue comparisons / pair
f
3,113 assay descriptions
ATP 160
NAD 9
NADH 3
NADPH 0
DTT 87
BSA 31
pH 228
Time 2029
Temp. 137
Numeric mention parsed (%)
g
Biochem.
Time
Media
Cell
Readout
n | pairs | median
ATP 760 | 196 | 18.7×
NAD 95 | 23 | 1.5×
Substrate 44 | 44 | 1.5×
Enzyme 9 | 9 | 1.3×
DTT 14 | 6 | 2.2×
pH 93 | 27 | 2.2×
Preincubation 1,261 | 292 | 1.3×
Reaction / treatment 1,883 | 350 | 1.2×
Albumin (%) 72 | 1 | 2.3×
Serum (%) 2 | 1 | 1.5×
Detergent (%) 9 | 2 | 1.4×
Additive ± 329 | 24 | 4.8×
Cell line / host 46 | 32 | 1.4×
Readout 9 | 7 | 3.6×
IC50 fold difference
h
452 targets
Top 10: 62% of queries
Comparisons covered (%)
Targets retained (%)
i
n=1,705–13,688
Task 1
n=2,039–4,420
Task 2
Test positive fraction (%)