Table 1

90% simultaneous lower confidence bounds for individual treatment-effect quantiles

Method	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Panel A: Inference sample (n = 1,100)										
Wilcoxon	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	-6.00	-3.00	-1.00	1.00	2.00
Stephenson (s=6)	$-\infty$	$-\infty$	-9.00	-6.00	-4.00	-3.00	-2.00	-1.00	1.00	2.00
RKS	-15.00	-10.00	-7.00	-5.00	-3.00	-2.00	-1.00	1.00	2.00	3.00
RKS + naive (pretest)	-11.00	-6.00	-4.00	-3.00	-1.00	-1.00	0.00	1.00	1.00	2.00
RKS + optimal (pretest)	-9.00	-5.00	-4.00	-2.00	-1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00
RKS + optimal (pretest + sex)	-9.00	-5.00	-4.00	-2.00	-1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00
Panel B: Full sample (n = 2,200)										
Wilcoxon	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	-6.00	-3.00	-1.00	1.00	2.00
Stephenson (s=6)	$-\infty$	$-\infty$	-9.00	-6.00	-4.00	-3.00	-2.00	-1.00	1.00	2.00
RKS	-13.00	-9.00	-7.00	-5.00	-3.00	-2.00	0.00	1.00	2.00	3.00
RKS + naive (pretest)	-11.00	-6.00	-4.00	-3.00	-2.00	-1.00	0.00	1.00	1.00	2.00
RKS + optimal (pretest)	-12.00	-6.00	-4.00	-3.00	-2.00	-1.00	0.00	1.00	2.00	2.00
RKS + optimal (pretest + sex)	-12.00	-6.00	-4.00	-3.00	-2.00	-1.00	0.00	1.00	2.00	2.00