



Linear Algebra

高等代数作业

作者： JJK

组织： Jiang Xi science and technology University


时间： January 30, 2020

版本： 1.00

Even though the truth is not a happy time, we have to be honest ,because more effort needed to cover the truth. — Bertr Russell

第1章 高等代数

1.1 作业

 **练习 1.1** 用正交变换化二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_2^2 - 2x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 8x_2x_3$ 为标准型,并给出所用的正交变换.

解 这个实二次型的矩阵 A 为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix}. \quad (1.1)$$

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 & -2 \\ 2 & \lambda + 2 & -4 \\ -2 & 2 - 4 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2(\lambda + 7). \quad (1.2)$$

A 的全部特征值是 2(二重), -7.

对特征值 2, 求出 $(2I - A)X = 0$ 的基础解系:

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (1.3)$$

对特征值 -7, 求出 $(-7I - A)X = 0$ 的基础解系:

$$\alpha_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}. \quad (1.4)$$

得到三个线性无关的特征向量

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}. \quad (1.5)$$

将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 正交化

$$\begin{aligned}
 \beta_1 &= \alpha_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\
 \beta_2 &= \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \begin{bmatrix} -\frac{4}{5} \\ 0 \\ \frac{8}{5} \end{bmatrix} \\
 \beta_3 &= \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned} \tag{1.6}$$

再将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 单位化得 μ_1, μ_2, μ_3 即

$$T = \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{\sqrt{5}}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2\sqrt{5}}{5} & 0 \end{bmatrix} \tag{1.7}$$


则 T 是正交矩阵, 且 $T^{-1}AT = \text{diag}\{2, 2, -7\}$.

令

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = T \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}. \tag{1.8}$$

则

$$f(y_1, y_2, y_3) = 2y_1^2 + 2y_2^2 - 7y_3^2. \tag{1.9}$$

 **练习 1.2** 设 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 - x_2^2 + ax_3^2 = 2x_1x_2 - 8x_1x_3 + 2x_2x_3$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准型为 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2$, 求 a 的值及一个正交矩阵 Q .

解 因为标准型为 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2$ 所以 $\det(A) = 0$ 得 $a = 2$:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -4 \\ 1 & -1 & 1 \\ -4 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad |\lambda I - A| = (\lambda - 6)(\lambda + 3)\lambda = 0 \tag{1.10}$$

$\lambda = 6, \lambda = -3, \lambda = 0$ 的特征向量分别为:

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{1.11}$$

将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 单位化, 即得:

$$T = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \quad (1.12)$$

则 T 是正交矩阵, 且 $T^{-1}AT = \text{diag}\{6, -3, 0\}$.

令

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = T \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}. \quad (1.13)$$

则

$$f(y_1, y_2, y_3) = 6y_1^2 - 3y_2^2. \quad (1.14)$$

练习 1.3 用正交变换化二次型

$$f(x_1, \dots, x_4) = 2(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + x_1x_2 + x_3x_4) \quad (1.15)$$

为标准型, 并给出所用的正交线性变化.

解 二次型方程的矩阵 A 为

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}, |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda - 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 3)^2(\lambda - 1)^2. \quad (1.16)$$

A 的全部特征值是3, 1.

对特征值3, 求出 $(3I - A)X = 0$ 的基础解系:

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (1.17)$$

把 α_1, α_2 单位化, 得

对特征值1, 求出 $(I - A)X = 0$ 的基础解系:

$$\alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_4 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (1.18)$$

因 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 已经为正交向量组,即正交化得:


$$T = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix} \quad T'AT = D = \text{diag}(3, 3, 1, 1); \quad (1.19)$$

令

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = T \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix}. \quad (1.20)$$

则

$$f(y_1, y_2, y_3, y_4) = 3y_1^2 + 3y_2^2 + y_3^2 + y_4^2. \quad (1.21)$$

 **练习 1.4** 求一个正交变换将二次型

$$f = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_2x_3 \quad (1.22)$$

化成标准形.

解 二次型矩阵 A 为

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad (1.23)$$

解得 $\lambda_1 = 5, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 1$ 以及对应的特征向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为:

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (1.24)$$

对 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 单位化得:


$$T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \quad T'AT = D = \text{diag}(5, 2, 1); \quad (1.25)$$

令

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = T \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}. \quad (1.26)$$

则

$$f(y_1, y_2, y_3) = 5y_1^2 + 2y_2^2 + y_3^2. \quad (1.27)$$

 **练习 1.5** 设 A 是一个 n 阶正定矩阵, 则 $|A + I| > 1$ 。

证明 设 A 的 n 个实特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$

有正交矩阵 C 使得 $A = (C')^{-1}DC^{-1}$

$$|A + I| = |CDC' + I| = |CDC' + CC'| = |C||DC' + C'| = |D + I||C|^2 = (\lambda_1 + 1) \cdots (\lambda_n + 1) > 1 \quad (1.28)$$

且 $\lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$ 即

$$|A + I| > 1. \quad (1.29)$$

 **练习 1.6** 设 n 阶实对称矩阵 A 正定, 证明 A^* 也是正定矩阵, 其中 A^* 表示 A 的伴随矩阵.


证明 存在实矩阵 C , 使得

$$A = C'C, \quad A^{-1} = C^{-1}I(C^{-1})' \quad (1.30)$$

即 $A^{-1} \simeq I$ 得 A^{-1} 是正定的.

$$\begin{aligned} A^* &= |A|A^{-1} \\ &= |A|C^{-1}I(C^{-1})' \\ &= (\sqrt{|A|}C^{-1})'I(\sqrt{|A|}C^{-1})' \end{aligned} \quad (1.31)$$

即 $A \simeq I$

 **练习 1.7** 设 n 阶方阵 A 满足条件 $A'A = I$, 其中 A' 是 A 的转置矩阵, I 为单位矩阵, 证明 A 的实特征向量所对应的特征值的绝对值等于1.

证明 已知 $A' = A^{-1}$

由于 $|\lambda I| = |(\lambda I - A)'| = |\lambda I - A'| = |\lambda I - A^{-1}| = |A^{-1}||\lambda I - A| =$

$$\frac{1}{|A|} \frac{1}{\lambda} (-1)^n |\lambda I - A| \quad (1.32)$$

所以 $\frac{1}{|A|} \frac{1}{\lambda} (-1)^n = 1$, 而 $|AA'| = |A|^2 = 1$, 所以 $|\lambda| = 1$

 **练习 1.8** 设 $f(x_1, \dots, x_n) = X^T AX$ 是一实二次型, 若存在 n 维实向量

$$X_1, X_2, \text{ s.t., } X_1^T AX_1 > 0, X_2^T AX_2 < 0, \quad (1.33)$$

证明: 存在 n 维实向量 A , s.t., $A'AA = 0$.

证明 设 A 的秩为 r , 作实非退化线性替换 $X = CY$, 将 f 化为规范形

$$f(x_1, \dots, x_n) = X^T AX = y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_{p+q}^2 \quad (r = p + q) \quad (1.34)$$

由于存在两个向量 X_1, X_2 , 使 $X_1^T AX_1 > 0, X_2^T AX_2 < 0$, 从而可得 $p > 0, q > 0$.

令

$$y_1 = y_{p+1} = 1, y_2 = \cdots = y_p = y_{p+2} = \cdots = y_{p+q} = 0, \quad (1.35)$$


取 n 维列向量

$$X_0 = C \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad (1.36)$$

中间的1位于第 $p+1$ 行.

由于 $X = CY$ 非退化,故 $X_0 \neq 0$,且有

$$X_0' A X_0 = 0 \quad (1.37)$$

 **练习 1.9** 设 A 是 n 阶实对称矩阵,证明:

$$\exists c > 0, s.t., \forall X \in \mathbf{R}^n, |X^T A X| \leq c X^T X. \quad (1.38)$$

证明 设 A 的全部特征值是 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.则 $tI + A$ 的全部特征值为 $t + \lambda_1, \dots, t + \lambda_n$,当 $t > S_r(A)$ 时.

$$t + \lambda_i \geq t - |\lambda_i| \geq t - S_r(A) > 0, i = 1, \dots, n. \quad (1.39)$$

即 $tI + A$ 为正定矩阵.同理 $tI - A$ 也为正交矩阵.


任意一个实 n 阶向量 X ,都有.

$$X'(cI + A)X \geq 0, X'(cI - A) \geq 0 \quad (1.40)$$

$$-cX'X \leq X'AX \leq cX'X \quad (1.41)$$

即

$$|X'AX| \leq cX'X \quad (1.42)$$

 **练习 1.10** (1)证明:如果 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}x_i x_j (a_{ij} = a_{ji})$ 是正定二次型.那么

$$f(y_1, \dots, y_n) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & y_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & y_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & y_n \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n & 0 \end{bmatrix} \quad (1.43)$$

是负定二次型;

(2)如果 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ 是正定矩阵,那么

$$|A| \leq a_{nn} P_{n-1}, \quad (1.44)$$

其中 \mathbf{P}_{n-1} 是 \mathbf{A} 的 $n-1$ 阶顺序主子式;

$$(3) |\mathbf{A}| \leq a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}.$$

证明 (1) 作变换 $\mathbf{Y} = \mathbf{AZ}$ 即

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{bmatrix} \quad (1.45)$$

则

$$\begin{aligned} f(y_1, \cdots, y_n) &= \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & a_{11}z_1 + \cdots + a_{1n}z_n \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & a_{n1}z_1 + \cdots + a_{nn}z_n \\ y_1 & \cdots & y_n & 0 \end{vmatrix} \\ &\xrightarrow[(i=1, \cdots, n-1)]{c_n - z_n c_i} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & 0 \\ y_1 & \cdots & y_n & -(y_1z_1 + \cdots + y_nz_n) \end{vmatrix} \\ &= -|\mathbf{A}|(y_1z_1 + \cdots + y_nz_n) \\ &= -|\mathbf{A}|\mathbf{Y}'\mathbf{Z} = -|\mathbf{A}|\mathbf{Z}'\mathbf{AZ} \end{aligned} \quad (1.46)$$

由 \mathbf{A} 为正定矩阵知, $f(y_1, y_2, \cdots, y_{n-1})$ 为负定二次型.

证明 (2) 记

$$g'(y_1, y_2, \cdots, y_n) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} & y_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} & y_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,n-1} & y_n \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_{n-1} & 0 \end{vmatrix} \quad (1.47)$$


由(1)可知, $g'(y_1, y_2, \cdots, y_{n-1})$ 负定

$$|\mathbf{A}| = g'(a_{n1}, \cdots, a_{n,n-1}) + a_{nn}\mathbf{P}_{n-1} \quad (1.48)$$

由于 $g'(a_{n1}, \cdots, a_{n,n-1}) < 0$, 所以 $|\mathbf{A}| \leq a_{nn} \cdot \mathbf{P}_{n-1}$.

证明 (3) 由(2), 得

$$|\mathbf{A}| \leq a_{nn}, |\mathbf{P}_{n-1}| \leq a_{nn}a_{n-1,n-1}, |\mathbf{P}_{n-2}| \leq \cdots \leq a_{nn}a_{n-1,n-1} \cdots a_{11} \quad (1.49)$$

 **练习 1.11** 设 \mathbf{A}, \mathbf{B} 都是 $n \times n$ 实对称矩阵, 且 \mathbf{A} 正定,

(1) 证明: 存在实可逆矩阵 \mathbf{T} , 使得 $\mathbf{T}'(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{T}$ 为对角矩阵;

(2) 假设 \mathbf{B} 也正定. 证明: $|\mathbf{A} + \mathbf{B}| \geq |\mathbf{A}| + |\mathbf{B}|$.

(3) 假设 \mathbf{B} 也正定, 且 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$, 证明 \mathbf{AB} 也是正定矩阵.

证明 (1)

A 正定, 所以存在正交矩阵 $P^{-1} = P'$ 使得,

$$P'AP = \text{diag}(a_1, \cdots, a_n), \quad (1.50)$$

$a_1, \cdots, a_n > 0$ 为 A 的特征值.

$P'BP = P^{-1}BP$ 也是对称矩阵, 且与 B 有相同的特征值. 所以存在正交矩阵 $Q^{-1} = Q'$ 使得,

$$Q'(P'BP)Q = Q^{-1}(P^{-1}BP)Q = \text{diag}(b_1, \cdots, b_n), \quad (1.51)$$

其中 b_1, \cdots, b_n 为 B 的特征值. 所以:

$$Q'(P'(A+B)P)Q = Q^{-1}(P^{-1}(A+B)P)Q = \text{diag}(a_1 + b_1, \cdots, a_n + b_n). \quad (1.52)$$

所以存在实可逆矩阵 $T = PQ$, 使得 $T'(A+B)T$ 为对角矩阵.

证明 (2)

B 也正定, 因此 $b_1, \cdots, b_n > 0$.

$$\begin{aligned} |Q'(P'(A+B)P)Q| &= |\text{diag}(a_1 + b_1, \cdots, a_n + b_n)| \\ &= \prod_{i=1}^n (a_i + b_i) \\ &> \prod_{i=1}^n a_i + \prod_{i=1}^n b_i \\ &= |P^{-1}AP| + |P^{-1}BP| = |A| + |B|. \\ \Rightarrow |A+B| &\geq |A| + |B|. \end{aligned} \quad (1.53)$$

证明 (3) 存在一个 n 级正交矩阵 T , s.t.

$$T'AT = \text{diag}\{\lambda_1, \cdots, \lambda_n\} \quad T'BT = \text{diag}\{\mu_1, \cdots, \mu_n\}. \quad (1.54)$$

其中 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$ 是 A 的全部特征值, μ_1, \cdots, μ_n 是 B 的全部特征值. A, B 都是正定矩阵, 由于:

$$T'(AB)T = (T'AT)(T'BT) = \text{diag}\{\lambda_1\mu_1, \cdots, \lambda_n\mu_n\} \quad (1.55)$$

即 AB 合同与 $\text{diag}\{\lambda_1\mu_1, \cdots, \lambda_n\mu_n\}$, 所以 AB 是正定矩阵.

练习 1.12 化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 5x_2^2 - 8x_2x_3 + 5x_3^2 \quad (1.56)$$

为标准型并写出线性变换.

证明 二次型 f 的矩阵 A , 以及 A 的全部特征值以及特征向量为:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{bmatrix}; \quad (1.57)$$

$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的特征值分别为 10, 1, 1 特征向量分别为

$$\boldsymbol{v}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{v}_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (1.58)$$

将 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3$ 正交化, 单位化得 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$:

$$\boldsymbol{\beta}_1 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{\beta}_2 = \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{\beta}_3 = \begin{bmatrix} -\frac{2}{3\sqrt{5}} \\ \frac{5}{3\sqrt{5}} \\ \frac{4}{3\sqrt{5}} \end{bmatrix} \quad (1.59)$$

即

$$\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{3\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{3} & 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{T}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{T} = \boldsymbol{D} = \text{diag}(10, 1, 1); \quad (1.60)$$

令

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \boldsymbol{T} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}. \quad (1.61)$$

则

$$f(y_1, y_2, y_3) = 10y_1^2 + y_2^2 + y_3^2. \quad (1.62)$$

练习 1.13 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + (a-1)x_3^2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3. \quad (1.63)$$

(1) 求二次型 f 的矩阵的所有特征值;

(2) 若二次型的规范性为 $y_1^2 + y_2^2$, 求 a 的值和各特征值的一个特征向量.

证明 (1) 二次型的矩阵 \boldsymbol{A} 为:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & a & -1 \\ 1 & -1 & a-1 \end{bmatrix} \quad |\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - a & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - a & 1 \\ -1 & 1 & \lambda - (a-1) \end{vmatrix} \quad (1.64)$$


解得 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的特征值分别为 $a-2, a, a+1$, 特征向量分别为

$$\boldsymbol{v}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (1.65)$$

证明 (2) 若规范性为 $y_1^2 + y_2^2$, a 只能为 2, 即:

$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的特征值分别为 0, 2, 3, 特征向量分别为

$$v_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (1.66)$$

 **练习 1.14** 若 $n \times n$ 矩阵 A 可逆,

(1) 证明 $A'A$ 正定.

(2) 证明: 存在正交矩阵 P, Q , 使得

$$P'AQ = \text{diag}(a_1, \dots, a_n), \text{ where } a_i > 0, i = 1, \dots, n. \quad (1.67)$$

证明 (1)

$$A'A = A'IA \quad (1.68)$$

因此 $A'A$ 合同与单位矩阵, 即 $A'A$ 正定.

证明 (2) $A'A$ 正定, 因此存在正交矩阵 P , 使得

$$P'A'AP = \text{diag}(b_1, \dots, b_n), \text{ where } b_i > 0, i = 1, \dots, n. \quad (1.69)$$

令


$$D = \text{diag}(\sqrt{b_1}, \dots, \sqrt{b_n}), Q = A'PD, \quad (1.70)$$

容易求得

$$Q'Q = (A'PD)'A'PD = I_n, \quad (1.71)$$

因此矩阵 Q 为正交矩阵, 令 $a_i = \sqrt{b_i}, i = 1, \dots, n$. 则

$$P'AQ = D = \text{diag}(a_1, \dots, a_n). \quad (1.72)$$

 **练习 1.15** 求线性方程组
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + 0x_3 - 2x_4 = 0 \\ 3x_1 + x_2 + 9x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$
 的解空间 W 及其正交补空间 W^\perp .

证明 系数矩阵作初等行变换得:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & -1 \\ 3 & 2 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & 9 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 1 & -9 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (1.73)$$

因此, 方程组的两个线性无关的向量为:

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} -6 \\ 9 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (1.74)$$


$W = L(\alpha_1, \alpha_2)$. 设正交补空间 W^\perp 的任一向量为 $\beta = (y_1, y_2, y_3, y_4)'$. 则 $\alpha_1' \beta = \alpha_2' \beta = 0$. 即

$$\begin{cases} y_2 + y_4 = 0 \\ -6y_1 + 9y_2 + y_3 = 0 \end{cases} \quad (1.75)$$

因此, 上面的方程组的两个线性无关的向量为:

$$\beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix}, \beta_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}. \quad (1.76)$$

所以, 正交补空间 $W^\perp = L(\beta_1, \beta_2)$.

 **练习 1.16** 设 σ 是有限维线性空间 V 的可逆线性变换. 设 W 是 V 中 σ -不变子空间, 证明: W 是 V 中 σ^{-1} -不变子空间.

证明 已知 $\alpha \in W, \sigma(\alpha) \in W$.

设 $\sigma(\alpha) = \beta$, 因 σ 可逆, 即若:

$$\sigma^{-1}(\beta) = \alpha \quad \beta \text{ and } \sigma^{-1}(\beta) \in W \quad (1.77)$$


所以 W 是 V 中 σ^{-1} -不变子空间

下证 σ 为双射:

证明 设 σ 为可逆变换, 它的逆变换为 σ^{-1} .

任取 $\xi, \eta \in W$, 且 $\xi \neq \eta$, 则必有 $\sigma(\xi) \neq \sigma(\eta)$. 不然, 设 $\sigma(\xi) = \sigma(\eta)$, 两边左乘 σ^{-1} , 有 $\xi = \eta$, 这与条件矛盾, 所以 σ 是单射.

其次, 对任一向量 $\xi \in W$, 必有 η 使 $\sigma(\eta) = \xi$, 事实上, 令 $\sigma^{-1}(\xi) = \eta$ 即可, 所以 σ 是满射, 故 σ 是双射, 即 $\sigma^{-1}(\beta) = \alpha$.

 **练习 1.17** 设 σ 是正交变换, 证明: σ 的不变子空间的正交补也是 σ 的不变子空间.

证明 设 W 是 σ 的任意一个不变子空间, 取 W 的一组标准正交基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m$, 把它扩成 V 的一组标准正交基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m, \varepsilon_{m+1}, \dots, \varepsilon_n$, 由

$$\dim(W) + \dim(W^\perp) = n \quad (1.78)$$

$$W = L(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m), \quad W^\perp = L(\varepsilon_{m+1}, \dots, \varepsilon_n). \quad (1.79)$$

又 σ 是正交变换, 则 $\sigma(\varepsilon_1), \dots, \sigma(\varepsilon_n)$ 也是标准正交基, 由于 W 是 σ 的不变子空间, 所以 $\sigma(\varepsilon_1), \dots, \sigma(\varepsilon_m) \in W$. 且为 W 的一组标准正交基, 从而 $\sigma(\varepsilon_{m+1}, \dots, \sigma(\varepsilon_n)) \in W^\perp$


任取 $\alpha \in W^\perp$ 则

$$\alpha = k_{m+1}\varepsilon_{m+1} + \dots + k_n\varepsilon_n \in W^\perp, \quad (1.80)$$

所以

$$\sigma(\alpha) = k_{m+1}\sigma(\varepsilon_{m+1}) + \dots + k_n\sigma(\varepsilon_n) \in W^\perp. \quad (1.81)$$

W^\perp 是 σ 的不变子空间.


 **练习 1.18** 证明: 反对称矩阵的特征值为 0 或者纯虚数.

证明 设 A 是反对称实矩阵, λ 是 A 的一个特征值, ξ 为相应的特征向量,即 $A\xi = \lambda\xi$,则


$$\bar{\xi}' A \xi = \bar{\xi}' (-A') \xi = -\bar{\xi}' A' \xi = -(A \bar{\xi})' \xi = -(\overline{A \xi})' \xi \quad (1.82)$$

即有 $\lambda \bar{\xi} \xi = -\bar{\lambda} \bar{\xi} \xi$,从而 $\lambda = -\bar{\lambda}$.

令 $\lambda = a + ib$,代入上式得 $a + ib = -(a - ib)$,即有 $a = 0$.故 λ 是0或纯虚数.

 **练习 1.19** 如果 λ 是正交矩阵 A 的特征值,则 $\frac{1}{\lambda}$ 也是正交矩阵 A 的特征值.

证明 设 λ 是 A 的特征值,已知 λ^{-1} 是 A^{-1} 的特征值,由于 A 是正交矩阵, $A' = A^{-1}$,所以 λ^{-1} 是 A' 的特征值.因为 A 与 A' 有相同的特征值,所以 λ^{-1} 也是 A 的特征值.

 **练习 1.20** 设 A, B 都是实对称矩阵,证明:存在正交矩阵 Q , s.t., $Q^{-1} A Q = B$ 的充要条件为 A, B 的特征多项式的根全部相同.

证明 必要性.若 $T' A T = B$,即 A, B 相似,则 A, B 的特征多项式相同,所以它们的特征根相同.


充分性.设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为 A 和 B 的特征值,由 A, B 为实对称矩阵,则存在正交矩阵 X 和 Y ,使

$$X^{-1} A X = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} = Y^{-1} B Y \quad (1.83)$$

于是

$$Y X^{-1} A X Y^{-1} = B \quad (1.84)$$

令 $T = X Y^{-1}$,由 X, Y 是正交矩阵知, T 也是正交矩阵,且有 $T^{-1} A T = B$.

 **练习 1.21** 设 A 是 n 阶实对称矩阵,且 $A^2 = A$.证明:存在正交矩阵

$$Q, \text{ s.t., } Q^{-1} A Q = \text{diag} (1, \dots, 1, 0, \dots, 0). \quad (1.85)$$

证明 设 λ 是 A 的任意特征值, ξ 是属于 λ 的特征向量,则 $A\xi = \lambda\xi$,从而

$$A^2 \xi = A(A\xi) = A(\lambda\xi) = \lambda A\xi = \lambda^2 \xi. \quad (1.86)$$

又由于 $A^2 = A$,所以有 $\lambda^2 \xi = A^2 \xi = A\xi = \lambda\xi$,即 $(\lambda^2 - \lambda)\xi = 0$,因为 $\xi \neq 0$,故 $\lambda^2 - \lambda = 0$,从而 $\lambda = 0$ 或 1 ,再由定理7知,存在正交矩阵 Q ,使

$$Q^{-1} A Q = \text{diag} (1, \dots, 1, 0, \dots, 0). \quad (1.87)$$

在上式中的对角线元素中,1的个数为 A 的特征值1的个数,0的个数为 A 的特征值0的个数.