第八讲正规子群、商群

陈建文

November 5, 2022

定义1. 设G为一个群,G的任意子集称为群子集。在 2^G 中借助于G的乘法引入一个代数运算,称为群子集的乘法: $\forall A,B\in 2^G$,

$$AB = \{ab | a \in A \coprod b \in B\}$$

对任意的 $A \in 2^G$, 定义

$$A^{-1} = \{a^{-1} | a \in A\}$$

定理1. 设G为一个群,则 $\forall A, B, C \in 2^G$,(AB)C = A(BC)。

定理2. 设G为一个群,则 $\forall A, B \in 2^G$, $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ 。

定理3. 设G为一个群,H为G的一个子群,则 $HH=H,H^{-1}=H,HH^{-1}=H\circ$

定理4. 设A, B为群G的子群,则AB为G的子群的充分必要条件为AB = BA。

证明. ⇒设AB为G的子群,则 $AB = (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} = BA$ 。

⇐设AB = BA, 往证AB为G的子群。

由(AB)(AB) = A(BA)B = A(AB)B = (AA)(BB) = AB知G中的运算在AB中封闭。其次, $\forall a \in A, b \in B, (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} \in BA = AB$ 。所以AB为G的子群。

例. 设H为G的一个子群且 $H \neq \{e\}$ 。 如果存在一个元素 $x_0 \in G$ 使得 $H(x_0^{-1}Hx_0) = G$,则 $H \cap (x_0^{-1}Hx_0) \neq \{e\}$ 。

证明. 因为 $x_0 \in G = H(x_0^{-1}Hx_0)$,所以 $\exists h_1, h_2 \in H$ 使得 $x_0 = h_1x_0^{-1}h_2x_0$,从而 $e = h_1x_0^{-1}h_2$ 。于是, $x_0 = (h_1^{-1}h_2^{-1})^{-1} = h_2h_1 \in H$,从而 $x_0^{-1}Hx_0 = H$ 。因此, $H \cap (x_0^{-1}Hx_0) = H \neq \{e\}$ 。

定义2. 设H为群G的子群,如果 $\forall a \in G$, aH = Ha,则称H为G的正规子群。

定理5. 设H为群G的一个子群,则下列四个命题等价:

- (1) H为群G的正规子群;
- (2) $\forall a \in G, aHa^{-1} = H;$
- (3) $\forall a \in G, aHa^{-1} \subseteq H$;
- (4) $\forall a \in G, \forall h \in H, aha^{-1} \in H$.

定理6. 设H为群G的正规子群,则H的所有左陪集构成的集族 S_l 对群子集乘法形成一个群。

定理7. 设H为群G的正规子群,H的所有左陪集构成的集族为 S_l ,在 S_l 上定义乘法运算如下: $\forall aH, bH \in S_l, (aH)(bH) = (ab)H$,则 S_l 对于在其上定义的乘法构成一个群。

定义3. 群G的正规子群H的所有左陪集构成的集族,对群子集乘法构成的群称为G对H的商群,记为G/H。

课后作业题:

练习1. 设A和B为群G的两个有限子群,证明:

$$|AB| = \frac{|A||B|}{|A \cap B|}$$

练习2. 利用上题的结论证明: 六阶群中有唯一的一个三阶子群。

练习3. 设G为一个 n^2 阶的群,H为G的一个n阶子群。证明: $\forall x \in G, x^{-1}Hx \cap H \neq \{e\}$ 。

练习4. 证明: 指数为2的子群为正规子群。

练习5. 证明: 两个正规子群的交还是正规子群。

练习6. 设H为群G的子群,N为群G的正规子群,试证: NH为群G的子群。

练习7. 设G为一个阶为2n的交换群,试证: G必有一个n阶商群。

练习8. 设H为群G的子群,证明:H为群G的正规子群的充分必要条件是H的任意两个左陪集的乘积还是H的一个左陪集。