

第九讲同态基本定理

陈建文

October 30, 2022

定义1. 设 (G_1, \circ) 与 $(G_2, *)$ 为两个群, 如果存在一个从 G_1 到 G_2 的映射 ϕ , 使得 $\forall a, b \in G_1$,

$$\phi(a \circ b) = \phi(a) * \phi(b)$$

则称 G_1 与 G_2 同态, ϕ 称为从 G_1 到 G_2 的一个同态 (*homomorphism*)。如果同态 ϕ 是满射, 则称 ϕ 为从 G_1 到 G_2 的一个满同态, 此时称 G_1 与 G_2 为满同态, 并记为 $G_1 \sim G_2$ 。类似的, 如果同态 ϕ 为单射, 则称 ϕ 为单同态。

定理1. 设 (G_1, \circ) 与 $(G_2, *)$ 为两个群, e_1 和 e_2 分别为其单位元, ϕ 为从 G_1 到 G_2 的同态, 则

$$\begin{aligned}\phi(e_1) &= e_2 \\ \forall a \in G_1 \phi(a^{-1}) &= (\phi(a))^{-1}\end{aligned}$$

证明. 由 $\phi(e_1) = \phi(e_1 \circ e_1) = \phi(e_1) * \phi(e_1)$ 知 $\phi(e_1) = e_2$ 。 $\forall a \in G_1, \phi(a^{-1}) * \phi(a) = \phi(a^{-1} \circ a) = \phi(e_1) = e_2$ 知 $(\phi(a))^{-1} = \phi(a^{-1})$ 。 \square

定理2. 设 (G_1, \circ) 为一个群, G_2 为一个具有二元代数运算 $*$ 的代数系。如果存在一个满射 $\phi: G_1 \rightarrow G_2$ 使得 $\forall a, b \in G_1$

$$\phi(a \circ b) = \phi(a) * \phi(b)$$

则 $(G_2, *)$ 为一个群。

证明. $\forall x, y, z \in G_2$, 由 ϕ 为满射知 $\exists a, b, c \in G_1$ 使得 $\phi(a) = x, \phi(b) = y, \phi(c) = z$, 从而 $(x * y) * z = (\phi(a) * \phi(b)) * \phi(c) = \phi(a \circ b) * \phi(c) = \phi((a \circ b) \circ c)$, $x * (y * z) = \phi(a) * (\phi(b) * \phi(c)) = \phi(a) * \phi(b \circ c) = \phi(a \circ (b \circ c))$, $(x * y) * z = x * (y * z)$, 这验证了在 G_2 中 $*$ 运算满足结合律。

$\forall x \in G_2$, 由 ϕ 为满射知 $\exists a \in G_1$ 使得 $\phi(a) = x$, 于是 $\phi(e) * x = \phi(e) * \phi(a) = \phi(e \circ a) = \phi(a) = x$ 。

$\forall x \in G_2$, 由 ϕ 为满射知 $\exists a \in G_1$ 使得 $\phi(a) = x$, 于是 $\phi(a^{-1}) * \phi(a) = \phi(a^{-1} \circ a) = \phi(e) = e$ 。 \square

定理3. 设 ϕ 为从群 (G_1, \circ) 到群 $(G_2, *)$ 的同态, 则

- (1) 如果 H 为 G_1 的子群, 那么 $\phi(H)$ 为 G_2 的子群;
- (2) 如果 H 为 G_2 的子群, 那么 $\phi^{-1}(H)$ 为 G_1 的子群;
- (3) 如果 N 为 G_2 的正规子群, 那么 $\phi^{-1}(N)$ 为 G_1 的正规子群。

证明. 以下设 G_1 的单位元为 e_1 , G_2 的单位元为 e_2 。

(1) $e_2 = \phi(e_1) \in \phi(H)$, 从而 $\phi(H)$ 非空。

$\forall x, y \in \phi(H)$, $\exists a, b \in H$ 使得 $x = \phi(a)$, $y = \phi(b)$, 则 $x * y^{-1} = \phi(a) * \phi(b)^{-1} = \phi(a) * \phi(b^{-1}) = \phi(a \circ b^{-1}) \in \phi(H)$ 。

以上验证了 $\phi(H)$ 为 G_2 的子群。

(2) 由 $\phi(e_1) = e_2$ 知 $e_1 \in \phi^{-1}(H)$, 从而 $\phi^{-1}(H)$ 非空。

$\forall a, b \in \phi^{-1}(H)$, 则 $\phi(a) \in H$, $\phi(b) \in H$, 从而 $\phi(ab^{-1}) = \phi(a) * \phi(b^{-1}) = \phi(a) * \phi(b)^{-1} \in H$, 于是 $ab^{-1} \in \phi^{-1}(H)$ 。

这验证了 $\phi^{-1}(H)$ 为 G_1 的子群。

(3) 由 (2) 知 $\phi^{-1}(N)$ 为 G_1 的子群。

$\forall g \in \phi^{-1}(N)$, $a \in G$, $\phi(aga^{-1}) = \phi(a)\phi(g)\phi(a^{-1}) = \phi(a)\phi(g)\phi(a)^{-1} \in N$, 从而 $aga^{-1} \in \phi^{-1}(N)$, 于是 $a\phi^{-1}(N)a \subseteq \phi^{-1}(N)$, 因此 $\phi^{-1}(N)$ 为 G_1 的正规子群。□

定理4. 设 ϕ 为从群 G_1 到群 G_2 的满同态, N 为 G_1 的正规子群, 则 $\phi(N)$ 为 G_2 的正规子群。

证明. $\phi(N)$ 显然为 G_2 的子群。

$\forall g \in \phi(N)$, $\exists b \in G_1$ 使得 $g = \phi(b)$, $\forall h \in G_2$, $\exists a \in G_1$, 使得 $h = \phi(a)$ 。于是, $hgh^{-1} = \phi(a)\phi(b)\phi(a)^{-1} = \phi(a \circ b) * \phi(a^{-1}) = \phi(a \circ b \circ a^{-1}) \in \phi(N)$, 从而 $h\phi(N)h^{-1} \subseteq \phi(N)$, 因此 $\phi(N)$ 为 G_2 的正规子群。□

定义2. 设 ϕ 为群 (G, \circ) 到群 (\bar{G}, \cdot) 的同态, \bar{e} 为 \bar{G} 的单位元, 则 G 的子群 $\phi^{-1}(\bar{e})$ 称为同态 ϕ 的核, 记为 $\text{Ker}\phi$ 。 $\phi(G)$ 称为 ϕ 在 G 下的同态像。

定理5. 设 ϕ 为从群 (G, \circ) 到群 (\bar{G}, \cdot) 的同态, 则 $\text{Ker}\phi$ 为群 G 的正规子群。

定理6. 设 N 为 G 的一个正规子群, ϕ 为从 G 到 G/N 的一个映射, $\forall x \in G \phi(x) = xN$, 则 ϕ 为从 G 到 G/N 的一个满同态, $\text{Ker}\phi = N$ 。

证明. $\forall x, y \in G$, $\phi(xy) = (xy)N = (xN)(yN) = \phi(x)\phi(y)$, 这验证了 ϕ 为从 G 到 G/N 的一个同态。

$\forall g \in G$, $g \in \text{Ker}\phi \Leftrightarrow \phi(g) = N \Leftrightarrow gN = N \Leftrightarrow g \in N$ 。□

定理7 (群的同态基本定理). 设 ϕ 为从群 G 到群 \bar{G} 的同态, 则 $G/\text{Ker}\phi \cong \phi(G)$ 。

记 $K = \text{Ker}\phi$ 。令 $f: G/K \rightarrow \phi(G)$, $\forall gK \in G/K$, $f(gK) = \phi(g)$ 。

$\forall g_1, g_2 \in G$, 如果 $g_1K = g_2K$, 则 $g_1^{-1}g_2 \in K$, 从而 $\phi(g_1^{-1}g_2) = \bar{e}$, 即 $\phi(g_1)^{-1}\phi(g_2) = \bar{e}$, 于是 $\phi(g_1) = \phi(g_2)$, 所以 $f(g_1K) = f(g_2K)$, 这验证了 f 为映射。

f 为单射, 这是因为 $\forall g_1K, g_2K \in G/K$, 如果 $f(g_1K) = f(g_2K)$, 则 $\phi(g_1) = \phi(g_2)$, 从而 $\phi(g_1^{-1}g_2) = \bar{e}$, 于是 $g_1^{-1}g_2 \in K$, 所以 $g_1K = g_2K$ 。

f 为满射, 这是因为 $\forall \bar{g} \in \phi(G)$, $\exists g \in G$ 使得 $\phi(g) = \bar{g}$, 于是 $f(gK) = \phi(g) = \bar{g}$ 。

$\forall g_1K, g_2K \in G/K$, $f((g_1K)(g_2K)) = f(g_1g_2K) = \phi(g_1g_2) = \phi(g_1)\phi(g_2) = f(g_1K)f(g_2K)$, 因此 f 为从 G/K 到 $\phi(G)$ 的同构。

课后作业题:

练习1. 设 G 为 m 阶循环群, \bar{G} 为 n 阶循环群, 试证: $G \sim \bar{G}$ 当且仅当 $n|m$ 。

练习2. 设 G 为一个循环群, H 为群 G 的子群, 试证: G/H 也为循环群。