

离散数学讲义


陈建文

March 11, 2022

第二章 映射

定义2.1. 设 X 和 Y 为两个集合。一个从 X 到 Y 的**映射** f 为一个法则，根据 f ，对 X 中的每个元素 x 都有 Y 中唯一确定的元素 y 与之对应。从 X 到 Y 的映射 f 常记为 $f: X \rightarrow Y$ 。

例. 设集合 $X = \{-1, 0, 1\}$ ，集合 $Y = \{0, 1, 2\}$ ， $\forall x \in X, f(x) = x^2$ ，即 $f(-1) = 1, f(0) = 0, f(1) = 1$ ，则 f 为从集合 X 到集合 Y 的映射。



定义2.2. 设 X 和 Y 为两个集合。一个从 X 到 Y 的**映射**为一个满足以下两个条件的 $X \times Y$ 的子集 f ：

1. 对 X 的每一个元素 x ，存在一个 $y \in Y$ ，使得 $(x, y) \in f$ ；
2. 若 $(x, y) \in f, (x, y') \in f$ ，则 $y = y'$ 。

$(x, y) \in f$ 记为 $y = f(x)$ 。

例. 设集合 $X = \{-1, 0, 1\}$ ，集合 $Y = \{0, 1, 2\}$ ， $f \subseteq X \times Y$ ， $f = \{(-1, 1), (0, 0), (1, 1)\}$ ，则 f 为从集合 X 到集合 Y 的映射。

定义2.1和定义2.2是等价的。

练习2.1. 设 $X = \{0, 1, 2\}, Y = \{3, 4, 5\}, f \subseteq X \times Y$ ，则下列为映射的是 (D)

- A. $f = \{(0, 3), (1, 4)\}$
- B. $f = \{(0, 3), (0, 4), (1, 4), (2, 5)\}$
- C. $f = \{(0, 3), (0, 4)\}$
- D. $f = \{(0, 5), (1, 4), (2, 3)\}$

映射定义的符号化表示：

$$f: X \rightarrow Y$$

$$f \subseteq X \times Y$$

- 1) $\forall x \in X \exists y \in Y (x, y) \in f$
 即: $\forall x \in X \rightarrow \exists y \in Y \wedge (x, y) \in f$
 2) $\forall x \in X \forall y \in Y \forall y' \in Y ((x, y) \in f \wedge (x, y') \in f \rightarrow y = y')$
 即: $\forall x \in X \rightarrow (\forall y \in Y \rightarrow \forall y' \in Y \rightarrow ((x, y) \in f \wedge (x, y') \in f \rightarrow y = y'))$

定义2.3. 设 f 为从集合 X 到集合 Y 的映射, $f: X \rightarrow Y$, 如果 $y = f(x)$, 则称 y 为 x 在 f 下的**象**, 称 x 为 y 的**原象**。 X 称为 f 的**定义域**; 集合 $\{f(x) | x \in X\}$ 称为 f 的**值域**, 记为 $Im(f)$ 。


$P(x): x$ 为偶数

$P: Z \rightarrow \{T, F\}$

$P \subseteq Z \times \{T, F\}$


$P = \{\dots, (-2, T), (-1, F), (0, T), (1, F), (2, T), \dots\}$

定义2.4. 设 $f: X \rightarrow Y$, $A \subseteq X$, 当把 f 的定义域限制在 A 上时, 就得到了一个 $\phi: A \rightarrow Y$, $\forall x \in A$, $\phi(x) = f(x)$ 。 ϕ 称为 f 在 A 上的**限制**, 并且常用 $f|_A$ 来表示 ϕ 。反过来, 我们也称 f 为 ϕ 在 X 上的**扩张**。



定义2.5. 设 $f: A \rightarrow Y$, $A \subseteq X$, 则称 f 为 X 上的一个**部分映射**。


一个部分映射的例子:



定义2.6. 两个映射 f 与 g 称为是相等的当且仅当 f 和 g 都为从 X 到 Y 的映射, 并且 $\forall x \in X$ 总有 $f(x) = g(x)$ 。


定义2.7. 设 $f: X \rightarrow X$, 如果 $\forall x \in X, f(x) = x$, 则称 f 为 X 上的**恒等映射**。 X 上的恒等映射常记为 I_X 。

一个恒等映射的例子:



定义2.8. 设 $f: X \rightarrow Y$, 如果 $\forall x_1, x_2 \in X$, 只要 $x_1 \neq x_2$, 就有 $f(x_1) \neq f(x_2)$, 则称 f 为从 X 到 Y 的**单射**。

一个单射的例子:



单射的符号化表示:


$$f: X \rightarrow Y$$

$$\forall x_1 \in X \forall x_2 \in X x_1 \neq x_2 \rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

$$\text{即: } \forall x_1 \in X \forall x_2 \in X f(x_1) = f(x_2) \rightarrow x_1 = x_2$$

定义2.9. 设 $f: X \rightarrow Y$, 如果 $\forall y \in Y, \exists x \in X$ 使得 $f(x) = y$, 则称 f 为从 X 到 Y 的**满射**。

一个满射的例子:




满射的符号化表示:

$$f: X \rightarrow Y$$

$$\forall y \in Y \exists x \in X f(x) = y$$

定义2.10. 设 $f: X \rightarrow Y$, 如果 f 既是单射又是满射, 则称 f 为从 X 到 Y 的**双射**, 或者称 f 为从 X 到 Y 的一一对应。这时也称 X 与 Y **对等**, 记为 $X \sim Y$ 。

一个双射的例子:



定义2.11. 从集合 X 到集合 Y 的所有映射之集记为 Y^X , 即 $\{f|f: X \rightarrow Y\}$ 。

$$\{2, 3\}^{\{0,1\}} = \{(0,2), (1,2)\}, \{(0,3), (1,3)\}, \{(0,2), (1,3)\}, \{(0,3), (1,2)\}\}$$

定理2.1 (抽屉原理). 如果把 $n+1$ 个物体放到 n 个盒子里, 则必有一个盒子里至少放了两个物体。

例. 从 $1, 2, \dots, 2n$ 中任意选出 $n+1$ 个数, 则这 $n+1$ 个数中必有两个数, 使得其中之一能除尽另一个。

证明. 每个整数均可写成 $2^l \cdot d$ 的形式, 其中 l 为非负整数, d 为奇数。因此, 当把选出的 $n+1$ 个整数都写成这种形式时, 便得到了 $n+1$ 个奇数 d_1, d_2, \dots, d_{n+1} , 并且 $1 \leq d_i \leq 2n-1, i=1, 2, \dots, n+1$ 。但1到 $2n$ 之间仅有 n 个奇数, 由抽屉原理可知, 必有 i, j 使得 $d_i = d_j, i \neq j$ 。于是, d_i 与 d_j 对应的两个整数 $2^{l_i} \cdot d_i$ 与 $2^{l_j} \cdot d_j$ 中必有一个可以整除另外一个。□

例. 任何6个人中, 或有3个人互相认识, 或有3个人互相不认识。

定理2.2 (抽屉原理的强形式). 设 q_1, q_2, \dots, q_n 为 n 个正整数。如果把 $q_1 + q_2 + \dots + q_n - n + 1$ 个物体放到 n 个盒子中, 则或者第一个盒子中至少含有 q_1 个物体, 或者第二个盒子中至少含有 q_2 个物体, ..., 或者第 n 个盒子中至少含有 q_n 个物体。

推论2.1. 如果把 $n(r-1)+1$ 个物体放入 n 个盒子里, 则至少有一个盒子里放了不少于 r 个物体。

推论2.2. 如果 n 个正整数 m_1, m_2, \dots, m_n 的平均值

$$\frac{m_1 + m_2 + \dots + m_n}{n} > r - 1,$$

则 m_1, m_2, \dots, m_n 中至少有一个正整数不小于 r 。

例. n^2+1 个士兵站成一排, 则可以使其中的至少 $n+1$ 个士兵向前走一步站成一个按身高从小到大的队列, 或站成一个按身高从大到小的队列。

对照以下的例子可以帮助我们理解证明过程。

$$\begin{array}{cccccccc} 5 & 9 & 10 & 4 & 7 & 2 & 8 & 3 & 6 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 3 & 2 & 3 & 1 & 2 & 1 & 1 \end{array}$$

证明. 从左到右依次用 $h_1, h_2, \dots, h_{n^2+1}$ 表示此队列中各士兵的身高, 于是, 我们得到了一个 n^2+1 项的数列

$$h_1, h_2, \dots, h_{n^2+1} \quad (2.1)$$

我们的问题就是要证明此数列中或者有一个长(项数)至少为 $n+1$ 的不减子序列, 或者有一个长至少为 $n+1$ 的不增子序列。

假设本题结论不成立, 则数列(2.1)中每个不减子序列的长度至多为 n , 每个不增子序列的长度也至多为 n 。令 m_i 为以 h_i 为首项的(2.1)的最长不减子序列的长度, $i=1, 2, \dots, n^2+1$ 。于是得到 n^2+1 个数 $m_1, m_2, \dots, m_{n^2+1}$, 其中每个数 m_i 满足 $1 \leq m_i \leq n$ 。现在把这 n^2+1 个数放到 n 个盒子 $1, 2, \dots, n$ 中, 数 m_i 放

到第 k 个盒子中当且仅当 $m_i = k$, 则必有某个盒子中至少含有 $n+1$ 个数。由上述方法可知, 在这同一个盒子中的至少 $n+1$ 个数, 它们是相等的。设这些数为 $m_{i_1}, m_{i_2}, \dots, m_{i_k}$, $i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n^2+1, k > n$ 。相应的, 我们有(2.1)的子序列

$$h_{i_1}, h_{i_2}, \dots, h_{i_k} \quad (2.2)$$

这是一个不增子序列。实际上, 如若不然, 例如 $h_{i_1} < h_{i_2}$, 则由于以 h_{i_2} 为首项的最长不减子序列的长为 m_{i_2} , 所以前面加一项 h_{i_1} , 就得到了一个以 h_{i_1} 为首项长度大于 m_{i_1} 的不减子序列, 这是不可能的。

于是, 我们得到了一个长度至少为 $n+1$ 的不增子序列(2.2), 这又与假设相矛盾。所以, 本题结论成立。 \square

练习2.2. 设 a_1, a_2, \dots, a_n 为 n 个实数且 $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ 。 φ 为从 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 到 A 的一一对应。试证: 如果 $a_1 + \varphi(a_1) < a_2 + \varphi(a_2) < \dots < a_n + \varphi(a_n)$, 则 $\varphi = I_A$ 。

证明. 设 $\varphi(a_1) \neq a_1$, 则由 φ 为双射知存在 $j, j > 1, \varphi(a_j) = a_1$ 。于是, 对任意的正整数 $i < j$, $a_i + \varphi(a_i) < a_j + \varphi(a_j) = a_j + a_1$, 由 $a_i \geq a_1$ 知 $\varphi(a_i) < a_j$, 从而 $\varphi(a_i) = a_k, k < j$ 。于是, 对任意的 $i, i < j, \varphi(a_i) \in \{a_2, \dots, a_{j-1}\}$, 由鸽笼原理, 必存在 $i_1 < i_2 < j, \varphi(i_1) = \varphi(i_2)$, 这与 φ 为双射矛盾。类似可证, $\varphi(a_2) = a_2, \dots, \varphi(a_n) = a_n$, 即 $\varphi = I_A$ 。 \square

练习2.3. 在一个半径为16的圆内任意放入650个点。给你一个形似垫圈的圆环, 此圆环的外半径为3, 内半径为2。现在要求你用这个垫圈盖住这650个点中的至少10个点, 这可能吗? 证明你的结论。

答. 用这个垫圈可以盖住650个点中的至少10个点。以圆内的650个点中的每个点为圆心放一个圆环, 则所有圆环的面积之和为 $S_1 = 650 * \pi * (3^2 - 2^2) = 3250\pi$ 。所有圆环所覆盖的区域被包含在一个面积为 $\pi * (16+3)^2 = 361\pi$ 的圆 C 内。此时必存在10个圆环 R_1, R_2, \dots, R_{10} 有公共的重叠区域, 否则所有圆环的面积之和 S_1 将小于圆 C 之面积的9倍, 即 $3250\pi < 9 * 361\pi = 3249\pi$, 矛盾。任取圆环 R_1, R_2, \dots, R_{10} 的公共重叠区域中的一点, 在该点上放一个圆环, 将覆盖住 R_1, R_2, \dots, R_{10} 的圆心, 这10个圆心都是圆内650个点中的点, 结论得证。 \square

定义2.12. 设 $f: X \rightarrow Y, A \subseteq X$, A 在 f 下的象定义为

$$f(A) = \{f(x) | x \in A\}$$

例. 设 $f: \{-1, 0, 1\} \rightarrow \{0, 1, 2\}, f(x) = x^2$, 则 $f(\{-1, 0\}) = \{0, 1\}$

定义2.13. 设 $f: X \rightarrow Y, B \subseteq Y$, B 在 f 下的原象定义为

$$f^{-1}(B) = \{x \in X | f(x) \in B\}$$

例. 设 $f: \{-1, 0, 1\} \rightarrow \{0, 1, 2\}, f(x) = x^2$, 则 $f^{-1}(\{1, 2\}) = \{-1, 1\}$

定理2.3. 设 $f: X \rightarrow Y, C \subseteq Y, D \subseteq Y$, 则

$$1. f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$$

$$2. f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$$

$$3. f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$$

$$4. f^{-1}(C^c) = (f^{-1}(C))^c$$

$$5. f^{-1}(C \triangle D) = f^{-1}(C) \triangle f^{-1}(D)$$

定理2.4. 设 $f: X \rightarrow Y$, $A \subseteq X$, $B \subseteq X$, 则

$$1. f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$$

$$2. f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$$

$$3. f(A \setminus B) \supseteq f(A) \setminus f(B)$$

$$4. f(A \triangle B) \supseteq f(A) \triangle f(B)$$

定义2.14. 设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$ 为映射, 映射 f 与 g 的**合成** $g \circ f: X \rightarrow Z$ 定义为

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

定理2.5. 设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, $h: Z \rightarrow W$ 为映射, 则

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$$

定理2.6. 设 $f: X \rightarrow Y$, 则 $f = f \circ I_X = I_Y \circ f$ 。

定义2.15. 设 $f: X \rightarrow Y$ 为双射, f 的**逆映射** $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 定义为: 对任意的 $y \in Y$, 存在唯一的 x 使得 $f(x) = y$, 则 $f^{-1}(y) = x$ 。

定义2.16. 设 $f: X \rightarrow Y$ 为一个双射, 则 $g: Y \rightarrow X, g = \{(y, x) | (x, y) \in f\}$ 称为 f 的**逆映射**, 记为 $g = f^{-1}$ 。

例. 设集合 $X = \{1, 2, 3\}$, $Y = \{4, 5, 6\}$, $f = \{(1, 4), (2, 5), (3, 6)\}$ 为从 X 到 Y 的双射, 则 $f^{-1} = \{(4, 1), (5, 2), (6, 3)\}$ 。

定义2.17. 设 $f: X \rightarrow Y$ 为一个映射。如果存在一个映射 $g: Y \rightarrow X$ 使得

$$f \circ g = I_Y \text{ 且 } g \circ f = I_X,$$

则称映射 f 为**可逆的**, 而 g 称为 f 的**逆映射**。

例. 设集合 $X = \{1, 2, 3\}$, $Y = \{4, 5, 6\}$, $f = \{(1, 4), (2, 5), (3, 6)\}$ 为从 X 到 Y 的双射, $g = \{(4, 1), (5, 2), (6, 3)\}$, 由于 $f \circ g = I_Y$ 且 $g \circ f = I_X$, $f^{-1} = g$ 。

定理2.7. 定义2.16和定义2.17是等价的。

证明. 设 f 为从集合 X 到集合 Y 的映射, g 为从集合 Y 到集合 X 的映射。

以下先假设 g 满足定义2.16, 往证 g 满足定义2.17。

假设 f 为从集合 X 到集合 Y 的双射, g 为从集合 Y 到集合 X 的映射, $g = \{(y, x) | (x, y) \in f\}$, 易验证 $f \circ g = I_Y$ 且 $g \circ f = I_X$ 。

接下来, 假设 g 满足定义2.17, 往证 g 满足定义2.16。

假设 f 为从集合 X 到集合 Y 的映射, 存在一个映射 $g : Y \rightarrow X$ 使得 $f \circ g = I_Y$ 且 $g \circ f = I_X$, 往证 f 为双射, 且 $g = \{(y, x) | (x, y) \in f\}$ 。

对任意的 $x_1 \in X, x_2 \in X$, 如果 $f(x_1) = f(x_2)$, 则 $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$, 再由 $g \circ f = I_X$ 知 $x_1 = x_2$, 从而 f 为单射。对任意的 $y \in Y$, 由 $f \circ g = I_Y$ 知 $f(g(y)) = y$, 从而 f 为满射。这证明了 f 为双射。

以下证明 $g = \{(y, x) | (x, y) \in f\}$, 这就是要证明左边的集合等于右边的集合。

对任意的 $(y, x) \in g$, 则 $x = g(y)$, 从而 $f(x) = f(g(y))$, 由 $f \circ g = I_Y$ 知 $f(x) = y$, 从而 $(x, y) \in f$ 。

对任意的 $(x, y) \in f$, 则 $y = f(x)$, 从而 $g(y) = g(f(x))$, 由 $g \circ f = I_X$ 知 $g(y) = x$, 从而 $(y, x) \in g$ 。□

定理2.8. 设 $f : X \rightarrow Y$ 为可逆映射, 则 $(f^{-1})^{-1} = f$ 。

定理2.9. 设 $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$ 都为可逆映射, 则 $g \circ f$ 也为可逆映射并且 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ 。

定义2.18. 设 $f : X \rightarrow Y$ 为一个映射, 如果存在一个映射 $g : Y \rightarrow X$ 使得 $g \circ f = I_X$, 则称 f 为左可逆的, g 称为 f 的左逆映射; 如果存在一个映射 $h : Y \rightarrow X$ 使得 $f \circ h = I_Y$, 则称 f 为右可逆的, h 称为 f 的右逆映射。

定理2.10. 设 $f : X \rightarrow Y$ 为一个映射, 则

1. f 左可逆当且仅当 f 为单射;
2. f 右可逆当且仅当 f 为满射。

证明. 先证(1)。

设 f 为左可逆的, 则存在一个映射 $g : Y \rightarrow X$ 使得 $g \circ f = I_X$ 。对任意的 $x_1 \in X, x_2 \in X$, 如果 $f(x_1) = f(x_2)$, 则 $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$, 再由 $g \circ f = I_X$ 知 $x_1 = x_2$, 从而 f 为单射。

设 f 为单射, 则 f 为从集合 X 到 $Im(f)$ 的双射。于是, 有 $g : Im(f) \rightarrow X$ 使得 $g \circ f = I_X$ 。扩充 g 到 Y 上: 对任意的 $y \in Y$, 若 $y \in Y \setminus Im(f)$, 则 $g(y)$ 不变, 而当 $y \in Im(f)$ 时, 规定 $g(y)$ 为 X 中任意一个固定的元素 x_0 , 则 g 为从集合 Y 到集合 X 的映射, 且 $g \circ f = I_X$ 。所以, f 为左可逆的。

再证(2)。

设 f 为右可逆的, 则存在一个映射 $g : Y \rightarrow X$ 使得 $f \circ g = I_Y$ 。对任意的 $y \in Y$, 由 $f \circ g = I_Y$ 知 $f(g(y)) = y$, 从而 f 为满射。

设 f 为满射, 则对任意的 $y \in Y, f^{-1}(\{y\}) \neq \emptyset$ 。令 $g : Y \rightarrow X$, 其定义为, 对任意的 $y \in Y, g(y) = x$, 其中 x 为 $f^{-1}(\{y\})$ 中一个特定元素。于是, 对任意的 $y \in Y$, 设 $g(y) = x$, 则 $f(x) = y$, 从而 $(fg)(y) = f(g(y)) = f(x) = y = I_Y(y)$ 。所以 $fg = I_Y$, 即 f 为右可逆的。□

定义2.19. 有穷集合 S 到自身的一一对应称为 S 上的一个置换。如果 $|S| = n$, 则 S 上的置换就说成是 n 次置换。

设 $S = \{1, 2, \dots, n\}, \sigma : S \rightarrow S$ 为 S 上的一个置换, $\sigma(1) = k_1, \sigma(2) = k_2, \dots, \sigma(n) = k_n$, 我们用如下的一个表来表示置换 σ :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ k_1 & k_2 & \dots & k_n \end{pmatrix}$$

例. 设 $S = \{1, 2, 3, 4\}$, $\sigma(1) = 3$, $\sigma(2) = 2$, $\sigma(3) = 4$, $\sigma(4) = 1$, 则 σ 可以表示为

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

这里, 列的次序无关紧要, 例如, σ 还可以表示为

$$\sigma = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

定义2.20. 设 α 与 β 为集合 S 上的两个置换, 则 α 与 β 为两个从 S 到 S 的双射, 讨论置换时, 我们用 $\alpha\beta$ 表示 α 与 β 的合成 $\beta \circ \alpha$ 。注意这里 α 与 β 的次序, 从运算的角度看有一定的便利性, 但也有的教材中采用相反的顺序。按照我们的写法, 讨论置换时, 如果 $i \in S$, 则用 $(i)\alpha$ 表示 i 在 α 下的像, 简记为 $i\alpha$ 。

例. 设 $S = \{1, 2, 3\}$, α 和 β 为 S 上的两个置换,

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

, 则

$$\alpha\beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

,

若 α 与 β 为两个 n 次置换, 当把 β 的表示式中的上一行按 α 的下一行的顺序写出时, 则 $\alpha\beta$ 的下一行就是 β 的新表示式中的下一行。

例. 设 $S = \{1, 2, 3\}$, α 和 β 为 S 上的两个置换,

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

, 则

$$\alpha\beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

,

定义2.21. 设 σ 为 S 上的一个 n 次置换, 若 $i_1\sigma = i_2$, $i_2\sigma = i_3$, \dots , $i_{k-1}\sigma = i_k$, $i_k\sigma = i_1$, 而 $\forall i \in S \setminus \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$, $i\sigma = i$, 则称 σ 为一个 k 循环置换, 记为 $(i_1 i_2 \dots i_k)$ 。2-循环置换称为对换。

例. 设 $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 则

$$(123) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}, (23) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

定理2.11. 每个置换都能被分解成若干个没有共同数字的循环置换的乘积。如果不计这些循环置换的顺序以及略去的1-循环置换, 这个分解是唯一的。

定理2.12. 当 $n \geq 2$ 时, 每个 n 次置换都能被分解成若干个对换的乘积。

定理2.13. 如果把置换分解成若干个对换的乘积, 则对换个数的奇偶性是不变的。

证明. 设 σ 为一个 n 次置换。 σ 的符号 $sign(\sigma)$ 定义为 $(-1)^{|\{(x,y)|x < y \wedge (x)\sigma > (y)\sigma\}|}$ 。

设 $\alpha = \beta(i, j)$, $i < j$, 此时如果 $(i)\beta > (j)\beta$, 则 $(i)\alpha < (j)\alpha$; 反之, 如果 $(i)\beta < (j)\beta$, 则 $(i)\alpha > (j)\alpha$ 。

易知, $sign(\alpha) = -sign(\beta)$ 。

于是, 如果置换 σ 可以分解为 m 个对换的乘积 $\sigma = I(i_1, k_1)(i_2, k_2) \cdots (i_m, k_m)$, 其中 I 为恒等置换, 由 $sign(I) = 1$ 知 $sign(\sigma) = (-1)^m$ 。而 $sign(\sigma)$ 只能为1和-1两者之一, 因此如果 σ 能分解成偶数个对换的乘积, 则只能分解成偶数个对换的乘积; 如果 σ 能分解成奇数个对换的乘积, 则只能分解成奇数个对换的乘积。□

定义2.22. 能被分解为偶数个对换的乘积的置换称为偶置换; 能被分解为奇数个对换的乘积的置换称为奇置换。

定理2.14. 当 $n \geq 2$ 时, n 次奇置换的个数与 n 次偶置换的个数相等, 都等于 $\frac{n!}{2}$ 。

证明. 设 A 为所有的 n 次奇置换所构成的集合, B 为所有的 n 次偶置换所构成的集合, 则 $S_n = A \cup B$ 且 $A \cap B = \phi$ 。所以, $|S_n| = |A| + |B| = n!$ 。

以下证明 $|A| = |B|$ 。构造映射 $f: A \rightarrow B$, 对任意的 $\sigma \in A$, $f(\sigma) = \sigma(12)$ 。易验证 f 为单射, 这是因为对任意的 $\sigma_1 \in A$, $\sigma_2 \in A$, 如果 $f(\sigma_1) = f(\sigma_2)$, 则 $\sigma_1(1, 2) = \sigma_2(1, 2)$, 从而 $\sigma_1(1, 2)(1, 2) = \sigma_2(1, 2)(1, 2)$, 即 $\sigma_1 = \sigma_2$ 。同时, 易验证 f 为满射, 这是因为对任意的 $\tau \in B$, $f(\tau(1, 2)) = \tau(1, 2)(1, 2) = \tau$ 。从而 f 为双射, 这证明了 $|A| = |B|$ 。再由 $|A| + |B| = n!$ 知, $|A| = |B| = \frac{n!}{2}$ 。□

第三章