

离散数学讲义

陈建文

February 24, 2022

第一章 集合及其运算

定义1.1. 通常把一些互不相同的东西放在一起所形成的整体叫做一个集合。构成集合的每个东西叫做集合的元素。给定一个集合 A 和一个元素 a ，用 $a \in A$ 表示 a 是 A 的一个元素，用 $a \notin A$ 表示 a 不是 A 的一个元素。

有两种方法表示一个集合：

1. 把构成集合的那些元素全部列出来

- $A = \{1, 2, 3\}$
- $C = \{a, b, c, \dots, z\}$

2. 用概括集合中各元素的属性来表示集合 $\{x|P(x)\}$

- $E = \{n|n \in \mathcal{Z} \wedge n \text{ is even}\}$, 这里 \wedge 表示“并且”， E 还可以等价的表示为 $E = \{n \in \mathcal{Z}|n \text{ is even}\}$

存在一个集合，该集合中不包含任何元素，称为空集，记为 ϕ 。

定义1.2. 设 A, B 为两个集合，如果 A 中的每个元素都是 B 中的元素，则称 A 为 B 的子集，记为 $A \subseteq B$ ；如果 $A \subseteq B$ 且存在 $x \in B$ 使得 $x \notin A$ ，则称 A 为 B 的真子集，记为 $A \subset B$ 。

- $\{1, 2, 4\} \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- $\{1, 2, 4\} \subset \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$A \subseteq B : \forall x \in A, x \in B$ 即 $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$

$A \subset B : A \subseteq B \wedge \exists x \in B, x \notin A$ 即 $A \subseteq B \wedge \exists x(x \in B \wedge x \notin A)$

设 $A = \{1, 2, 4\}, B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，则 $A \subseteq B$ ，其含义是 $\forall x, x \in A \rightarrow x \in B$ 。对一些特殊的 x 的值分析如下：

- 当 $x = 1$ 时， $1 \in A \rightarrow 1 \in B$ ，即 $T \rightarrow T$ ，其真值为 T ；
- 当 $x = 3$ 时， $3 \in A \rightarrow 3 \in B$ ，即 $F \rightarrow T$ ，其真值为 T ；
- 当 $x = 0$ 时， $0 \in A \rightarrow 0 \in B$ ，即 $F \rightarrow F$ ，其真值为 T 。

定义1.3. 设 A, B 为两个集合，如果 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ ，则称 A 与 B 相等，并记为 $A = B$ 。

- $\{1, 2, 3, 4, 5\} = \{3, 4, 2, 1, 5\}$
- $\{x \in \mathcal{R} | x^2 - 5x + 6 = 0\} = \{2, 3\}$

定理1.1. 空集为任一集合的子集且空集是唯一的。

证明. 设 A 为任意一个集合, 显然对任意的 x 属于空集, 则 $x \in A$, 因此空集为 A 的子集。

以下证明空集是唯一的。用反证法。假设存在两个不相等的空集 ϕ 和 ϕ' , 则 $\phi \subseteq \phi'$ 并且 $\phi' \subseteq \phi$, 从而 $\phi = \phi'$, 矛盾。

□

“空集为任一集合的子集”这一结论初学时, 也可以用反证法证明其正确性, 以帮助我们理解其中的逻辑。为了用反证法证明该结论, 首先让我们分析一下对于任意的集合 A 和 B , A 不是 B 的子集 ($A \not\subseteq B$) 的含义:

$$\begin{aligned}
 A \not\subseteq B &\Leftrightarrow \neg(A \subseteq B) \\
 &\Leftrightarrow \neg(\forall x (x \in A \rightarrow x \in B)) \\
 &\Leftrightarrow \exists x \neg(x \in A \rightarrow x \in B) \\
 &\Leftrightarrow \exists x \neg(\neg(x \in A) \vee (x \in B)) \\
 &\Leftrightarrow \exists x (\neg(\neg(x \in A)) \wedge \neg(x \in B)) \\
 &\Leftrightarrow \exists x (x \in A \wedge x \notin B)
 \end{aligned}$$

空集为任一集合的子集。

证明. 用反证法。设存在一个集合 A , $\phi \not\subseteq A$, 则存在 $x \in \phi$, 但 $x \notin A$, 这显然是不可能的, 结论得证。

□

定义1.4. 集合 S 的所有子集构成的集合称为 S 的幂集, 记为 2^S 或者 $\mathcal{P}(S)$ 。

例. $2^\phi = \{\phi\}$
 $2^{\{1\}} = \{\phi, \{1\}\}$
 $2^{\{1,2\}} = \{\phi, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$
 $2^{\{1,2,3\}} = \{\phi, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$

例. $2^{\{\phi, \{\phi\}\}} = \{\phi, \{\phi\}, \{\{\phi\}\}, \{\phi, \{\phi\}\}\}$

例. 对于任意的集合 A , $\{\phi, \{\phi\}\} \in 2^{2^A}$ 。


证明. 根据幂集的定义, $\phi \in 2^A$, 从而 $\{\phi\} \subseteq 2^A$, 即 $\{\phi\} \in 2^{2^A}$ 。又因为 $\phi \in 2^{2^A}$, 所以 $\{\phi, \{\phi\}\} \subseteq 2^{2^A}$, 从而 $\{\phi, \{\phi\}\} \in 2^{2^{2^A}}$ 。

□

定义1.5. 设 A, B 为任意的两个集合, 至少属于集合 A 与集合 B 之一的那些元素构成的集合称为 A 与 B 的并集, 记为 $A \cup B$ 。

$$A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\}$$


(这里 \vee 表示“或者”)



例. $\{1, 2\} \cup \{2, 3\} = \{1, 2, 3\}$

定义1.6. 设 A, B 为任意的两个集合, 由既属于集合 A 又属于集合 B 的所有元素构成的集合称为 A 与 B 的交集, 记为 $A \cap B$ 。


$$A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\}$$



例. $\{1, 2\} \cap \{2, 3\} = \{2\}$

定义1.7. 设 A, B 为任意的两个集合, 由属于集合 A 但不属于集合 B 的所有元素构成的集合称为 A 与 B 的差集, 记为 $A \setminus B$ 。


$$A \setminus B = \{x | x \in A \wedge x \notin B\}$$



例. $\{1, 2\} \setminus \{2, 3\} = \{1\}$

定义1.8. 在许多实际问题中, 常以某个集合 S 为出发点, 而所涉及的集合都是 S 的子集。这个包含所考虑的所有集合的集合 S , 称为该问题的全集。如果 A 为 S 的子集, 则差集 $S \setminus A$ 称为集合 A 对集合 S 的余集, 记为 A^c 。

$$A^c = \{x | x \in S \wedge x \notin A\}$$



例. $S = \{0, 1\}, A = \{0\}$, 则 $A^c = \{1\}$ 。

定理1.2. 设 S 为全集, \emptyset 为空集, A, B, C 为 S 的子集, 则

1. $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$.
2. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.
3. $A \cup \emptyset = A, A \cap \emptyset = \emptyset$.
4. $A \cup S = S, A \cap S = A$.
5. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
6. $A \cup A^c = S, A \cap A^c = \emptyset$.
7. $C \setminus (A \cap B) = (C \setminus A) \cup (C \setminus B), C \setminus (A \cup B) = (C \setminus A) \cap (C \setminus B)$.
- 7'. $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c, (A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

以下只证明结论5和结论7, 其他结论的证明留给读者自己完成。
首先证明结论5的第一条, 我们先在草稿纸上做如下的分析:

$$\begin{aligned}
 & \forall x x \in A \cup (B \cap C) \\
 & \Leftrightarrow x \in A \vee x \in B \cap C \\
 & \Leftrightarrow x \in A \vee (x \in B \wedge x \in C) \\
 & \Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee x \in C) \\
 & \Leftrightarrow x \in A \cup B \wedge x \in A \cup C \\
 & \Leftrightarrow x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)
 \end{aligned}$$

然后将上面的分析转化为证明如下:

证明. 先证 $A \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap (A \cup C)$ 。

对任意的 x , 如果 $x \in A \cup (B \cap C)$, 则 $x \in A$ 或者 $x \in B \cap C$, 从而 $x \in A$, 或者 $x \in B$ 并且 $x \in C$, 因此, $x \in A$ 或者 $x \in B$, 并且 $x \in A$ 或者 $x \in C$, 即, $x \in A \cup B$ 并且 $x \in A \cup C$, 于是, $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ 。

再证 $(A \cup B) \cap (A \cup C) \subseteq A \cup (B \cap C)$ 。

对任意的 x , 如果 $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$, 则 $x \in A \cup B$ 并且 $x \in A \cup C$, 从而 $x \in A$ 或者 $x \in B$, 并且 $x \in A$ 或者 $x \in C$, 因此, $x \in A$, 或者 $x \in B$ 并且 $x \in C$, 即, $x \in A$ 或者 $x \in (B \cap C)$, 于是, $x \in A \cup (B \cap C)$ 。

□

接下来证明结论7的第一条, 我们先在草稿纸上做如下的分析:

$$\begin{aligned}
 & \forall x x \in C \setminus (A \cap B) \\
 & \Leftrightarrow x \in C \wedge x \notin A \cap B \\
 & \Leftrightarrow x \in C \wedge \neg(x \in A \cap B) \\
 & \Leftrightarrow x \in C \wedge \neg(x \in A \wedge x \in B) \\
 & \Leftrightarrow x \in C \wedge (\neg(x \in A) \vee \neg(x \in B)) \\
 & \Leftrightarrow x \in C \wedge (x \notin A \vee x \notin B) \\
 & \Leftrightarrow (x \in C \wedge x \notin A) \vee (x \in C \wedge x \notin B) \\
 & \Leftrightarrow (x \in C \setminus A) \vee (x \in C \setminus B) \\
 & \Leftrightarrow x \in (C \setminus A) \cup (C \setminus B)
 \end{aligned}$$

然后将上面的分析转化为证明如下:

证明. 先证 $C \setminus (A \cap B) \subseteq (C \setminus A) \cup (C \setminus B)$ 。

对任意的 x , 如果 $x \in C \setminus (A \cap B)$, 则 $x \in C$ 并且 $x \notin A \cap B$, 从而 $x \in C$ 并且 $x \notin A$ 或者 $x \notin B$, 因此, $x \in C \setminus A$ 或者 $x \in C \setminus B$, 于是 $x \in (C \setminus A) \cup (C \setminus B)$ 。

再证 $(C \setminus A) \cup (C \setminus B) \subseteq C \setminus (A \cap B)$ 。

对任意的 x , 如果 $x \in (C \setminus A) \cup (C \setminus B)$, 则 $x \in C \setminus A$ 或者 $x \in C \setminus B$, 从而 $x \in C$ 并且 $x \notin A$ 或者 $x \notin B$, 因此, $x \in C$ 并且 $x \notin A \cap B$, 于是 $x \in C \setminus (A \cap B)$ 。

□

例. 下列等式是否成立?

$$(A \setminus B) \cup C = A \setminus (B \setminus C)$$


若成立, 请给出证明。若不成立, 请说明理由。

答. 该等式不成立。设 $A = \phi$, $B = \phi$, $C = \{0\}$, 则 $(A \setminus B) \cup C = \{0\}$, 而 $A \setminus (B \setminus C) = \phi$, $(A \setminus B) \cup C \neq A \setminus (B \setminus C)$ 。

□

定义1.9. 设 A, B 为任意的两个集合, $A \setminus B$ 与 $B \setminus A$ 的并集称为 A 与 B 的对称差, 记为 $A \triangle B$ 。

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$



例.

$$\begin{aligned}\{1, 2\} \triangle \{2, 3\} &= \{1, 3\} \\ \{1, 2\} \triangle \{1\} &= \{2\} \\ \{1, 2\} \triangle \phi &= \{1, 2\} \\ \{1, 2\} \triangle \{1, 2\} &= \phi\end{aligned}$$

定理1.3. 设 A, B 为任意两个集合, 则

$$A \triangle B = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$$

定理1.4. 设 A, B, C 为任意三个集合, 则

1. $A \triangle B = B \triangle A$.
2. $(A \triangle B) \triangle C = A \triangle (B \triangle C)$.
3. $\emptyset \triangle A = A$.
4. $A \triangle A = \emptyset$.
5. $A \cap (B \triangle C) = (A \cap B) \triangle (A \cap C)$.

以下证明结论 2 和结论 5, 其他结论留给读者思考。先证明结论 2。

证明. 因为

$$x \in A \triangle B \Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B), \quad (1.1)$$

所以

$$\begin{aligned}x \notin A \triangle B &\Leftrightarrow (x \notin A \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee x \notin B) \\ &\Leftrightarrow (x \notin A \wedge x \notin B) \vee (x \in A \wedge x \in B)\end{aligned} \quad (1.2)$$

于是

$$\begin{aligned}x \in (A \triangle B) \triangle C &\Leftrightarrow (x \in A \triangle B \wedge x \notin C) \vee (x \notin A \triangle B \wedge x \in C) \\ &\Leftrightarrow (((x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B)) \wedge x \notin C) \\ &\quad \vee (((x \notin A \wedge x \notin B) \vee (x \in A \wedge x \in B)) \wedge x \in C) \\ &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C) \vee (x \notin A \wedge x \in B \wedge x \notin C) \\ &\quad \vee (x \notin A \wedge x \notin B \wedge x \in C) \vee (x \in A \wedge x \in B \wedge x \in C)\end{aligned} \quad (1.3)$$

$$\begin{aligned}x \in A \triangle (B \triangle C) &\Leftrightarrow x \in (B \triangle C) \triangle A \\ &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B \triangle C) \vee (x \notin A \wedge x \in B \triangle C) \\ &\quad \vee (x \notin A \wedge x \notin B \triangle C) \vee (x \in A \wedge x \in B \triangle C)\end{aligned} \quad (1.4)$$

其中(1.4)式的第二行由对称差运算的交换律得到, (1.4)式的第三行由与(1.3)式的对称性得到。

由(1.3)式和(1.4)式可得 $(A \triangle B) \triangle C = A \triangle (B \triangle C)$ 。

□

再证明结论 5。

证明.

$$\begin{aligned}
 & A \cap (B \triangle C) \\
 &= A \cap (B \setminus C \cup C \setminus B) \\
 &= (A \cap B \setminus C) \cup (A \cap C \setminus B) \tag{1.5} \\
 &= (A \cap B) \triangle (A \cap C)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= (A \cap B) \setminus (A \cap C) \cup (A \cap C) \setminus (A \cap B) \\
 &= (A \cap B) \setminus A \cup (A \cap B) \setminus C \cup (A \cap C) \setminus A \cup (A \cap C) \setminus B \\
 &= (A \cap B) \setminus C \cup (A \cap C) \setminus B \\
 &= (A \cap B \setminus C) \cup (A \cap C \setminus B) \tag{1.6}
 \end{aligned}$$

由式(1.5)和式(1.6)知 $A \cap (B \triangle C) = (A \cap B) \triangle (A \cap C)$ 。 \square

定义1.10. 以集合为元素的集合称为集族。如果 I 为任意一个集合, 对 I 中每个元素 α 都有一个唯一的集合与之对应, 这个集合记为 A_α , 那么所有这些 A_α 形成的集族可以用 $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 表示, 其中 I 称为标号集。

定义1.11. 集族 $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 中所有集合的并集 $\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha$ 定义为

$$\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha = \{x | \exists \alpha \in I, x \in A_\alpha\}$$

集族 $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 中所有集合的交集 $\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha$ 定义为

$$\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha = \{x | \forall \alpha \in I, x \in A_\alpha\}$$

例. 如果 $I = \{1, 2, 3\}$, 则 $\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha = A_1 \cup A_2 \cup A_3$;

如果 $I = \{1, 2, 3\}$, 则 $\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha = A_1 \cap A_2 \cap A_3$;

如果 $I = \mathbb{N}$, 则 $\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha = A_0 \cup A_1 \cup A_2 \cup \cdots = \bigcup_{\alpha=0}^{\infty} A_\alpha$;

如果 $I = \mathbb{N}$, 则 $\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha = A_0 \cap A_1 \cap A_2 \cap \cdots = \bigcap_{\alpha=0}^{\infty} A_\alpha$;

如果 $I = \mathbb{Z}^+$, 则 $\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \cdots = \bigcup_{\alpha=1}^{\infty} A_\alpha$;

如果 $I = \mathbb{Z}^+$, 则 $\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha = A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \cdots = \bigcap_{\alpha=1}^{\infty} A_\alpha$ 。

例. 设 $I = \{x \in \mathbb{R} | 0 < x \leq 1\}$, $\forall x \in \mathbb{R}, A_x = \{y \in \mathbb{R} | 0 < y < x\}$, 则

$$\bigcup_{x \in I} A_x = \{x \in \mathbb{R} | 0 < x < 1\}, \bigcap_{x \in I} A_x = \phi$$

定理1.5. 设 A 为任意集合, $\{B_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 为任意一个集族, 则

$$1. A \cup (\bigcap_{\alpha \in I} B_\alpha) = \bigcap_{\alpha \in I} (A \cup B_\alpha)$$

$$2. A \cap (\bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha) = \bigcup_{\alpha \in I} (A \cap B_\alpha)$$

证明. 留给读者自己完成。 \square

定理1.6. 设 C 为任意集合, $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 为任意一个集族, 则

$$1. C \setminus (\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha) = \bigcup_{\alpha \in I} (C \setminus A_\alpha)$$

$$2. C \setminus (\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha) = \bigcap_{\alpha \in I} (C \setminus A_\alpha)$$

以下只证明第1条, 其他结论的证明留给读者自己完成。
我们先在草稿纸上做如下的分析:

$$\begin{aligned} & \forall x, x \in C \setminus (\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha) \\ & \Leftrightarrow x \in C \wedge x \notin \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha \\ & \Leftrightarrow x \in C \wedge \neg(x \in \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha) \\ & \Leftrightarrow x \in C \wedge \neg(\forall \alpha \in I \rightarrow x \in A_\alpha) \\ & \Leftrightarrow x \in C \wedge \exists \alpha \neg(\alpha \in I \rightarrow x \in A_\alpha) \\ & \Leftrightarrow x \in C \wedge \exists \alpha \neg(\neg(\alpha \in I) \vee x \in A_\alpha) \\ & \Leftrightarrow x \in C \wedge \exists \alpha \neg\neg(\alpha \in I) \wedge \neg x \in A_\alpha \\ & \Leftrightarrow x \in C \wedge \exists \alpha (\alpha \in I \wedge x \notin A_\alpha) \\ & \Leftrightarrow \exists \alpha (\alpha \in I \wedge x \in C \wedge x \notin A_\alpha) \\ & \Leftrightarrow \exists \alpha (\alpha \in I \wedge x \in C \setminus A_\alpha) \\ & \Leftrightarrow x \in \bigcup_{\alpha \in I} (C \setminus A_\alpha) \end{aligned}$$

然后将上面的分析转化为证明如下:

证明. 先证明 $C \setminus (\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha) \subseteq \bigcup_{\alpha \in I} (C \setminus A_\alpha)$ 。

对任意的 x , 如果 $x \in C \setminus (\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha)$, 则 $x \in C$, 且 $x \notin \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha$, 从而 $x \in C$, 且存在 $\alpha \in I$, $x \notin A_\alpha$ 。于是, 存在 $\alpha \in I$, $x \in C \setminus A_\alpha$ 。因此, $x \in \bigcup_{\alpha \in I} (C \setminus A_\alpha)$, 故 $C \setminus (\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha) \subseteq \bigcup_{\alpha \in I} (C \setminus A_\alpha)$ 。

其次, 对任意的 x , 如果 $x \in \bigcup_{\alpha \in I} (C \setminus A_\alpha)$, 则存在 $\alpha \in I$, $x \in C \setminus A_\alpha$ 。因此, 存在 $\alpha \in I$, $x \in C$ 且 $x \notin A_\alpha$, 故 $x \in C$ 且 $x \notin \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha$ 。于是, $x \in C \setminus (\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha)$ 。所以, $\bigcup_{\alpha \in I} (C \setminus A_\alpha) \subseteq C \setminus (\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha)$ 。

由集合相等的定义便知, $C \setminus (\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha) = \bigcup_{\alpha \in I} (C \setminus A_\alpha)$ 。 \square

将以上定理中的集合 C 替换为全集 S , 我们可以得到如下结论:

定理1.7. 设 $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 为任意一个集族, 则

$$1. (\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha)^c = \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha^c$$

$$2. (\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha)^c = \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha^c$$

第 二 章