

离散数学讲义

陈建文

March 9, 2022

第四章 无穷集合

定义4.1. 如果从集合 X 到集合 Y 存在一个双射, 则称 X 与 Y 对等, 记为 $X \sim Y$ 。

定义4.2. 如果从自然数集 \mathbb{N} 到集合 X 存在一个一一对应 $f: \mathbb{N} \rightarrow X$, 则称集合 X 为可数无穷集合, 简称可数集或可列集。如果 X 不是可数集且 X 不是有穷集合, 则称 X 为不可数无穷集合, 简称不可数集。

定理4.1. 集合 A 为可数集的充分必要条件为 A 的全部元素可以排成无重复项的序列

$$a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$$

因此, A 可写成 $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$ 。

定理4.2. 可数集的任一无限子集也是可数集。

定理4.3. 设 A 为可数集合, B 为有穷集合, 则 $A \cup B$ 为可数集。

定理4.4. 设 A 与 B 为两个可数集, 则 $A \cup B$ 为可数集。

定理4.5. 设 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 为可数集合的一个无穷序列, 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 为可数集。即可数多个可数集之并为可数集。

定理4.6. 设 A 与 B 为两个可数集, 则 $A \times B$ 为可数集。

定理4.7. 全体有理数之集 \mathbb{Q} 为可数集。

定理4.8. 区间 $[0, 1]$ 中的所有实数构成的集合为不可数集。

定义4.3. 凡与集合 $[0, 1]$ 存在一个一一对应的集合称为具有“连续统的势”的集合, 简称连续统。

定理4.9. 无穷集合必包含有可数子集。

定理4.10. 设 M 为一个无穷集合, A 为至多可数集合, 则 $M \sim M \cup A$ 。

证明. 因为 M 为一个无穷集合, 所以 M 中必有一个可数子集 D 。令 $P = M \setminus D$, 则

$$M = P \cup D, M \cup A = P \cup (D \cup (A \setminus P))$$

由 $P \sim P$, $D \sim D \cup (A \setminus P)$, 得到 $M \sim M \cup A$ 。

□

定理4.11. 设 M 为无穷集合, A 为 M 的至多可数子集, $M \setminus A$ 为无穷集合, 则 $M \sim M \setminus A$ 。

定理4.12. 设 A_1, A_2, \dots, A_n 为 n 个两两不相交的连续统, 则 $\bigcup_{i=1}^n A_i$ 为连续统。

定理4.13. 设 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 为两两不相交的集序列。如果 $A_k \sim [0, 1], k = 1, 2, \dots$, 则

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \sim [0, 1]$$

推论4.1. 全体实数之集是一个连续统。

推论4.2. 全体无理数之集是一个连续统。

定义4.4. 集合 A 的基数为一个符号, 凡与 A 对等的集合都赋以同一个记号。集合 A 的基数记为 $|A|$ 。

定义4.5. 所有与集合 A 对等的集合构成的集族称为 A 的基数。

定义4.6. 集合 A 的基数与集合 B 的基数称为是相等的, 当且仅当 $A \sim B$ 。

定义4.7. 设 α, β 为任意两个基数, A, B 为分别以 α, β 为其基数的集合。如果 A 与 B 的一个真子集对等, 但 A 却不能与 B 对等, 则称基数 α 小于基数 β , 记为 $\alpha < \beta$ 。

显然, $\alpha \leq \beta$ 当且仅当存在单射 $f: A \rightarrow B$ 。

$\alpha < \beta$ 当且仅当存在单射 $f: A \rightarrow B$ 且不存在 A 到 B 的双射。

定理4.14 (康托). 对任一集合 M , $|M| < |2^M|$ 。

证明. 令 $i: M \rightarrow 2^M$, 其定义为对任意的 $m \in M$, $i(m) = \{m\}$ 。于是, i 为从 M 到 2^M 的单射, 故 $|M| \leq |2^M|$ 。为了完成定理的证明, 我们还需要证明: 如果 $f: M \rightarrow 2^M$ 为单射, 则 f 一定不为满射。为此, 令

$$X = \{m \in M | m \notin f(m)\}$$

显然, $X \in 2^M$ 。现在证明对任意的 $x \in M$, $f(x) \neq X$ 。实际上, 如果存在 $x_0 \in X$ 使得 $f(x_0) = X$, 则如果 $x_0 \in X$, 那么由 X 的定义知 $x_0 \notin f(x_0)$, 即 $x_0 \notin X$; 如果 $x_0 \notin X$, 即 $x_0 \notin f(x_0)$, 由 X 的定义可得 $x_0 \in X$ 。总之, $x_0 \in X$ 与 $x_0 \notin X$ 都引出矛盾, 从而不存在 $x_0 \in M$ 使得 $f(x_0) = X$ 。因此, f 不为满射, 从而

$$|M| < |2^M|$$

□

定理4.15 (康托-伯恩斯坦). 设 A, B 为两个集合。如果存在单射 $f: A \rightarrow B$ 与单射 $g: B \rightarrow A$, 则 A 与 B 的基数相等。

证法一. 设 $f : A \rightarrow B$ 和 $g : B \rightarrow A$ 都为单射。令 $\psi : 2^A \rightarrow 2^A$, 对任意的 $E \in 2^A$,

$$\psi(E) = A \setminus g(B \setminus f(E))$$

易见, 如果 $E \subseteq F \subseteq A$, 则 $\psi(E) \subseteq \psi(F)$ 。令

$$\mathbb{D} = \{E \subseteq A \mid E \subseteq \psi(E)\}$$

, 则 $\phi \in \mathbb{D}$ 。又令

$$D = \bigcup_{E \in \mathbb{D}} E,$$

则对任意的 $E \in \mathbb{D}$, 由 $E \subseteq D$ 知 $E \subseteq \psi(E) \subseteq \psi(D)$, 从而 $D \subseteq \psi(D)$ 。于是 $\psi(D) \subseteq \psi(\psi(D))$, 故 $\psi(D) \in \mathbb{D}$, 因此, $\psi(D) \subseteq D$, 所以

$$D = \psi(D) = A \setminus g(B \setminus f(D))$$

令 $h : A \rightarrow B$, 对任意的 $x \in A$, 定义

$$h(x) = \begin{cases} f(x), & \text{如果 } x \in D \\ g^{-1}(x), & \text{如果 } x \in A \setminus D \end{cases}$$

其中 g^{-1} 为视 g 为 B 到 $g(B)$ 的一一对应时 g 的逆, 易见 h 为一一对应。所以 A 与 B 的基数相等。 \square

。

证法二. We separate A into two disjoint sets A_1 and A_2 . We let A_1 consist of all $x \in A$ such that, when we lift back x by a succession of inverse maps,

$$x, g^{-1}(x), f^{-1}(g^{-1}(x)), g^{-1}(f^{-1}(g^{-1}(x))) \dots$$

then x can be lifted indefinitely, or at some stage we get stopped in A (i.e. reach an element of A which has no inverse image in B by g). We let A_2 be the complement of A_1 , in other words, the set of $x \in A$ from which we get stopped in B by following the succession of inverse maps. We shall define a bijection h of A onto B .

If $x \in A_1$, we define $h(x) = f(x)$.

If $x \in A_2$, we define $h(x) = g^{-1}(x)$.

Then trivially, h is injective. We must prove that h is surjective. Let $y \in B$. If, when we try to lift back y by a succession of maps

$$y, f^{-1}(y), g^{-1}(f^{-1}(y)), f^{-1}(g^{-1}(f^{-1}(y))) \dots$$

we can lift back indefinitely, or if we get stopped in A , then $f^{-1}(y)$ is defined, and $f^{-1}(y)$ lies in A_1 . Consequently, $y = h(f^{-1}(y))$ is in the image of h . On the other hand, if we cannot lift back y indefinitely, and get stopped in B , then $g(y)$ belongs to A_2 . In this case, $y = h(g(y))$ is also in the image of h , as was to be shown. \square

定义4.8. 设 α, β 为两个基数, A 与 B 为两个不相交集, $|A| = \alpha, |B| = \beta$, 则集合 $A \cup B$ 的基数称为基数 α 与 β 的和, 记为 $\alpha + \beta$ 。

定义4.9. 设 α, β 为两个基数, A 与 B 为两个集合, $|A| = \alpha, |B| = \beta$, 则集合 $A \times B$ 的基数称为基数 α 与 β 的积, 记为 $\alpha \cdot \beta$ 或者 $\alpha\beta$ 。

定义4.10. 设 α, β 为两个基数, A 与 B 为两个集合, $|A| = \alpha, |B| = \beta$, 则集合 $B^A = \{f | f: A \rightarrow B\}$ 的基数称为 β 的 α 次幂, 记为 β^α 。

定理4.16. 设 a 为可数集的基数, c 为连续统的基数, 则

$$1. \forall n \in N \cup \{0\}, n + a = a.$$

$$2. \forall n \in N, n \cdot a = a.$$

$$3. \forall n \in N, n \cdot c = c.$$

$$4. a \cdot c = c.$$

$$5. c \cdot c = c.$$

$$6. 2^a = c.$$

$$7. (2^a)^a = c.$$

$$8. a^a = 2^a.$$

刻画集合的ZFC公理系统 (Zermelo-Fraenkel-Choice axioms of set theory) :

公理4.1 (外延公理).

$$\forall A \forall B (\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \rightarrow A = B)$$

公理4.2 (空集公理).

$$\exists \phi \forall x (x \notin \phi)$$

公理4.3 (对公理).

$$\forall u \forall v \exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow x = u \vee x = v)$$

公理4.4 (并集公理).

$$\forall A \exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow (\exists b \in A) x \in b)$$

公理4.5 (幂集公理).

$$\forall a \exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow x \subseteq a)$$

公理4.6 (子集公理).

$$\forall c \exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow x \in c \wedge \varphi(x))$$

公理4.7 (无穷公理).

$$\exists A(\phi \in A \wedge (\forall a \in A)a^+ \in A)$$

其中 $a^+ = a \cup \{a\}$

公理4.8 (代换公理).

$$\begin{aligned} & \forall A((\forall x \in A)\forall y_1\forall y_2(\varphi(x, y_1) \wedge \varphi(x, y_2) \rightarrow y_1 = y_2) \\ & \rightarrow \exists B\forall y(y \in B \leftrightarrow (\exists x \in A)\varphi(x, y))) \end{aligned}$$

公理4.9 (正则公理).

$$(\forall A \neq \phi)(\exists m \in A)m \cap A = \phi$$

公理4.10 (选择公理).

$$(\forall relation R)(\exists function F)(F \subseteq R \wedge dom F = dom R)$$

刻画自然数的Peano公理系统:

1. $0 \in \mathbb{N}$;
2. $n \in \mathbb{N} \rightarrow n++ \in \mathbb{N}$;
3. $\forall n \in \mathbb{N} n++ \neq 0$;
4. $\forall n \in \mathbb{N} \forall m \in \mathbb{N} n \neq m \rightarrow n++ \neq m++$;
5. $(P(0) \wedge \forall n \in \mathbb{N} p(n) \rightarrow p(n++)) \rightarrow \forall n p(n)$.

刻画实数的公理系统:

设 $x, y, z \in \mathbb{R}$, 则

1. $x + y = y + x$
2. $(x + y) + z = x + (y + z)$
3. $0 + x = x + 0 = x$
4. $(-x) + x = x + (-x) = 0$
5. $x * y = y * x$
6. $(x * y) * z = x * (y * z)$
7. $1 * x = x * 1 = x$
8. $x^{-1} * x = x * x^{-1} = 1 (x \neq 0)$
9. $x * (y + z) = x * y + x * z$
10. $(y + z) * x = y * x + z * x$

11. 对任意的 $x \in R$, $y \in R$, $x < y, x = y, y < x$ 中有且仅有一个成立。
12. 对任意的 $x \in R$, $y \in R$, $z \in R$, 如果 $x < y$ 并且 $y < z$, 则 $x < z$ 。
13. 对任意的 $x \in R$, $y \in R$, $z \in R$, 如果 $x < y$, 则 $x + z < y + z$ 。
14. 对任意的 $x \in R$, $y \in R$, 如果 $x > 0$, $y > 0$, 则 $xy > 0$ 。
15. 设 $A_1, A_2, \dots, A_i, \dots$ 为实数集 R 上的闭区间, $A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq \dots \supseteq A_i \supseteq \dots$, 则 $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$ 非空。

第 五 章