

Math 151B Homework 4

Jiaping Zeng

8/27/2020

Q1 After expanding the expression we have

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + ahf(t_i, y(t_i)) + bhf(t_{i-1}, y(t_{i-1})) + chf(t_{i-2}, y(t_{i-2})) + dhf(t_{i-3}, y(t_{i-3}))$$

Then we can expand both sides using Taylor polynomials as follows:

$$LHS = y(t_{i+1}) = y(t_i) + hy'(t_i) + \frac{h^2}{2}y''(t_i) + \frac{h^3}{6}y'''(t_i) + \frac{h^4}{24}y^{(4)}(t_i) + O(h^5)$$

$$RHS = y(t_i) + ah y'(t_i) + bh y'(t_i - h) + ch y'(t_i - 2h) + dh y'(t_i - 3h)$$

$$= y(t_i) + ah y'(t_i) + bh[y'(t_i) - hy''(t_i) + \frac{h^2}{2}y'''(t_i) - \frac{h^3}{6}y^{(4)}(t_i) + O(h^4)] + ch[y'(t_i) - 2hy''(t_i) + 2h^2y'''(t_i) - \frac{4h^3}{3}y^{(4)}(t_i) + O(h^4)] + dh[y'(t_i) - 3hy''(t_i) + \frac{9h^2}{2}y'''(t_i) - \frac{9h^3}{2}y^{(4)}(t_i) + O(h^4)]$$

$$= y(t_i) + (a+b+c+d)hy'(t_i) + (-b-2c-3d)h^2y''(t_i) + (\frac{b}{2} + 2c + \frac{9d}{2})h^3y'''(t_i) + (-\frac{b}{6} - \frac{4c}{3} - \frac{9d}{2})h^4y^{(4)}(t_i) + O(h^5)$$

Then by matching coefficients we have

$$a + b + c + d = 1, b - 2c - 3d = \frac{1}{2}, \frac{b}{2} + 2c + \frac{9d}{2} = \frac{1}{6}, -\frac{b}{6} - \frac{4c}{3} - \frac{9d}{2} = \frac{1}{24}$$

$$\implies \boxed{a = \frac{55}{24}, b = -\frac{59}{24}, c = \frac{37}{24}, d = \frac{-3}{8}}$$

Q2

Q3