

1 Information Theory

Information Content (Surprisal)

$-\log_2 p(x)$: the more frequent the word, the lower its information content. e.g. the word type "blue" occurs ca. 3750 times in 10000 tokens, and its information content is $-\log_2(3750/10000) \approx 1.42$ bits.

Shannon Entropy

$H(X) = -\sum p(x) \log_2 p(x)$: entropy as probability, the average information content of information encoding units in the language. Measure of information encoding potential of a symbol system. The higher the uncertainty, the larger the entropy. e.g. $H_{char}(Morse) = -(\frac{86}{136} * \log_2(\frac{86}{136}) + \frac{50}{136} * \log_2(\frac{50}{136})) \approx 0.949$ bits per character.

Joint Entropy, Conditional Entropy

Joint Entropy: $H(X, Y) = -\sum \sum p(x, y) \log_2 p(x, y)$
Conditional Entropy: $H(Y|X) = -\sum p(x) \sum p(y|x) \log_2 p(y|x)$ The more ambiguity in language (uncertainty), the higher conditional entropy. No ambiguity > 0 .

Probability Estimation

Maximum Likelihood (ML)

Problems: unit problem, sample size problem, interdependence problem, extrapolation problem

Methods: frequency-based, language models, experiments with humans

Mutual Information

$I(X; Y) = H(X) - H(X|Y) = H(Y) - H(Y|X)$
reduction in the uncertainty of X given Y.
compromise between minimum learning cost H(Y) and maximum explicitness I(X; Y).

Entropy is the upper bound on the mutual information between forms and meanings

Is the entropy rate zero? -> asymptotic determinism of human utterances.

2 Propositional Logic

Why formal logic? overcome ambiguity, determine relationships between meanings of sentences, determine meanings of sentences, model compositionality, recursive system.

Definition

Proposition: The meaning of a simple declarative sentence

Extensions: real-world situations they refer to.

Frege's Generalization: The extension of a sentence S is its truth value

The proposition expressed by a sentence is the set of possible cases [situations] of which that sentence is true.

propositional variables: p, q,


r... propositional operators:
 \neg , conjunction \wedge , disjunction \vee , XOR, \rightarrow , \leftrightarrow

Syntax: Recursive Definition

- Propositional letters in the vocabulary of L are formulas in L.
- If ϕ is a formula in L, then $\neg\phi$ is too.
- If ϕ and ψ are formulas in L, then $(\phi \wedge \psi)$, $(\phi \vee \psi)$, $(\phi \rightarrow \psi)$, $(\phi \leftrightarrow \psi)$ are too.
- Only that which can be generated by the clauses (i)-(iii) in a finite number of steps is a formula in L.

invalid: $\neg(\neg\neg p)$, $\neg((p \wedge q))$

Construction Trees



Valuation Functions

For every valuation V and for all formulas ϕ :

$V(\phi \leftrightarrow \psi) = 1$ iff $V(\phi) = V(\psi)$.

3 Predicate Logic

Definition

constant symbols: a, b, c, ...

variable symbols: x, y, z, ...

n-ary/n-place predicate symbols: A, B, C, reflect relations between n elements ($n > 0$)

connectives: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \dots$

quantifiers: \forall, \exists


round brackets (), equal sign =

Syntax: Recursive Definition

- If A is an n-ary predicate letter in the vocabulary of L, and each of t_1, \dots, t_n is a constant or a variable in the vocabulary of L, then At_1, \dots, t_n is a formula in L.
- If ϕ is a formula in L, then $\neg\phi$ is too.
- If ϕ and ψ are formulas in L, then $(\phi \wedge \psi)$, $(\phi \vee \psi)$, $(\phi \rightarrow \psi)$, $(\phi \leftrightarrow \psi)$ are too.
- If ϕ is a formula in L and x is a variable, then $\forall x\phi$ and $\exists x\phi$ is too.
- Only that which can be generated by the clauses (i)-(iv) in a finite number of steps is a formula in L.

invalid: $a, A, \forall(Axy)$

Construction Trees



Semantics

domain (D): set of entities

interpretation functions $I = \langle m, e \rangle$, $\langle s, e \rangle$, $\langle v, e \rangle$, $I(m) = e$, $I(s) = e$, $I(v) = e$.
model M: consists of a domain D and an interpretation function I which conforms to:

- if c is a constant in L, then $I(c) \in D$
- if B is an n-ary predicate letter in L, then $I(B) \subset D$

valuation function V_M :

If Aa_1, \dots, a_n is an atomic sentence in L, then $V_M(Aa_1, \dots, a_n) = 1$ iff $\langle I(a_1), \dots, I(a_n) \rangle \in I(A)$.

$V_M(\forall x\phi) = 1$ iff $V_M([c/x]\phi) = 1$ for all constants c in L.

$V_M(\exists x\phi) = 1$ iff $V_M([c/x]\phi) = 1$ for at least one constant c in L.

If $V_M(\phi) = 1$, then ϕ is said to be true in model M.

Formula vs. Sentence

A sentence is a formula in L which lacks free variables.

Sentence: $Aa, \forall x(Fx), \forall x(Ax \rightarrow \exists yBy)$

Not a sentence (but Formula): $Ax, Fx, Ax \rightarrow \exists yBy$

4 Second-Order Logic

e.g. CR (CX: X is a predicate with the property of being a color; Rx: x is red)

$\exists X(CX \wedge X_m)$: Mars has a color.

$\exists X(X_j \wedge X_p)$: John has at least one thing in common with Peter.

Vocabulary extension

First-order predicate variables: X, Y, Z, ...

Second-order predicate constants: A, B, C, ... e.g. AX: X is a property with the property of being an animal

Syntax: Recursive Definition

- If A is an n-ary first-order predicate letter in the vocabulary of L, and each of t_1, \dots, t_n are individual terms in L, then At_1, \dots, t_n is an (atomic) formula in L.
- If X is a [first-order] predicate variable and t is an individual term (both constants and variables) in L, then Xt is an atomic formula in L;

3. If A is an n-ary second-order predicate letter/constant in L, and T_1, \dots, T_n are first-order unary predicate constants, or predicate variables, in L, then AT_1, \dots, T_n is an (atomic) formula in L;

4. If ϕ is a formula in L, then $\neg\phi$ is too.

5. If ϕ and ψ are formulas in L, then $(\phi \wedge \psi)$, $(\phi \vee \psi)$, $(\phi \rightarrow \psi)$, $(\phi \leftrightarrow \psi)$ are too.

6. If ϕ is a formula in L and x is a variable, then $\forall x\phi$ and $\exists x\phi$ is too.

7. If X is a [first-order] predicate variable, and ϕ is a formula in L, then $\forall X\phi$ and $\exists X\phi$ is too.

8. Only that which can be generated by the clauses (i)-(vii) in a finite number of steps is a formula in L.

invalid: $x, X, Xab, \forall(Xa)$

Semantics

just as a first-order predicate denotes a set of entities, a second-order predicate denotes a set of a set of entities.

5 Abbildungen

Eine Abbildung $f: X \rightarrow Y$ ist eine Vorschrift, die jedem $x \in X$ eindeutig ein bestimmtes $y = f(x) \in Y$ zuordnet. y ist das Bild von x und x das Urbild von y . Für eine Abbildung gilt, dass jedes Element der Urmenge X genau auf ein $y \in Y$ abbildet, es müssen aber nicht alle Elemente aus Y angenommen werden bzw. darf auch mehrfach angenommen werden (rechtseindeutig, linksvollständig).

Als Relation:

$f \subseteq A \times B$ mit $f = \{(a, f(a)) \mid a \in A \wedge f(a) \in B\}$

Funktionen

Sei $f \subseteq A \times B$ links-eindeutige und rechts-vollständige Relation.

F ist linksvollständig, wenn gilt $\forall a \in A \exists b \in B: (a, b) \in R$.

F ist rechtseindeutig, wenn gilt $\forall a \in A \forall b_1, b_2 \in B: (a, b_1) \in R \wedge (a, b_2) \in R \Rightarrow b_1 = b_2$.

Bild, Urbild

Sei $f: A \rightarrow B$ und $M \subseteq A$.

Das Bild von M unter f ist die Menge $f(M) := \{f(x) \mid x \in M\}$.


Das Urbild einer Teilmenge $N \subseteq B$ heißt $f^{-1}(N) := \{a \in A \mid f(a) \in N\}$.

Eigenschaften von Abbildungen

Injektivität:

$\forall x, y \in X: f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$


Jedes $y \in Y$ wird höchstens einmal (oder garnicht) getroffen:



Surjektivität:


$\forall y \in Y \exists x \in X: f(x) = y$

Jedes $y \in Y$ wird mindestens einmal getroffen:



Bijektivität:


Jedem $x \in X$ wird genau ein $y \in Y$ zugeordnet und jedem $y \in Y$ genau ein $x \in X$:



Beispiel für Abbildung, die injektiv aber nicht surjektiv ist: Sei $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. Dann ist $f(n) = n + 1$ injektiv, da $f(x) = f(y) \Leftrightarrow x + 1 = y + 1$ gelten muss, was nur gilt, wenn $x = y$. f ist nicht surjektiv da 0 kein Urbild.

Komposition

Die Komposition (Hintereinanderausführung) zweier Abbildungen $f: A \rightarrow B$ und $g: B \rightarrow C$ ist $a \mapsto (g \circ f)(a) = g(f(a))$, $a \in A$



Es gilt $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$. Außerdem gilt: Die Komposition von injektiven Abbildungen ist injektiv, die von surjektiven Abbildungen ist surjektiv und die von bijektiven Abbildungen ist bijektiv.

Identität, Umkehrabbildung

Die Abbildung $id_A : A \rightarrow A$ mit $id_A(a) = a$ heißt *Identität*.
Sei $f : A \rightarrow B$ bijektive Abbildung. Dann existiert zu f stets eine Abbildung g mit $g \circ f = id_B$ und $f \circ g = id_A$. g heißt die zu f *inverse Abbildung* (f^{-1}). Es gilt $f^{-1}(f(a)) = a$ und $f(f^{-1}(b)) = b$.

Mächtigkeit von Mengen, Abzählbarkeit

Gleichmächtige Mengen:
Seien M und N zwei Mengen. M und N heißen gleichmächtig, wenn es eine bijektive Abbildung $f : M \rightarrow N$ gibt ($M \cong N$).
Endliche Mengen:

Eine Menge M heißt endlich, wenn $M = \emptyset$ oder es für ein $n \in \mathbb{N}$ eine bijektive Abbildung $b : M \rightarrow \mathbb{N}_n$ gibt.

Unendliche Mengen:
Eine Menge M heißt unendlich, wenn M nicht endlich.

Abzählbare Mengen:

Eine Menge M heißt abzählbar, wenn M endlich oder es gibt bijektive Abbildung $b : M \rightarrow \mathbb{N}$.

Abzählbar unendliche Mengen:

Eine Menge M heißt abzählbar unendlich, wenn M abzählbar und M unendlich.

Überabzählbare Mengen:

Eine Menge M heißt überabzählbar, wenn M nicht abzählbar.

Spezielle endliche Mengen:

Sei $n \in \mathbb{N}$. Dann ist $\mathbb{N}_n := [n] := \{1, \dots, n\}$ die Menge der ersten n natürlichen Zahlen.

Beispiele:

$|\{a, b, c\}| = 3 = |\{x, y, 11\}|$

$|\mathbb{N}| = |\mathbb{R}| = |\mathbb{N} \times \mathbb{N}|$

Kardinalität

Anzahl der Elemente einer Menge.
Zwei Mengen haben gleiche Kardinalität, wenn sie gleichmächtig sind.

Beispielbeweis

Zu zeigen: $|\mathbb{N}| = |\mathbb{N} \times \mathbb{N}|$

Beweis. Wir betrachten $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ mit $f(n) := (1, n)$ und $g : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $g(n, m) := 2^n \cdot 3^m$. Beide sind injektiv, also $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{N} \times \mathbb{N}|$, also $|\mathbb{N}| = |\mathbb{N} \times \mathbb{N}|$.

6 Graphentheorie

Gerichteter Graph

$G = (V, E)$ wobei V Menge aller Knoten z.B. $V = \{v_0, v_1, v_2, \dots, v_n\}$ und $E \subseteq V \times V$ Menge aller Kanten mit $e = (v, u)$. Hierbei steht v für den Startknoten von e und u ist Endknoten von e .

Hinweis:

Ist die Kantenmenge E symmetrisch ($((u, v) \in E \wedge (v, u) \in E)$ sprechen wir von einem ungerichteten Graphen. In solchen werden keine Schlingen betrachtet.

Ungerichteter Graph

Zwei Knoten, die in einem Graphen durch eine Kante verbunden sind, heißen *adjacent* oder *benachbart*.

Endlicher Graph

Ein Graph G heißt endlich, wenn die Knotenmenge V endlich ist.


Nullgraph (vollst. unverbunden)

$G = (V, \emptyset) \Rightarrow$ ohne Kanten

Vollständiger Graph

$G = (V, V \times V)$ ist vollständig (heißt auch K_n wegen n Knoten) und hat Maximalzahl von n^2 Kanten \Rightarrow gerichtet und mit Schlingen. Der Ungerichtete K_n hat $\frac{n \cdot (n-1)}{2}$ Kanten, wobei n die Zahl der Knoten ist.

Beispiel:



Ungerichteter Graph

Ein Graph $G = (V, E)$ ist ungerichtet $\Leftrightarrow E$ ist symmetrisch $\Leftrightarrow (u, v) \in E \wedge (v, u) \in E$. Da hier die Kanten ungerichtet, kann Mengenschreibweise verwendet werden.


Schlinge

Kante mit gleichem Start- und Endknoten. Wird bei ungerichteten Graphen nicht betrachtet.

Bipartite Graphen

Ein ungerichteter Graph ist bipartit, wenn die Knotenmenge V in zwei disjunkte Teilmengen U, W zerlegbar ist, so dass alle Kanten $e \in E$ einen Endpunkt in U und einen anderen in W haben.

Beispiel:



Eulersche Graphen

G heißt eulerscher Graph, falls es in G einen geschlossenen Weg gibt, der jede Kante von G enthält.
 G ist eulerscher Graph \Leftrightarrow jede Ecke von G hat geraden Grad und G ist zusammenhängend.

Untergraph

Seien $G = (V_G, E_G)$, $H = (V_H, E_H)$ zwei Graphen. H heißt Teilgraph von G , wenn $V_H \subseteq V_G$ und $E_H \subseteq E_G$ (wenn also jede Kante von H auch zu G gehört.)

Hinweis:

Der Nullgraph O_n ist Teilgraph jedes Graphen mit n Knoten. Außerdem ist jeder Graph Teilgraph des vollständigen Graphen K_n .

Teilgraphen

Sei $G = (V, E)$ ein Graph. Ist $V' \subseteq V$ eine Teilmenge der Knotenmenge V von G , dann ist der Untergraph oder der durch V' induzierte Teilgraph von G der Graph $G[V'] = (V', E')$ mit $E' = \{(u, v) \mid u, v \in V' \wedge (u, v) \in E\}$

Beispiel:

Ist G ein Graph hat $G[\{2, 3, 4\}]$ nur die Knoten 2, 3 und 4 und die entsprechenden Kanten.

Grad eines Knoten

Der Ausgrad von v ist die Zahl der Kanten, die v als Startknoten besitzen. Der Ingrad von v ist die Zahl der Kanten, die in v enden. Ist G ungerichtet stimmen Ausgrad von v und Ingrad von v überein und wird Grad von v genannt.

Hinweis:

Sei $G = (V, E)$ gerichteter Graph, dann gilt $\sum_{v \in V} \text{indeg}(v) = \sum_{v \in V} \text{outdeg}(v) = |E|$. Ist G ungerichtet, dann gilt $\sum_{v \in V} \text{deg}(v) = 2 \cdot |E|$.

Wege

Ein Weg von den Knoten u nach v ist eine Folge benachbarter Knoten. Die Länge eines Weges ist die Anzahl der Kanten. Ein Weg der Länge 0 wird als trivialer Weg bezeichnet und besteht nur aus einem Knoten.

Hinweis:

Ein Weg heißt geschlossen, wenn seine beiden Endknoten gleich sind.

Graphzusammenhang

Knoten u und v eines ungerichteten Graphen heißen zusammenhängend, wenn es einen Weg in G von u nach v gibt.

Zusammenhangskomponente

Ein Graph G heißt zusammenhängend wenn jedes Knotenpaar aus G zusammenhängend ist.

Hinweis:

Die Äquivalenzklassen (zusammenhängende Teilgraphen) einer Zusammenhangsrelation Z über einem ungerichteten Graphen G heißen Zusammenhangskomponenten (ZK) von G .

Pfade, Kreise

Als *Pfad* werden Wege in einem Graphen bezeichnet, bei denen keine Kante zweimal durchlaufen wird. Ein geschlossener Pfad heißt *Kreis*. Bei einem *einfachen Pfad* wird kein Knoten mehrfach durchlaufen. Ein geschlossener Pfad, der mit Ausnahme seines Ausgangspunktes einfach ist, heißt *einfacher Kreis*. Ein einfacher Kreis durch sämtliche Knoten des Graphen, heißt *Hamiltonscher Kreis*.

Hamiltonscher Kreis


Kann der Zusammenhang eines Graphen G durch die Entnahme eines einzigen Knotens (und sämtlicher mit diesem Knoten benachbarter Kanten) zerstört wer-

den, dann besitzt G keinen Hamiltonschen Kreis.

Isomorphe Graphen

Zwei Graphen heißen isomorph zueinander, wenn sie strukturell gleich sind.

Beispiel:



v	1	2	3	4	5
$\phi(v)$	1	4	2	5	3

Komplementäre Graphen

Sei $G = (V, E)$ ein Graph. Dann ist $\bar{G} = (V, (V \times V) \setminus E)$ der Komplementärgraph von G .

Hinweis:

Ein Graph heißt selbstkomplementär wenn G und \bar{G} isomorph sind.