절대부등식

(1) 절대부등식: 문자를 포함한 부등식에서 그 문자에 어떤 실수를 대입해도 항상 성립하는 부등식

(2) 부등식의 증명에 자주 쓰는 실수의 성질: 두 실수 a, b에 대하여 ① $a-b>0 \iff a>b$ ② $a^2 \geq 0$, $a^2+b^2 \geq 0$ ③ $a^2+b^2=0 \iff a=b=0$ ④ $|a|^2=a^2$, $|a||b|=|ab|$ ⑤ $a>0$, $b>0$일 때, $a>b \iff a^2>b^2$

참고

$A \geq B$를 보일 때는 $A-B \geq 0$을 보인다. 근호나 절댓값이 있어 A, B가 모두 음이 아니면 $A^2-B^2 \geq 0$을 보인다.
미지수가 어떤 특정한 범위의 실수 값을 가질 때만 성립하는 부등식은 조건부등식이라 한다.

여러 가지 절대부등식

a, b, c가 실수일 때,

(1) $a^2 \pm ab+b^2 \geq 0$ (단, 등호는 $a=b=0$일 때 성립)

(2) $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca \geq 0$ (단, 등호는 $a=b=c$일 때 성립)

(3) $|a|+|b| \geq |a+b|$ (단, 등호는 $ab \geq 0$일 때 성립)

참고

(2)는 $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=\frac{1}{2}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}$에서 나온다. 같은 식으로 $(a+b+c)^2 \geq 3(ab+bc+ca)$이다.
(3)의 증명: $(|a|+|b|)^2-|a+b|^2=2(|ab|-ab) \geq 0$

산술평균과 기하평균의 관계

$a>0$, $b>0$일 때, $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ (단, 등호는 $a=b$일 때 성립)

$a>0$, $b>0$, $c>0$일 때, $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$ (단, 등호는 $a=b=c$일 때 성립)

참고

두 양수의 합이 일정하면 곱은 두 수가 같을 때 최대이고, 두 양수의 곱이 일정하면 합은 두 수가 같을 때 최소이다.
산술평균과 기하평균의 관계를 두 번 이상 쓸 때에는 각 등호가 동시에 성립하는지 확인한다. 동시에 성립하지 않으면 그 값은 최솟값(최댓값)이 아니다.
$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$는 $A^3+B^3+C^3-3ABC=\frac{1}{2}(A+B+C)\{(A-B)^2+(B-C)^2+(C-A)^2\} \geq 0$에서 나온다.

코시-슈바르츠 부등식

(1) a, b, x, y가 실수일 때, $(a^2+b^2)(x^2+y^2) \geq (ax+by)^2$ (단, 등호는 $\frac{x}{a}=\frac{y}{b}$일 때 성립)

(2) a, b, c, x, y, z가 실수일 때, $(a^2+b^2+c^2)(x^2+y^2+z^2) \geq (ax+by+cz)^2$ (단, 등호는 $\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}$일 때 성립)

참고

주어진 조건에 따라 쓰는 방법: ① 제곱의 합과 일차식의 합 ② 일차식의 합과 제곱근의 합 ③ 일차식의 합과 역수 꼴의 합 ④ $(\ +\ )(\ +\ )$ 꼴의 최솟값
부등식이 아니라 등식(방정식)이 주어져도, 그 등식이 코시-슈바르츠 부등식의 등호가 성립하는 경우이면 등호 조건으로 해를 구한다.
예: $2x^2+8y^2=(x+2y)^2 \iff (1^2+1^2)\{x^2+(2y)^2\}=(x+2y)^2 \to x=2y$
(2)의 증명: 모든 실수 t에 대하여 $(at-x)^2+(bt-y)^2+(ct-z)^2 \geq 0$이므로 t에 대한 이차식의 판별식이 0 이하이다.

$A \geq B$는 $A-B$를 완전제곱식의 합으로 나타내어 보이고, 근호나 절댓값이 있어 두 식이 모두 음이 아니면 제곱의 차 A^2-B^2의 부호를 조사한다.

281

1

다음은 두 실수 x, y에 대하여 부등식 $5x^2+4y^2+9 \geq 4x(y-3)$이 성립함을 증명하는 과정이다.

$5x^2+4y^2+9-4x(y-3)=(x-2y)^2+$ (가)
이고, $(x-2y)^2 \geq 0$, (가) ≥ 0이므로 $5x^2+4y^2+9 \geq 4x(y-3)$이다.
(단, 등호는 $x=$ (나), $y=$ (다)일 때 성립한다.)

위의 (가)에 알맞은 식을 $f(x)$, (나), (다)에 알맞은 수를 각각 α, β라 할 때, $f(2)+12(\alpha+\beta)$의 값을 구하시오.

282

2

두 양수 a, b에 대하여 다음 중 항상 성립하는 것을 모두 고르시오.

ㄱ. $\frac{b}{a^2}+\frac{a^2}{b} \geq 3$
ㄴ. $1+\frac{a}{2}>\sqrt{1+a}$
ㄷ. $\sqrt{\frac{a+b}{2}} \geq \frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{2}$

283

3

두 실수 a, b에 대하여 다음 중 항상 성립하는 것을 모두 고르시오.

ㄱ. $|a+b| \geq |a-b|$
ㄴ. $|a-b| \leq |a|+|b|$
ㄷ. $a>b>0$일 때, $\sqrt{a-b} > \sqrt{a}-\sqrt{b}$
ㄹ. $|a|-|b| \leq |a-b|$

(실수)$^2 \geq 0$을 이용한다. 완전제곱식의 합이 0 이하이면 각 완전제곱식이 모두 0이고, 식이 항상 0 이상이려면 완전제곱식을 묶고 남은 상수가 0 이상이어야 한다.

284

4

부등식 $2a^2+2a(2-3b)+9b^2+4 \leq 0$을 만족시키는 두 실수 a, b에 대하여 $9ab$의 값을 구하시오.

285

5

임의의 두 실수 a, b에 대하여 부등식 $a^2+b^2+5 \geq 2ka+2b$가 항상 성립하도록 하는 실수 k의 최댓값을 구하시오.

286

6

높이가 1인 정삼각형의 내부의 한 점 P에서 세 변에 내린 수선의 길이를 각각 a, b, c라 할 때, $ab+bc+ca$의 최댓값을 구하시오.

분수식은 분모와 같은 식이 나오도록 변형한 뒤 $A+\frac{k}{A} \geq 2\sqrt{k}$ $(A>0,\ k>0)$를 쓴다. 등호가 성립하는 값이 주어진 범위 안에 있는지 반드시 확인한다.

287

7

$x>-1$일 때, $\frac{x^2+x+4}{x+1}$의 최솟값을 m, 그때의 x의 값을 n이라 하자. $m+n$의 값을 구하시오.

288

8

이차방정식 $x^2-2\sqrt{5}x+k=0$이 허근을 가질 때, $k+5+\frac{9}{k-5}$는 $k=a$일 때 최솟값 b를 갖는다. $a+b$의 값을 구하시오.

(단, k는 실수이다.)

289

9

함수 $y=\sqrt{x^2+3x+4}+\frac{4}{x^2+3x+4}$의 최솟값을 구하시오.

290

10

$x>-2$일 때, $\sqrt{\frac{2x^2+2x+4}{x+2}}$는 $x=a$에서 최솟값 b를 갖는다. $a+b$의 값을 구하시오.

조건식을 곱하여 $(px+qy)\left(\frac{a}{x}+\frac{b}{y}\right)$ 꼴을 만든 뒤 전개한다. 산술평균과 기하평균의 관계를 두 번 쓰면 두 등호가 동시에 성립하지 않을 수 있으므로 한 번에 쓰도록 식을 만든다.

291

11

$\frac{1}{2a+1}+\frac{1}{3b+1}=\frac{1}{5}$을 만족시키는 두 양수 a, b에 대하여 $2a+3b$의 최솟값을 구하시오.

292

12

$x^2+y^2=1$을 만족시키는 두 양수 x, y에 대하여 $15x^2+8xy$의 최댓값을 구하시오.

293

13

세 양수 x, y, z에 대하여 $A=(x+2y)\left(\frac{1}{x}+\frac{2}{y}\right)$, $B=(x+y)\left(\frac{3}{x}+\frac{1}{3y}\right)$, $C=(x+y+z)\left(\frac{1}{x+y}+\frac{1}{z}\right)$의 최솟값을 각각 a, b, c라 할 때, a, b, c의 대소 관계를 구하시오.

길이를 문자로 놓고 넓이·둘레·비용을 식으로 나타낸 뒤, 합이나 곱이 일정한 관계를 찾는다. 삼각형 내부의 한 점에서 세 변까지의 거리는 넓이를 세 삼각형으로 나누어 관계식을 얻는다.

294

14

좌표평면 위의 점 $(3,\ 5)$를 지나는 직선 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ $(a>0,\ b>0)$과 x축, y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이의 최솟값을 구하시오.

295

15

$\overline{\mathrm{AB}}=8$, $\overline{\mathrm{BC}}=6$, $\overline{\mathrm{CA}}=10$인 직각삼각형 ABC의 내부의 한 점 P에서 세 변 AB, BC, CA에 이르는 거리가 각각 a, b, 2일 때, $\frac{4}{a}+\frac{3}{b}$의 최솟값을 구하시오.

296

16

철수는 넓이가 1200인 직사각형 ABCD 모양의 화단에 울타리를 설치하려고 한다. 이웃집과 맞닿은 변 BC의 울타리 설치비용은 이웃집과 절반씩 나누어 내고, 나머지 세 변의 설치비용은 철수가 모두 낸다. 철수가 내는 비용이 최소일 때, 변 BC의 길이를 구하시오.

(단, 울타리 설치비용은 울타리의 길이에 비례한다.)

297

17

$\overline{\mathrm{AB}}=6$, $\overline{\mathrm{BC}}=8$, $\angle \mathrm{B}=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에 내접하는 직사각형이 있다. 이 직사각형의 한 변은 선분 AC 위에 있고, 나머지 두 꼭짓점은 두 변 AB, BC 위에 각각 하나씩 있다. 이 직사각형의 넓이의 최댓값을 S, 그때의 직사각형의 둘레의 길이를 l이라 할 때, $l-S$의 값을 구하시오.

$(a^2+b^2)(x^2+y^2) \geq (ax+by)^2$에서 제곱의 합과 일차식 중 하나가 주어지면 다른 하나의 범위를 구할 수 있다. 계수를 맞추기 위해 $9x^2=(3x)^2$처럼 바꾸어 쓴다.

298

18

세 실수 a, b, c에 대하여 $a^2+b^2+c^2=1$이다. $2a+3b+6c$의 최댓값을 α, 그때의 $\frac{c^2}{ab}$의 값을 β라 할 때, $\alpha-\beta$의 값을 구하시오.

299

19

두 실수 x, y에 대하여 $3x+4y=5$일 때, $9x^2+4y^2$의 최솟값을 m, 그때의 x, y의 값을 각각 a, b라 하자. $\frac{m}{ab}$의 값을 구하시오.

300

20

$\overline{\mathrm{AC}}=5$, $\overline{\mathrm{BC}}=10$, $\angle \mathrm{C}=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 내부의 한 점 P에서 세 변 AB, BC, CA에 내린 수선의 길이가 각각 x, y, 2일 때, $9(x^2+y^2)$의 최솟값을 구하시오.

301

21

네 실수 a, b, c, d에 대하여 $a^2+b^2=2$, $c^2+d^2=18$일 때, $ab+cd$의 최댓값을 M_1, $ac+bd$의 최댓값을 M_2라 하자. M_1+M_2의 값을 구하시오.

제곱근의 합은 $(\sqrt{A}+\sqrt{B})^2 \leq (1^2+1^2)(A+B)$처럼 근호 안의 식의 합이 일정해지게 만든다. 역수의 합은 $(px+qy)\left(\frac{a}{x}+\frac{b}{y}\right) \geq (\sqrt{pa}+\sqrt{qb})^2$을 쓴다.

302

22

$x+2y=2$를 만족시키는 두 양수 x, y에 대하여 $\sqrt{5-2x}+\sqrt{3-4y}$의 최댓값을 m이라 할 때, $5m^2$의 값을 구하시오.

303

23

$4x+y=5$를 만족시키는 두 양수 x, y에 대하여 $\frac{1}{x}+\frac{9}{y}$의 최솟값과 그때의 x, y의 값을 모두 곱한 값을 구하시오.

304

24

$x+y=10$을 만족시키는 두 양수 x, y에 대하여 $\sqrt{21-2x}+\sqrt{23-2y}$의 최댓값을 구하시오.

합과 제곱의 합이 주어지면 구하는 문자를 남기고 나머지 문자들에 코시-슈바르츠 부등식을 써서 그 문자에 대한 이차부등식을 얻는다.

305

25

세 실수 x, y, z에 대하여 $x+2y+3z=3$, $x^2+y^2+z^2=12$일 때, z의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M+m$의 값을 구하시오.

306

26

세 실수 a, b, c에 대하여 $a+b+c=5$, $a^2+b^2+c^2=11$일 때, c의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M+3m$의 값을 구하시오.

주어진 조건이 코시-슈바르츠 부등식이나 산술평균과 기하평균의 관계에서 등호가 성립하는 경우이면, 등호 조건으로 문자 사이의 관계를 얻어 값을 구한다.

307

27

세 실수 x, y, z가 $x+2y-3z=18$, $x^2+4y^2+9z^2=108$을 만족시킬 때, $x+y+z$의 값을 구하시오.

308

28

$14(a^2+b^2+c^2)=(a+2b+3c)^2$을 만족시키는 실수 a, b, c에 대하여 $\frac{3c}{2b}$의 값을 구하시오.

(단, $b\neq 0$)

309

29

두 양수 x, y가 $4x(2-3y)\geq 1$, $6y(1-2x)\geq 1$을 동시에 만족시킬 때, $x+y$의 값을 구하시오.

310

30

$x>0$, $y>0$일 때, $\frac{24x^2+26xy+6y^2}{4x^2+4xy+y^2}$의 최댓값을 구하시오.

311

31

두 실수 x, y에 대하여 $2x^2+2y^2-4x+\frac{25}{x^2+2y^2+1}$의 최솟값을 구하시오.

312

32

$a+b=2$를 만족시키는 두 양수 a, b에 대하여 $\frac{2b-2}{a+1}+\frac{a}{b+2}$의 최솟값을 구하시오.

313

33

두 실수 x, y에 대하여 $\sqrt{4+y^2}+\sqrt{(x-2)^2+(2-y)^2}+\sqrt{(4-x)^2+1}$의 최솟값을 구하시오.

314

34

$a>0$, $b>0$, $c>0$일 때, $\left(\frac{3a}{4}+2b+\frac{5c}{2}\right)\left(\frac{1}{3a+2b}+\frac{1}{3b+5c}\right)$의 최솟값을 구하시오.

315

35

두 양수 x, y가 $6x^2+11xy+3y^2=10$을 만족시킬 때, $2x+y+\sqrt{2xy}$의 최댓값을 m이라 하자. m^2의 값을 구하시오.

316

36

두 양수 x, y가 $x^4+y^4=1$을 만족시킬 때, $3x^2+2\sqrt{2}xy$의 최댓값을 구하시오.

317

37

부등식 $|x-5|+|x+2|+|x(x-1)(x+2)(x+3)| \leq 7$을 만족시키는 모든 실수 x의 값의 합을 구하시오.

318

38

$a>1$인 실수 a에 대하여 두 곡선 $y=x^2-ax-a$, $y=ax^2+ax$의 두 교점을 지나는 직선의 기울기의 최댓값을 구하시오.

319

39

세 변의 길이가 a, b, c인 삼각형에서 $2s=a+b+c$라 할 때, $\frac{(s-a)(s-b)(s-c)}{abc}$의 최댓값을 구하시오.

40

$a+b+c=1$을 만족시키는 세 양수 a, b, c에 대하여 $M=\sqrt{3a+1}+\sqrt{3b+1}+\sqrt{3c+1}$이라 할 때, M의 정수 부분을 구하시오.

정답 및 풀이

1

▯ 22

$5x^2+4y^2+9-4xy+12x=(x^2-4xy+4y^2)+(4x^2+12x+9)=(x-2y)^2+(2x+3)^2$이므로 (가) $(2x+3)^2$

등호는 $x-2y=0$, $2x+3=0$일 때, 즉 $x=-\frac{3}{2}$, $y=-\frac{3}{4}$일 때 성립하므로 (나) $-\frac{3}{2}$, (다) $-\frac{3}{4}$

$f(x)=(2x+3)^2$, $\alpha=-\frac{3}{2}$, $\beta=-\frac{3}{4}$이므로 $f(2)+12(\alpha+\beta)=49+12\times\left(-\frac{9}{4}\right)=22$

2

▯ ㄴ, ㄷ

ㄱ. [반례] $a=b=1$이면 $\frac{b}{a^2}+\frac{a^2}{b}=2<3$ (거짓)

ㄴ. 양변이 모두 양수이므로 제곱의 차를 조사하면 $\left(1+\frac{a}{2}\right)^2-(1+a)=\frac{a^2}{4}>0$ (참)

ㄷ. 양변이 모두 양수이므로 제곱의 차를 조사하면 $\frac{a+b}{2}-\frac{a+b+2\sqrt{ab}}{4}=\frac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2}{4}\geq 0$ (참)

따라서 항상 성립하는 것은 ㄴ, ㄷ

3

▯ ㄴ, ㄷ, ㄹ

ㄱ. [반례] $a=2$, $b=-3$이면 $|a+b|=1$, $|a-b|=5$ (거짓)

ㄴ. $(|a|+|b|)^2-|a-b|^2=2(|ab|+ab)\geq 0$이고 두 식이 모두 음이 아니므로 성립한다. (참)

ㄷ. $(\sqrt{a-b})^2-(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2=2\sqrt{b}(\sqrt{a}-\sqrt{b})>0$이고 두 식이 모두 양수이므로 성립한다. (참)

ㄹ. $|a|<|b|$이면 좌변이 음수이므로 성립한다. $|a|\geq|b|$이면 $|a-b|^2-(|a|-|b|)^2=2(|ab|-ab)\geq 0$이므로 성립한다. (참)

따라서 항상 성립하는 것은 ㄴ, ㄷ, ㄹ

4

▯ 12

$2a^2+2a(2-3b)+9b^2+4=(a^2+4a+4)+(a^2-6ab+9b^2)=(a+2)^2+(a-3b)^2$

$(a+2)^2+(a-3b)^2\leq 0$이고 a, b가 실수이므로 $a+2=0$, $a-3b=0$

$a=-2$, $b=-\frac{2}{3}$이므로 $9ab=9\times(-2)\times\left(-\frac{2}{3}\right)=12$

5

▯ 2

$a^2+b^2+5-2ka-2b=(a-k)^2+(b-1)^2+4-k^2$

이 식이 모든 실수 a, b에 대하여 0 이상이려면 $a=k$, $b=1$일 때도 0 이상이어야 하므로 $4-k^2\geq 0$

$-2\leq k\leq 2$이므로 k의 최댓값은 2

6

▯ $\frac{1}{3}$

정삼각형의 한 변의 길이를 l이라 하면 넓이는 $\frac{1}{2}\times l\times 1=\frac{1}{2}l(a+b+c)$이므로 $a+b+c=1$

$(a+b+c)^2-3(ab+bc+ca)=a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=\frac{1}{2}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}\geq 0$

$ab+bc+ca\leq\frac{(a+b+c)^2}{3}=\frac{1}{3}$ (단, 등호는 $a=b=c=\frac{1}{3}$일 때 성립한다.)

따라서 $ab+bc+ca$의 최댓값은 $\frac{1}{3}$

7

▯ 4

$\frac{x^2+x+4}{x+1}=\frac{(x+1)^2-(x+1)+4}{x+1}=(x+1)+\frac{4}{x+1}-1$

$x+1>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $(x+1)+\frac{4}{x+1}-1\geq 2\sqrt{4}-1=3$

등호는 $x+1=\frac{4}{x+1}$, 즉 $(x+1)^2=4$에서 $x=1$일 때 성립하므로 $m=3$, $n=1$

$\therefore m+n=4$

8

▯ 24

허근을 가지므로 판별식을 D라 하면 $\frac{D}{4}=5-k<0$, 즉 $k>5$

$k-5>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $k+5+\frac{9}{k-5}=(k-5)+\frac{9}{k-5}+10\geq 2\sqrt{9}+10=16$

등호는 $(k-5)^2=9$에서 $k=8$일 때 성립하므로 $a=8$, $b=16$

$\therefore a+b=24$

9

▯ 3

$t=\sqrt{x^2+3x+4}$라 하면 $x^2+3x+4=\left(x+\frac{3}{2}\right)^2+\frac{7}{4}$이므로 $t\geq\frac{\sqrt{7}}{2}$이고 $y=t+\frac{4}{t^2}$

$t>0$이므로 세 양수의 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $y=\frac{t}{2}+\frac{t}{2}+\frac{4}{t^2}\geq 3\sqrt[3]{\frac{t}{2}\times\frac{t}{2}\times\frac{4}{t^2}}=3$

등호는 $\frac{t}{2}=\frac{4}{t^2}$, 즉 $t=2$일 때 성립하고 $2\geq\frac{\sqrt{7}}{2}$이므로 가능하다. ($x^2+3x+4=4$에서 $x=0$ 또는 $x=-3$)

따라서 최솟값은 3

10

▯ $\sqrt{2}$

$\frac{2x^2+2x+4}{x+2}=\frac{2(x+2)(x-1)+8}{x+2}=2(x+2)+\frac{8}{x+2}-6$

$x+2>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $2(x+2)+\frac{8}{x+2}\geq 2\sqrt{16}=8$ (단, 등호는 $(x+2)^2=4$, 즉 $x=0$일 때 성립한다.)

근호 안의 식의 최솟값이 $8-6=2$이므로 $a=0$, $b=\sqrt{2}$

$\therefore a+b=\sqrt{2}$

11

▯ 18

$2a+1>0$, $3b+1>0$이므로

$\{(2a+1)+(3b+1)\}\left(\frac{1}{2a+1}+\frac{1}{3b+1}\right)=2+\frac{2a+1}{3b+1}+\frac{3b+1}{2a+1}\geq 2+2=4$

(단, 등호는 $2a+1=3b+1$, 즉 $2a=3b$일 때 성립한다.)

$(2a+3b+2)\times\frac{1}{5}\geq 4$에서 $2a+3b\geq 18$

따라서 $2a+3b$의 최솟값은 18 ($a=\frac{9}{2}$, $b=3$일 때)

12

▯ 16

$x>0$, $y>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $x^2+16y^2\geq 2\sqrt{16x^2y^2}=8xy$ (단, 등호는 $x=4y$일 때 성립한다.)

$15x^2+8xy\leq 15x^2+x^2+16y^2=16(x^2+y^2)=16$

$x=4y$, $x^2+y^2=1$에서 $x=\frac{4}{\sqrt{17}}$, $y=\frac{1}{\sqrt{17}}$일 때 등호가 성립하므로 최댓값은 16

13

▯ $c<b<a$

$A=1+\frac{2x}{y}+\frac{2y}{x}+4\geq 5+2\sqrt{4}=9$ (단, 등호는 $x=y$일 때 성립) → $a=9$

$B=3+\frac{x}{3y}+\frac{3y}{x}+\frac{1}{3}\geq\frac{10}{3}+2=\frac{16}{3}$ (단, 등호는 $x=3y$일 때 성립) → $b=\frac{16}{3}$

$C=1+\frac{z}{x+y}+\frac{x+y}{z}+1\geq 4$ (단, 등호는 $z=x+y$일 때 성립) → $c=4$

따라서 $c<b<a$

14

▯ 30

삼각형의 넓이는 $\frac{1}{2}ab$이고, 직선이 점 $(3,\ 5)$를 지나므로 $\frac{3}{a}+\frac{5}{b}=1$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $1=\frac{3}{a}+\frac{5}{b}\geq 2\sqrt{\frac{15}{ab}}$

(단, 등호는 $\frac{3}{a}=\frac{5}{b}=\frac{1}{2}$일 때 성립한다.)

$\sqrt{ab}\geq 2\sqrt{15}$, $ab\geq 60$이므로 $\frac{1}{2}ab\geq 30$

따라서 넓이의 최솟값은 30 ($a=6$, $b=10$일 때)

15

▯ $\frac{7}{2}$

삼각형 ABC의 넓이는 세 삼각형 PAB, PBC, PCA의 넓이의 합이므로 $\frac{1}{2}\times 8\times 6=\frac{1}{2}(8a+6b+20)$, 즉 $4a+3b=14$

$(4a+3b)\left(\frac{4}{a}+\frac{3}{b}\right)=16+9+12\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\right)\geq 25+24=49$ (단, 등호는 $a=b$일 때 성립한다.)

$14\left(\frac{4}{a}+\frac{3}{b}\right)\geq 49$에서 $\frac{4}{a}+\frac{3}{b}\geq\frac{7}{2}$

따라서 최솟값은 $\frac{7}{2}$ ($a=b=2$일 때, 이때 P는 내심)

16

▯ 40

$\overline{\mathrm{BC}}=\overline{\mathrm{AD}}=x$, $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{CD}}=y$라 하면 $xy=1200$

철수가 내는 비용은 $x+2y+\frac{1}{2}x=\frac{3}{2}x+2y$에 비례한다.

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $\frac{3}{2}x+2y\geq 2\sqrt{3xy}=2\sqrt{3600}=120$

등호는 $\frac{3}{2}x=2y$, 즉 $y=\frac{3}{4}x$일 때 성립하므로 $\frac{3}{4}x^2=1200$에서 $x=40$

17

▯ $\frac{14}{5}$

직사각형을 DEFG(D, G는 선분 AC 위, E는 변 AB 위, F는 변 BC 위)라 하고 $\overline{\mathrm{DE}}=x$, $\overline{\mathrm{DG}}=y$라 하자.

세 삼각형 ABC, ADE, FGC가 서로 닮음이므로 $\overline{\mathrm{AD}}=\frac{3}{4}x$, $\overline{\mathrm{GC}}=\frac{4}{3}x$

$\overline{\mathrm{AC}}=10$이므로 $\frac{3}{4}x+y+\frac{4}{3}x=10$, 즉 $\frac{25}{12}x+y=10$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $10\geq 2\sqrt{\frac{25}{12}xy}$에서 $xy\leq 12$ (단, 등호는 $\frac{25}{12}x=y=5$일 때 성립한다.)

$S=12$, $x=\frac{12}{5}$, $y=5$이므로 $l=2\left(\frac{12}{5}+5\right)=\frac{74}{5}$

$\therefore l-S=\frac{74}{5}-12=\frac{14}{5}$

18

▯ 1

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $(2^2+3^2+6^2)(a^2+b^2+c^2)\geq(2a+3b+6c)^2$, 즉 $(2a+3b+6c)^2\leq 49$

$-7\leq 2a+3b+6c\leq 7$이므로 $\alpha=7$

최댓값일 때 $\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{6}=k$ $(k>0)$이고 $49k^2=1$에서 $k=\frac{1}{7}$

$\beta=\frac{36k^2}{6k^2}=6$이므로 $\alpha-\beta=1$

19

▯ 15

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $(1^2+2^2)\left\{(3x)^2+(2y)^2\right\}\geq(3x+4y)^2=25$

$9x^2+4y^2\geq 5$이므로 $m=5$

등호는 $\frac{3x}{1}=\frac{2y}{2}$, 즉 $y=3x$일 때 성립하므로 $3x+12x=5$에서 $x=\frac{1}{3}$, $y=1$

$\therefore\frac{m}{ab}=\frac{5}{\frac{1}{3}\times 1}=15$

20

▯ 64

$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{5^2+10^2}=5\sqrt{5}$이고 삼각형 ABC의 넓이는 25

세 삼각형 PAB, PBC, PCA의 넓이의 합이 25이므로 $\frac{1}{2}(5\sqrt{5}x+10y+10)=25$, 즉 $\sqrt{5}x+2y=8$

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $\left\{(\sqrt{5})^2+2^2\right\}(x^2+y^2)\geq(\sqrt{5}x+2y)^2=64$

$9(x^2+y^2)\geq 64$ (단, 등호는 $\frac{x}{\sqrt{5}}=\frac{y}{2}$일 때 성립한다.)

따라서 최솟값은 64

21

▯ 16

$a^2+b^2\geq 2ab$, $c^2+d^2\geq 2cd$이므로 $ab\leq 1$, $cd\leq 9$이고 $ab+cd\leq 10$

$a=b=1$, $c=d=3$일 때 등호가 성립하므로 $M_1=10$

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $(ac+bd)^2\leq(a^2+b^2)(c^2+d^2)=36$이므로 $ac+bd\leq 6$

$a=b=1$, $c=d=3$일 때 등호가 성립하므로 $M_2=6$

$\therefore M_1+M_2=16$

22

▯ 40

$(5-2x)+(3-4y)=8-2(x+2y)=4$

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $(\sqrt{5-2x}+\sqrt{3-4y})^2\leq(1^2+1^2)\{(5-2x)+(3-4y)\}=8$

등호는 $5-2x=3-4y=2$, 즉 $x=\frac{3}{2}$, $y=\frac{1}{4}$일 때 성립하므로 $m^2=8$

$\therefore 5m^2=40$

23

▯ $\frac{15}{2}$

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $(4x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{9}{y}\right) \geq (2+3)^2 = 25$이므로 $\frac{1}{x}+\frac{9}{y} \geq 5$

등호는 $\frac{\sqrt{4x}}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = \frac{\sqrt{y}}{\frac{3}{\sqrt{y}}}$, 즉 $y=6x$일 때 성립하므로 $10x=5$에서 $x=\frac{1}{2}, y=3$

따라서 구하는 값은 $5\times\frac{1}{2}\times 3 = \frac{15}{2}$

24

▯ $4\sqrt{3}$

$(21-2x)+(23-2y) = 44-2(x+y) = 24$

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $(\sqrt{21-2x}+\sqrt{23-2y})^2 \leq (1^2+1^2)\times 24 = 48$

등호는 $21-2x = 23-2y = 12$, 즉 $x=\frac{9}{2}, y=\frac{11}{2}$일 때 성립한다.

따라서 최댓값은 $4\sqrt{3}$

25

▯ $\frac{9}{7}$

$x+2y = 3-3z$, $x^2+y^2 = 12-z^2$

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $(1^2+2^2)(x^2+y^2) \geq (x+2y)^2$이므로 $5(12-z^2) \geq (3-3z)^2$

$14z^2-18z-51 \leq 0$이고, z의 최댓값과 최솟값은 이차방정식 $14z^2-18z-51=0$의 두 근이다. (각각 $\frac{x}{1}=\frac{y}{2}$일 때 등호 성립)

근과 계수의 관계에 의하여 $M+m = \frac{18}{14} = \frac{9}{7}$

26

▯ 4

$a+b=5-c$, $a^2+b^2 = 11-c^2$

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $(1^2+1^2)(a^2+b^2) \geq (a+b)^2$이므로 $2(11-c^2) \geq (5-c)^2$

$3c^2-10c+3 \leq 0$, $(3c-1)(c-3) \leq 0$에서 $\frac{1}{3} \leq c \leq 3$ (단, 등호는 $a=b$일 때 성립한다.)

$M=3$, $m=\frac{1}{3}$이므로 $M+3m=4$

27

▯ 7

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $(1^2+1^2+1^2)\left\{x^2+(2y)^2+(-3z)^2\right\} \geq (x+2y-3z)^2$

좌변은 $3\times 108 = 324$, 우변은 $18^2 = 324$이므로 등호가 성립한다.

즉, $x=2y=-3z$이고 $x+2y-3z = 3x = 18$에서 $x=6, y=3, z=-2$

$\therefore x+y+z = 7$

28

▯ $\frac{9}{4}$

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $(1^2+2^2+3^2)(a^2+b^2+c^2) \geq (a+2b+3c)^2$이고 주어진 등식은 등호가 성립하는 경우이다.

따라서 $\frac{a}{1}=\frac{b}{2}=\frac{c}{3}$이므로 $c=\frac{3}{2}b$

$\therefore \frac{3c}{2b} = \frac{9}{4}$

29

▯ $\frac{7}{12}$

$x>0, y>0$이므로 $2-3y>0, 1-2x>0$이다.

두 부등식을 변끼리 곱하면 $\{4x(1-2x)\}\{6y(2-3y)\} \geq 1$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $4x(1-2x) = 2\times 2x(1-2x) \leq 2\times\left(\frac{2x+(1-2x)}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$, $6y(2-3y) = 2\times 3y(2-3y) \leq 2\times 1^2 = 2$

두 식의 곱은 1 이하이므로 등호가 모두 성립해야 한다. 즉, $2x=1-2x$, $3y=2-3y$에서 $x=\frac{1}{4}, y=\frac{1}{3}$

이때 $4x(2-3y)=1$, $6y(1-2x)=1$이므로 조건을 만족시킨다. $\therefore x+y=\frac{7}{12}$

30

▯ $\frac{25}{4}$

$\frac{24x^2+26xy+6y^2}{4x^2+4xy+y^2} = \frac{2(3x+y)(4x+3y)}{(2x+y)^2} = \frac{6x+2y}{2x+y}\times\frac{4x+3y}{2x+y}$

두 식 $\frac{6x+2y}{2x+y}$, $\frac{4x+3y}{2x+y}$는 양수이고 그 합은 $\frac{10x+5y}{2x+y}=5$로 일정하다.

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $5 \geq 2\sqrt{\frac{6x+2y}{2x+y}\times\frac{4x+3y}{2x+y}}$이므로 곱은 $\frac{25}{4}$ 이하이다.

등호는 $6x+2y=4x+3y$, 즉 $y=2x$일 때 성립하므로 최댓값은 $\frac{25}{4}$

31

▯ 5

$t=x^2+2y^2+1$이라 하면 $t \geq 1$이고 $2x^2+2y^2-4x = (x^2+2y^2+1)+(x^2-4x+4)-5 = t+(x-2)^2-5$

주어진 식 $= t+\frac{25}{t}+(x-2)^2-5 \geq 2\sqrt{25}+0-5 = 5$

등호는 $t=5$, $x=2$일 때, 즉 $x=2, y=0$일 때 성립하므로 최솟값은 5

32

▯ $\frac{1}{5}$

$b=2-a$이므로 $\frac{2b-2}{a+1} = \frac{2-2a}{a+1} = \frac{4}{a+1}-2$, $\frac{a}{b+2} = \frac{a}{4-a} = \frac{4}{4-a}-1$

주어진 식 $= 4\left(\frac{1}{a+1}+\frac{1}{4-a}\right)-3$이고 $(a+1)+(4-a)=5$

코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$\{(a+1)+(4-a)\}\left(\frac{1}{a+1}+\frac{1}{4-a}\right) \geq 4^2$이므로 $\frac{1}{a+1}+\frac{1}{4-a} \geq \frac{4}{5}$

등호는 $a+1=4-a$, 즉 $a=\frac{3}{2}, b=\frac{1}{2}$일 때 성립하므로 최솟값은 $4\times\frac{4}{5}-3 = \frac{1}{5}$

33

▯ 5

좌표평면 위의 네 점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(2,\ y)$, $\mathrm{B}(x,\ 2)$, $\mathrm{C}(4,\ 3)$을 잡으면 주어진 식은 $\overline{\mathrm{OA}}+\overline{\mathrm{AB}}+\overline{\mathrm{BC}}$이다.

꺾은선 OABC의 길이는 선분 OC의 길이 이상이므로 주어진 식 $\geq \overline{\mathrm{OC}} = \sqrt{4^2+3^2} = 5$

등호는 A, B가 선분 OC 위에 있을 때, 즉 $y=\frac{3}{2}$, $x=\frac{8}{3}$일 때 성립하므로 최솟값은 5

34

▯ $\frac{3}{4}+\frac{\sqrt{2}}{2}$

$\frac{3a}{4}+2b+\frac{5c}{2} = \frac{3a+2b}{4}+\frac{3b+5c}{2}$이므로 $X=3a+2b$, $Y=3b+5c$라 하면

주어진 식 $= \left(\frac{X}{4}+\frac{Y}{2}\right)\left(\frac{1}{X}+\frac{1}{Y}\right) = \frac{3}{4}+\frac{X}{4Y}+\frac{Y}{2X}$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $\frac{X}{4Y}+\frac{Y}{2X} \geq 2\sqrt{\frac{1}{8}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (단, 등호는 $X^2=2Y^2$일 때 성립하며 이를 만족시키는 양수 a, b, c가 있다.)

따라서 최솟값은 $\frac{3}{4}+\frac{\sqrt{2}}{2}$

35

▯ 10

$(2x+y+\sqrt{2xy})^2 = (2x+y)^2 + (2x+y) \times 2\sqrt{2xy} + 2xy$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $2\sqrt{2xy} = 2\sqrt{x \times 2y} \le x + 2y$ (단, 등호는 $x = 2y$일 때 성립한다.)

$(2x+y+\sqrt{2xy})^2 \le (2x+y)^2 + (2x+y)(x+2y) + 2xy = 6x^2 + 11xy + 3y^2 = 10$

$x = 2y$이고 $6x^2 + 11xy + 3y^2 = 49y^2 = 10$일 때 등호가 성립하므로 $m^2 = 10$

36

▯ $2\sqrt{5}$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $2\sqrt{2}xy = 2\sqrt{x^2 \times 2y^2} \le x^2 + 2y^2$ (단, 등호는 $x^2 = 2y^2$일 때 성립한다.)

$3x^2 + 2\sqrt{2}xy \le 4x^2 + 2y^2$

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $(4x^2 + 2y^2)^2 \le (4^2 + 2^2)(x^4 + y^4) = 20$이므로 $4x^2 + 2y^2 \le 2\sqrt{5}$ (단, 등호는 $\frac{x^2}{4} = \frac{y^2}{2}$, 즉 $x^2 = 2y^2$일 때 성립한다.)

두 등호가 모두 $x^2 = 2y^2$일 때 성립하므로 최댓값은 $2\sqrt{5}$

37

▯ -1

$|x-5| + |x+2| = |5-x| + |x+2| \ge |(5-x) + (x+2)| = 7$ (단, 등호는 $(5-x)(x+2) \ge 0$, 즉 $-2 \le x \le 5$일 때 성립한다.)

따라서 좌변은 $7 + |x(x-1)(x+2)(x+3)| \ge 7$이고, 부등식이 성립하려면 $-2 \le x \le 5$이고 $x(x-1)(x+2)(x+3) = 0$이어야 한다.

$x = 0, 1, -2$ ($x = -3$은 범위 밖)이므로 모든 x의 값의 합은 -1

38

▯ $-3-2\sqrt{2}$

두 식에서 y를 소거하면 $(1-a)x^2 - 2ax - a = 0$이고, $\frac{D}{4} = a^2 + a(1-a) = a > 0$이므로 두 곡선은 두 점에서 만난다.

교점에서 $x^2 = \frac{2ax+a}{1-a}$이므로 $y = x^2 - ax - a = \frac{2ax+a}{1-a} - ax - a$이고, 두 교점은 모두 이 직선 위에 있다.

기울기는 $\frac{2a}{1-a} - a$이고 $t = a - 1 > 0$이라 하면 $-\frac{2(t+1)}{t} - (t+1) = -3 - \left(t + \frac{2}{t}\right)$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $t + \frac{2}{t} \ge 2\sqrt{2}$ (단, 등호는 $t = \sqrt{2}$일 때 성립한다.)

따라서 기울기의 최댓값은 $-3-2\sqrt{2}$

39

▯ $\frac{1}{8}$

$x = s-a, y = s-b, z = s-c$라 하면 삼각형의 세 변의 길이의 조건에 의하여 x, y, z는 양수이고 $a = y+z$, $b = z+x$, $c = x+y$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $y+z \ge 2\sqrt{yz}$, $z+x \ge 2\sqrt{zx}$, $x+y \ge 2\sqrt{xy}$

세 식을 변끼리 곱하면 $abc = (y+z)(z+x)(x+y) \ge 8xyz$이므로 $\frac{(s-a)(s-b)(s-c)}{abc} = \frac{xyz}{abc} \le \frac{1}{8}$

등호는 $x = y = z$, 즉 정삼각형일 때 성립하므로 최댓값은 $\frac{1}{8}$

40

▯ 4

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $M^2 \le (1^2+1^2+1^2)\{(3a+1)+(3b+1)+(3$

$3 \times 6 = 18$이므로 $M \le 3\sqrt{2} < 5$

$0 < a < 1$이면 $(a+1)^2 = a^2 + 2a + 1 < 3a + 1$이므로 $\sqrt{3a+1} > a+1$이다. b, c도 마찬가지이다.

$M > (a+1) + (b+1) + (c+1) = 4$

$4 < M < 5$이므로 M의 정수 부분은 4