이차부등식의 풀이

## 1

이차부등식 $x^2+4x-5\le 0$의 해가 $\alpha\le x\le\beta$일 때, $\alpha^2+\beta^2$의 값을 구하시오.

| 고1 | 08 | 이차부등식 |
|---|---|---|

## 2

이차부등식 $x^2-2x-8<0$을 만족시키는 모든 정수 $x$의 값의 합을 구하시오.

## 3

이차부등식 $x^2-2x+4 \geq 4x-1$의 해가 $x \leq \alpha$ 또는 $x \geq \beta$일 때, 두 상수 $\alpha$, $\beta$에 대하여 $\beta-\alpha$의 값을 구하시오.

## 4

이차부등식 $f(x)>0$의 해가 $x \neq -1$인 모든 실수이고 $f(1)=8$일 때, 이차부등식 $f(x) \leq 18$을 만족시키는 모든 정수 $x$의 값의 합을 구하시오.


## 5

$x$에 대한 이차부등식 $x^2-(a+4)x+4a<0$을 만족시키는 정수 $x$의 개수가 $3$이 되도록 하는 모든 정수 $a$의 값의 합을 구하시오.

이차함수의 그래프와 이차부등식


## 6

이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, 이차부등식 $f(x)<0$을 만족시키는 모든 정수 $x$의 값의 합을 구하시오.



## 7

이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=g(x)$가 그림과 같을 때, 부등식 $f(x)g(x) \le 0$을 만족시키는 자연수 $x$의 개수를 구하시오.




## 8

함수 $f(x)=x^2-2x-8$에 대하여 함수 $g(x)=\frac{f(x)+|f(x)|}{2}$라 할 때, 부등식 $g(x) \le x+2$를 만족시키는 정수 $x$의 개수를 구하시오.


만나는 두 그래프의 위치 관계와 이차부등식

## 9

이차함수 $y=x^2-2x-4$의 그래프가 직선 $y=2x+1$보다 위쪽에 있는 부분의 $x$의 값의 범위가 $x<a$ 또는 $x>b$일 때, $a+2b$의 값을 구하시오.

## 10

두 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, 이차부등식 $f(x) \le g(x)$를 만족시키는 정수 $x$의 개수를 구하시오.



**11** 2010년 11월 고1 19번 [4점]

이차항의 계수가 음수인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x+1$이 두 점에서 만나고 그 교점의 $y$좌표가 각각 $3$과 $8$이다. 이차부등식 $f(x)-x-1>0$을 만족시키는 모든 정수 $x$의 값의 합을 구하시오.

**12**

이차함수 $y=-x^2+ax+7$의 그래프가 직선 $y=b$보다 아래쪽에 있는 부분의 $x$의 값의 범위가 $x<-1$ 또는 $x>5$일 때, 상수 $a$, $b$에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

## 13


이차함수 $y=2x^2-x-9$의 그래프가 직선 $y=4x+a$보다 아래쪽에 있는 부분의 $x$의 값의 범위가 $b<x<\frac{3}{2}$일 때, $b-a$의 값을 구하시오. (단, $a$는 상수이다.)

## 14

이차함수 $y=-2x^2+3x+2$의 그래프가 이차함수 $y=-x^2+ax+b$의 그래프보다 위쪽에 있는 부분의 $x$의 값의 범위가 $-2<x<3$일 때, 상수 $a$, $b$에 대하여 $a^2+b^2$의 값을 구하시오.

**15** 2015년 9월 고1 14번 [4점]

0이 아닌 실수 $p$에 대하여 이차함수 $f(x)=x^2+px+p$의 그래프의 꼭짓점을 A, 이 이차함수의 그래프가 $y$축과 만나는 점을 B라 할 때, 두 점 A, B를 지나는 직선 $l$의 방정식을 $y=g(x)$라 하자.




부등식 $f(x)-g(x)\le 0$을 만족시키는 정수 $x$의 개수가 10이 되도록 하는 정수 $p$의 최댓값을 $M$, 최솟값을 $m$이라 할 때, $M-m$의 값을 구하시오.

해가 주어진 이차부등식

**16**

이차부등식 $ax^2+bx+c>0$의 해가 $-1<x<2$일 때, 이차부등식 $ax^2+cx+3b<0$의 해는 $x<\alpha$ 또는 $x>\beta$이다. $\alpha\beta$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$, $c$는 상수이다.)

## 17

이차부등식 $ax^2 - x + b \leq 0$의 해가 $x \leq -2$ 또는 $x \geq \frac{3}{2}$일 때, $a + b$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$는 상수이다.)

## 18

실수 $a$, $b$에 대하여 이차부등식 $x^2 - (a+9)x + b + 3 < 0$의 해가 $2 < x < 4$일 때, 이차부등식 $ax^2 + bx + 2 \geq 0$을 만족시키는 정수 $x$의 개수를 구하시오.

## 19

$x$에 대한 이차부등식 $x^2 - ax - a + 3 \leq 0$의 해가 $x = b$뿐일 때, $a + b$의 값을 구하시오. (단, $a$는 양수이다.)

## 20

이차함수 $y = f(x)$의 그래프가 $x$축과 두 점 $(-5,\ 0)$, $(3,\ 0)$에서 만나고 점 $(0,\ 15)$를 지날 때, 부등식 $f\left(\frac{x}{2}\right) > 0$을 만족시키는 정수 $x$의 개수를 구하시오.

## 21

이차부등식 $ax^2+bx+c<0$의 해가 $x \neq -1$인 모든 실수일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $a<0$
ㄴ. $b^2-4ac \leq 0$
ㄷ. $bx^2+cx+a<0$의 해는 없다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이차부등식이 해를 가질 조건

## 22

$x$에 대한 이차부등식 $x^2+(k-1)x+k^2<0$의 해가 존재하도록 하는 실수 $k$의 값의 범위가 $\alpha<k<\beta$일 때, $\beta-\alpha$의 값을 구하시오.

## 23

$x$에 대한 이차부등식 $-3x^2+8kx \geq -3+8k$의 해가 단 한 개 존재하도록 하는 실수 $k$의 값을 구하시오.

## 24

$x$에 대한 이차부등식 $x^2-2(k-1)x+k^2-ak+b-1 \leq 0$의 해가 실수 $k$의 값에 관계없이 오직 한 개일 때, $a-b$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$는 실수이다.)

이차부등식이 해를 갖지 않을 조건

## 25

이차부등식 $2x^2-2ax+3a+8\le 0$이 해를 갖지 않도록 하는 정수 $a$의 최댓값을 구하시오.

## 26

$x$에 대한 이차부등식 $x^2+2(k-1)x-k^2-k+4<0$의 해가 존재하지 않도록 하는 실수 $k$의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

## 27

$x$에 대한 부등식 $(a-2)x^2+2ax+2a+3>0$의 해가 존재하지 않도록 하는 실수 $a$의 최댓값을 구하시오.

## 28

$x$에 대한 부등식 $(a-2)x^2-4(a-2)x+7<0$이 해를 갖지 않도록 하는 정수 $a$의 개수를 구하시오.

**29** 2018년 3월 고2 20번 [4점]

실수 $x$에 대한 부등식 $x^2-9 \le 2k(x-a)$에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $a$, $k$는 상수이다.)

보기

ㄱ. $a=3$일 때, 부등식의 해는 $x \le 2k-3$이다.

ㄴ. $a=5$일 때, 부등식의 해가 존재하지 않도록 하는 정수 $k$의 개수는 $7$이다.

ㄷ. $-3 \le a \le 3$일 때, 모든 실수 $k$에 대하여 부등식을 만족시키는 정수 $x$의 값은 항상 존재한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모든 실수에 대하여 성립하는 이차부등식

**30**

모든 실수 $x$에 대하여 이차부등식 $x^2+2ax-a+6 \ge 0$이 항상 성립하도록 하는 정수 $a$의 개수를 구하시오.

## 31

이차부등식 $(k-1)x^2+2(k-1)x+2 \geq 0$이 모든 실수 $x$에 대하여 성립하도록 하는 모든 정수 $k$의 값의 합을 구하시오.

## 32

모든 실수 $x$에 대하여 $\sqrt{(m+2)x^2-2(m+2)x+4}$가 실수가 되도록 하는 정수 $m$의 개수를 구하시오.

## 33

$x$에 대한 이차부등식 $x^2+(a-k)x+k^2+2a>0$의 해가 실수 $k$의 값에 관계없이 모든 실수가 되도록 하는 정수 $a$의 개수를 구하시오.

## 34

이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 부등식 $f(x)\le 0$의 해가 $-2\le x\le 2$이다.
(나) 모든 실수 $x$에 대하여 부등식 $f(x)\ge 4x-17$이 성립한다.

$f(4)$의 최댓값을 $M$, 최솟값을 $m$이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오.

만나지 않는 두 그래프의 위치 관계와 이차부등식

## 35

이차함수 $y=x^2-2(k-1)x+3$의 그래프가 직선 $y=2x-1$보다 항상 위쪽에 있도록 하는 상수 $k$의 값의 범위가 $a<k<b$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

## 36

모든 실수 $x$에 대하여 이차함수 $y=kx^2-4kx-1$의 그래프가 직선 $y=2x$보다 아래쪽에 있도록 하는 상수 $k$의 값의 범위가 $\alpha<k<\beta$일 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오.

## 37

함수 $y=(m+2)x^2+3$의 그래프가 직선 $y=(2m+4)x$보다 항상 위쪽에 있도록 하는 정수 $m$의 개수를 구하시오.

## 38 2016년 11월 고1 20번 [4점]

두 함수 $f(x)=x^2-ax+b$, $g(x)=ax+2b$가 임의의 실수 $x$에 대하여 $f(x)>g(x)$를 만족시킬 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $a$, $b$는 상수이다.)

<보기>

ㄱ. 임의의 실수 $x$에 대하여 $x^2-2ax-b>0$

ㄴ. $b<0$

ㄷ. 함수 $y=f(x)$의 그래프의 꼭짓점의 $y$좌표는 직선 $y=g(x)$의 $y$절편보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

제한된 범위에서 항상 성립하는 이차부등식

## 39

$3 \le x < 5$인 모든 실수 $x$에 대하여 부등식 $x^2 - 4x - 4k + 3 < 0$이 항상 성립하도록 하는 실수 $k$의 최솟값을 구하시오.

## 40

$1 \le x \le 5$에서 이차부등식 $-x^2 + 4x + 3k - 4 \ge 0$이 항상 성립하도록 하는 실수 $k$의 최솟값을 구하시오.

## 41

$0 \le x \le 3$인 모든 실수 $x$에 대하여 이차부등식 $x^2 - ax + a + 3 \ge 0$이 항상 성립하도록 하는 실수 $a$의 최댓값을 $M$, 최솟값을 $m$이라 할 때, $M + m$의 값을 구하시오.

이차방정식의 근의 판별과 이차부등식

## 42

$x$에 대한 이차방정식 $x^2 - 2ax + a + 6 = 0$이 서로 다른 두 허근을 갖도록 하는 정수 $a$의 개수를 구하시오.

## 43

최고차항의 계수가 $1$인 이차함수 $f(x)$와 자연수 $k$가 다음 조건을 만족시킬 때, 모든 $k$의 값의 합을 구하시오.

(가) 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 $x$축은 서로 다른 두 점 $(-1,\ 0)$, $(2k,\ 0)$에서 만난다.
(나) 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x-7k$는 만나지 않는다.

두 이차함수와 이차부등식

## 44

최고차항의 계수가 $1$인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 $x$축과 만나는 두 점의 $x$좌표가 각각 $-2$, $1$이고, 최고차항의 계수가 $-1$인 이차함수 $y=g(x)$의 그래프와 $x$축은 점 $(2,\ 0)$에서 접할 때, 부등식 $f(2x)+3g(x)\le 9x$를 만족시키는 정수 $x$의 개수를 구하시오.

## 45

두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $y=f(x)$의 그래프는 $x$축과 한 점 $(0,\ 0)$에서만 만난다.
(나) 부등식 $f(x)+g(x)\geq 0$의 해는 $x\leq 2$이다.
(다) 모든 실수 $x$에 대하여 $f(x)-g(x)\geq f(-1)-g(-1)$이다.

부등식 $f(x)-g(x)\leq 0$을 만족시키는 정수 $x$의 개수를 구하시오.

## 46

최고차항의 계수가 각각 $1$, $-1$인 두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 부등식 $g(x)\geq 3$의 해는 $x=2$이다.
(나) 부등식 $f(x)<g(x)$의 해는 $-3<x<1$이다.

$x$에 대한 두 방정식 $f(x)+n=k$, $g(x)=k$가 모두 실근을 갖지 않도록 하는 정수 $k$의 개수가 $8$일 때, 정수 $n$의 값을 구하시오.

**47** 2024년 6월 고1 21번 [4점]

최고차항의 계수가 $2$인 이차함수 $f(x)$와 최고차항의 계수가 $-1$인 이차함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $y=f(x)$의 그래프가 직선 $y=x$와 원점이 아닌 서로 다른 두 점 $\mathrm{P}$, $\mathrm{Q}$에서 만난다.
(나) 함수 $y=g(x)$의 그래프가 직선 $y=x$와 한 점 $\mathrm{P}$에서만 만난다.
(다) 점 $\mathrm{P}$의 $x$좌표는 점 $\mathrm{Q}$의 $x$좌표보다 작고, $\overline{\mathrm{OP}}=\overline{\mathrm{PQ}}$이다.

부등식 $f(x)+g(x)\geq 0$의 해가 모든 실수일 때, 점 $\mathrm{P}$의 $x$좌표의 최댓값을 구하시오. (단, $\mathrm{O}$는 원점이다.)

이차부등식의 활용

**48**

둘레의 길이가 $40\mathrm{m}$인 직사각형 모양의 꽃밭을 만들려고 한다. 꽃밭의 넓이가 $96\mathrm{m}^2$ 이상이고 가로의 길이가 세로의 길이 이상이 되도록 할 때, 가로의 길이의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오. (단, 단위는 $\mathrm{m}$이다.)

## 49

어느 가게에서 한 개에 $1000$원인 빵이 하루에 $400$개씩 팔린다. 빵 한 개의 가격을 $10x$원 올리면 하루 판매량은 $2x$개 줄어든다고 한다. 하루 판매 금액이 $448000$원 이상이 되도록 할 때, 빵 한 개의 가격의 최댓값을 구하시오. (단, $0 < x < 200$)

## 50

지면에서 똑바로 위로 쏘아 올린 물체의 $t$초 후의 지면으로부터의 높이를 $h\text{m}$라 하면 $h = 40t - 5t^2$이 성립한다. 이 물체의 높이가 $60\text{m}$ 이상인 시간은 몇 초 동안인지 구하시오.

이차식의 최대·최소

## 51

실수 $x$, $y$가 $2x^2+y^2=6x$를 만족시킬 때, $x^2+y^2$의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

## 52 2014학년도 경찰대학 11번 [4점]

실수 $x$에 대하여 $\frac{8x+8}{x^2+4}$의 최댓값을 $M$, 최솟값을 $m$이라 할 때, $M-m$의 값을 구하시오.

고난도

## 53

모든 실수 $x$, $y$에 대하여 부등식 $2x^2+4axy+3by^2 \geq 0$이 성립하도록 하는 $10$ 이하의 자연수 $a$, $b$의 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수를 구하시오.

## 54

$x$에 대한 이차방정식 $x^2-2(k-1)x+2k^2-4k-2=0$이 두 실근 $\alpha$, $\beta$를 가질 때, $(\alpha-\beta)^2$의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오. (단, $k$는 상수이다.)

## 55

$x$에 대한 이차부등식 $x^2+2ax-4a\le 0$의 해는 한 개이고, $x$에 대한 이차부등식 $ax^2+4x+3a+b>0$은 해를 갖지 않을 때, 두 실수 $a$, $b$에 대하여 $a+b$의 최댓값을 구하시오. (단, $a\neq 0$)

## 56

최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)$의 값을 구하시오.

(가) 이차부등식 $f(x) \geq 4$의 해는 $x \leq -1$ 또는 $x \geq 3$ 이다.
(나) 이차부등식 $f(x) \leq -4$의 해의 개수는 $1$이다.

## 57

$x$에 대한 이차부등식 $x^2 - 3x - a < 0$을 만족시키는 모든 정수 $x$의 값의 합이 $9$가 되도록 하는 정수 $a$의 개수를 구하시오.

## 58

다항식 $f(x)=(a-1)x^2+(a-k)x+2a-3$에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $a$, $k$는 실수이다.)

보기

ㄱ. 이차부등식 $f(x)>3x-a^2$의 해가 $1<x<2$이면 $ak=10$이다.

ㄴ. 이차방정식 $f(x)=0$이 실수 $k$의 값에 관계없이 실근을 갖도록 하는 정수 $a$는 없다.

ㄷ. $k=a$일 때, 이차부등식 $f(x)\le 0$의 해가 1개가 되도록 하는 실수 $a$는 1개이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 59 2025년 6월 고1 21번 [4점]

실수 $k$와 최고차항의 계수가 $\frac{1}{2}$인 이차함수 $f(x)$에 대하여 $x$에 대한 방정식 $f(x)+x=k$가 서로 다른 두 자연수 $\alpha$, $\beta$를 근으로 가질 때, 함수 $f(x)$는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(\beta)=\beta$

(나) 모든 실수 $x$에 대하여 $f(x)\ge\beta$이다.

$f(0)\le\alpha+\beta+f(\alpha)$일 때, 모든 $f(6)$의 값의 곱을 구하시오.

## 60

함수 $f(x)=x^2+4x-12$에 대하여 부등식 $2f(x)-|f(x)| \geq mx-a$가 모든 실수 $x$에 대하여 성립하도록 하는 실수 $a$의 최솟값이 $84$ 이하가 되도록 하는 모든 정수 $m$의 값의 합을 구하시오.

정답 및 풀이

이차부등식

# 정답 및 풀이

1

[정답] $26$

$x^2+4x-5 \leq 0$에서 $(x+5)(x-1) \leq 0 \therefore -5 \leq x \leq 1$

$\alpha=-5, \beta=1$이므로 $\alpha^2+\beta^2=25+1=26$

2

[정답] $5$

$x^2-2x-8<0$에서 $(x+2)(x-4)<0 \therefore -2<x<4$

정수 $x$는 $-1, 0, 1, 2, 3$이므로 그 합은 $5$

3

[정답] $4$

$x^2-2x+4 \geq 4x-1$에서 $x^2-6x+5 \geq 0$, $(x-1)(x-5) \geq 0 \therefore x \leq 1$ 또는 $x \geq 5$

$\alpha=1, \beta=5$이므로 $\beta-\alpha=4$

4

[정답] $-7$

$f(x)>0$의 해가 $x \neq -1$인 모든 실수이므로 $f(x)=a(x+1)^2$ $(a>0)$

$f(1)=4a=8 \therefore a=2$

$2(x+1)^2 \leq 18$에서 $(x+1)^2 \leq 9$, $(x+4)(x-2) \leq 0 \therefore -4 \leq x \leq 2$

정수 $x$는 $-4, -3, \cdots, 2$이므로 그 합은 $-7$

5

[정답] $8$

$x^2-(a+4)x+4a<0$에서 $(x-4)(x-a)<0$

( i ) $a>4$일 때, 해는 $4<x<a$이고 정수 $x$가 $5, 6, 7$의 $3$개이려면 $7<a \leq 8 \therefore a=8$

( ii ) $a<4$일 때, 해는 $a<x<4$이고 정수 $x$가 $1, 2, 3$의 $3$개이려면 $0 \leq a<1 \therefore a=0$

( iii ) $a=4$일 때, $(x-4)^2<0$의 해는 없다.

따라서 모든 정수 $a$의 값의 합은 $8+0=8$

6

[정답] $7$

$f(x)<0$의 해는 $y=f(x)$의 그래프가 $x$축보다 아래쪽에 있는 $x$의 값의 범위이므로 $-3<x<5$

정수 $x$는 $-2, -1, \cdots, 4$이므로 그 합은 $7$

7

[정답] $4$

그래프에서 $x \leq -2$ 또는 $x \geq 5$일 때 $f(x) \geq 0$, $-2 \leq x \leq 5$일 때 $f(x) \leq 0$이고, $x \leq 2$일 때 $g(x) \leq 0$, $x \geq 2$일 때 $g(x) \geq 0$

$f(x)g(x) \leq 0$이려면 $f(x)$와 $g(x)$의 부호가 다르거나 둘 중 하나가 $0$이어야 하므로 $x \leq -2$ 또는 $2 \leq x \leq 5$

따라서 자연수 $x$는 $2, 3, 4, 5$의 $4$개

8

[정답] $8$

$f(x)=(x+2)(x-4)$이므로 $x \leq -2$ 또는 $x \geq 4$일 때 $g(x)=f(x)$, $-2<x<4$일 때 $g(x)=0$

( i ) $-2<x<4$일 때, $0 \leq x+2$는 항상 성립한다.

( ii ) $x \leq -2$ 또는 $x \geq 4$일 때, $(x+2)(x-4) \leq x+2$에서 $(x+2)(x-5) \leq 0$, $-2 \leq x \leq 5$

$\therefore x=-2$ 또는 $4 \leq x \leq 5$

( i ), ( ii )에서 해는 $-2 \leq x \leq 5$이므로 정수 $x$는 $8$개

9

[정답] $9$

$x^2-2x-4>2x+1$에서 $x^2-4x-5>0$, $(x+1)(x-5)>0 \therefore x<-1$ 또는 $x>5$

$a=-1, b=5$이므로 $a+2b=9$

10

[정답] 5

$f(x) \le g(x)$의 해는 $y=f(x)$의 그래프가 $y=g(x)$의 그래프보다 아래쪽에 있거나 만나는 $x$의 값의 범위이므로 $-1 \le x \le 3$

정수 $x$는 $-1$, 0, 1, 2, 3의 5개

11

[정답] 18

직선 $y=x+1$ 위에서 $y$좌표가 3, 8인 점은 $(2,\ 3)$, $(7,\ 8)$이므로 두 교점의 $x$좌표는 2, 7

$f(x)-x-1>0$, 즉 $f(x)>x+1$의 해는 위로 볼록한 $y=f(x)$의 그래프가 직선 $y=x+1$보다 위쪽에 있는 $x$의 값의 범위이므로 $2<x<7$

따라서 정수 $x$는 3, 4, 5, 6이고 그 합은 18

12

[정답] 2

$-x^2+ax+7<b$, 즉 $x^2-ax+b-7>0$의 해가 $x<-1$ 또는 $x>5$이므로

$x^2-ax+b-7=(x+1)(x-5)=x^2-4x-5$

$a=4$, $b-7=-5$에서 $b=2$ $\therefore a-b=2$

13

[정답] 13

$2x^2-x-9<4x+a$, 즉 $2x^2-5x-9-a<0$의 해가 $b<x<\frac{3}{2}$이므로 $b$, $\frac{3}{2}$는 이차방정식 $2x^2-5x-9-a=0$의 두 근이다.

근과 계수의 관계에 의하여 $b+\frac{3}{2}=\frac{5}{2}$, $b\times\frac{3}{2}=\frac{-9-a}{2}$

$b=1$이고 $3=-9-a$에서 $a=-12$

$\therefore b-a=1-(-12)=13$

14

[정답] 20

$-2x^2+3x+2>-x^2+ax+b$, 즉 $x^2-(3-a)x-2+b<0$의 해가 $-2<x<3$이므로

$x^2-(3-a)x-2+b=(x+2)(x-3)=x^2-x-6$

$3-a=1$에서 $a=2$, $-2+b=-6$에서 $b=-4$

$\therefore a^2+b^2=4+16=20$

15

[정답] 38

$f(x)=\left(x+\frac{p}{2}\right)^2-\frac{p^2}{4}+p$이므로

$\mathrm{A}\left(-\frac{p}{2},\ -\frac{p^2}{4}+p\right)$, $\mathrm{B}(0,\ p)$

직선 $l$의 기울기는 $\frac{-\frac{p^2}{4}}{-\frac{p}{2}}=\frac{p}{2}$이므로 $g(x)=\frac{p}{2}x+p$

$f(x)-g(x)=x^2+\frac{p}{2}x=x\left(x+\frac{p}{2}\right)\le 0$

( i ) $p>0$일 때, 해는 $-\frac{p}{2}\le x\le 0$이고 정수 $x$가 10개이려면 $-10<-\frac{p}{2}\le -9$ $\therefore 18\le p<20$

( ii ) $p<0$일 때, 해는 $0\le x\le -\frac{p}{2}$이고 정수 $x$가 10개이려면 $9\le -\frac{p}{2}<10$ $\therefore -20<p\le -18$

정수 $p$의 최댓값은 $M=19$, 최솟값은 $m=-19$

$\therefore M-m=38$

16

[정답] $-3$

해가 $-1<x<2$이므로 $a<0$이고 $ax^2+bx+c=a(x+1)(x-2)=ax^2-ax-2a$

$\therefore b=-a$, $c=-2a$

$ax^2+cx+3b<0$에 대입하면 $ax^2-2ax-3a<0$이고, 양변을 $a(a<0)$로 나누면 $x^2-2x-3>0$

$(x+1)(x-3)>0$ $\therefore x<-1$ 또는 $x>3$

$\alpha=-1$, $\beta=3$이므로 $\alpha\beta=-3$

17

[정답] 4

해가 $x\le -2$ 또는 $x\ge\frac{3}{2}$이므로 $a<0$이고

$ax^2-x+b=a(x+2)\left(x-\frac{3}{2}\right)=ax^2+\frac{1}{2}ax-3a$

계수를 비교하면 $\frac{1}{2}a=-1$, $b=-3a$ $\therefore a=-2$, $b=6$

$\therefore a+b=4$

18

[정답] 3

$x^2-(a+9)x+b+3=(x-2)(x-4)=x^2-6x+8$이므로 $a+9=6$, $b+3=8$

$\therefore a=-3$, $b=5$

$-3x^2+5x+2\ge 0$에서 $3x^2-5x-2\le 0$, $(3x+1)(x-2)\le 0$ $\therefore -\frac{1}{3}\le x\le 2$

따라서 정수 $x$는 0, 1, 2의 3개

19

[정답] 3

해가 $x=b$뿐이므로 $x^2-ax-a+3=(x-b)^2=x^2-2bx+b^2$

계수를 비교하면 $a=2b$, $-a+3=b^2$이므로 $b^2+2b-3=0$, $(b+3)(b-1)=0$

$b=1$이면 $a=2$, $b=-3$이면 $a=-6$이고 $a>0$이므로 $a=2$, $b=1$

$\therefore a+b=3$

20

[정답] 15

$f(x)=a(x+5)(x-3)$이라 하면 $f(0)=-15a=15 \therefore a=-1$

$f(x)=-(x+5)(x-3)>0$의 해는 $-5<x<3$이므로 $f\left(\frac{x}{2}\right)>0$에서 $-5<\frac{x}{2}<3$

$\therefore -10<x<6$

따라서 정수 $x$는 $-9, -8, \cdots, 5$의 15개

21

[정답] ②

해가 $x \neq -1$인 모든 실수이므로 $a<0$이고 $ax^2+bx+c=a(x+1)^2=ax^2+2ax+a$

$\therefore b=2a, c=a$

ㄱ. $a<0$ (참)

ㄴ. $b^2-4ac=4a^2-4a^2=0$이므로 $b^2-4ac \leq 0$ (참)

ㄷ. $bx^2+cx+a<0$에 대입하면 $2ax^2+ax+a<0$이고, 양변을 $a(a<0)$로 나누면 $2x^2+x+1>0$

$2x^2+x+1=0$의 판별식은 $1-8<0$이므로 해는 모든 실수이다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

22

[정답] $\frac{4}{3}$

$y=x^2+(k-1)x+k^2$의 그래프는 아래로 볼록하므로 해가 존재하려면 $x$축과 서로 다른 두 점에서 만나야 한다.

판별식을 $D$라 하면 $D=(k-1)^2-4k^2=-3k^2-2k+1>0$

$3k^2+2k-1<0$, $(3k-1)(k+1)<0 \therefore -1<k<\frac{1}{3}$

$\therefore \beta-\alpha=\frac{1}{3}-(-1)=\frac{4}{3}$

23

[정답] $\frac{3}{4}$

주어진 부등식을 정리하면 $3x^2-8kx+8k-3 \leq 0$

이차항의 계수가 양수이므로 해가 한 개이려면 $3x^2-8kx+8k-3=0$이 중근을 가져야 한다.

$\frac{D}{4}=16k^2-3(8k-3)=16k^2-24k+9=(4k-3)^2=0 \therefore k=\frac{3}{4}$

24

[정답] 0

이차항의 계수가 양수이므로 해가 한 개이려면 $x^2-2(k-1)x+k^2-ak+b-1=0$이 중근을 가져야 한다.

$\frac{D}{4}=(k-1)^2-(k^2-ak+b-1)=(a-2)k+2-b=0$

이 식이 $k$의 값에 관계없이 성립하므로 $a-2=0$, $2-b=0$

$a=2, b=2 \therefore a-b=0$

25

[정답] 7

해를 갖지 않으려면 모든 실수 $x$에 대하여 $2x^2-2ax+3a+8>0$이어야 하므로 판별식을 $D$라 하면

$\frac{D}{4}=a^2-2(3a+8)<0$, $a^2-6a-16<0$, $(a+2)(a-8)<0 \therefore -2<a<8$

따라서 정수 $a$의 최댓값은 7

26

[정답] $\frac{1}{2}$

해가 존재하지 않으려면 모든 실수 $x$에 대하여 $x^2+2(k-1)x-k^2-k+4 \geq 0$이어야 하므로 판별식을 $D$라 하면

$\frac{D}{4}=(k-1)^2-(-k^2-k+4) \leq 0$, $2k^2-k-3 \leq 0$, $(2k-3)(k+1) \leq 0$

$\therefore -1 \leq k \leq \frac{3}{2}$

따라서 최댓값과 최솟값의 합은 $\frac{3}{2}+(-1)=\frac{1}{2}$

27

[정답] $-2$

(ⅰ) $a=2$일 때, $4x+7>0$의 해는 $x>-\frac{7}{4}$이므로 해가 존재한다.

(ⅱ) $a>2$일 때, 그래프가 아래로 볼록하므로 해가 항상 존재한다.

(ⅲ) $a<2$일 때, 해가 존재하지 않으려면 모든 실수 $x$에 대하여 $(a-2)x^2+2ax+2a+3 \leq 0$이어야 하므로 판별식을 $D$라 하면

$\frac{D}{4}=a^2-(a-2)(2a+3)=-a^2+a+6 \leq 0$, $(a+2)(a-3) \geq 0 \therefore a \leq -2$ 또는 $a \geq 3$

$a<2$이므로 $a \leq -2$

(ⅰ)~(ⅲ)에서 $a \leq -2$이므로 $a$의 최댓값은 $-2$

28

[정답] 2

해를 갖지 않으려면 모든 실수 $x$에 대하여 $(a-2)x^2-4(a-2)x+7 \geq 0$이어야 한다.

(ⅰ) $a=2$일 때, $7 \geq 0$이므로 성립한다.

(ⅱ) $a \neq 2$일 때, $a-2>0$이고 $\frac{D}{4}=4(a-2)^2-7(a-2)=(a-2)(4a-15) \leq 0 \therefore 2<a \leq \frac{15}{4}$

(ⅰ), (ⅱ)에서 $2 \leq a \leq \frac{15}{4}$이므로 정수 $a$는 2, 3의 2개

29

[정답] ④

주어진 부등식은 $(x+3)(x-3) \le 2k(x-a)$

ㄱ. $a=3$이면 $(x-3)(x+3-2k) \le 0$이므로 해는 $3$과 $2k-3$ 사이의 값이다. 예를 들어 $k=0$이면 해는 $-3 \le x \le 3$이므로 $x \le -3$이 아니다. (거짓)

ㄴ. $a=5$이면 $x^2-2kx+10k-9 \le 0$이고, 해가 존재하지 않으려면 $\frac{D}{4}=k^2-10k+9<0$

$(k-1)(k-9)<0$에서 $1<k<9$이므로 정수 $k$는 $7$개 (참)

ㄷ. 부등식의 해는 $y=(x+3)(x-3)$의 그래프가 점 $(a,\ 0)$을 지나고 기울기가 $2k$인 직선보다 아래쪽에 있거나 만나는 $x$의 값의 범위이다.

$-3 \le a \le 3$일 때, $k \ge 0$이면 $x=3$에서 좌변은 $0$, 우변은 $2k(3-a) \ge 0$이고, $k<0$이면 $x=-3$에서 좌변은 $0$, 우변은 $2k(-3-a) \ge 0$이므로 정수 $x$가 항상 존재한다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

30

[정답] $6$

판별식을 $D$라 하면 $\frac{D}{4}=a^2-(-a+6) \le 0$, $a^2+a-6 \le 0$, $(a+3)(a-2) \le 0$

$\therefore -3 \le a \le 2$

따라서 정수 $a$는 $-3$, $-2$, $-1$, $0$, $1$, $2$의 $6$개

31

[정답] $5$

이차부등식이므로 $k-1 \ne 0$

모든 실수 $x$에 대하여 성립하려면 $k-1>0$이고 판별식을 $D$라 할 때 $D \le 0$이어야 한다.

$\frac{D}{4}=(k-1)^2-2(k-1)=(k-1)(k-3) \le 0 \therefore 1 \le k \le 3$

$k>1$이므로 $1<k \le 3$이고 정수 $k$는 $2$, $3$

따라서 그 합은 $5$

32

[정답] $5$

모든 실수 $x$에 대하여 $(m+2)x^2-2(m+2)x+4 \ge 0$이어야 한다.

( i ) $m=-2$일 때, $4 \ge 0$이므로 성립한다.

( ii ) $m \ne -2$일 때, $m+2>0$이고 $\frac{D}{4}=(m+2)^2-4(m+2)=(m+2)(m-2) \le 0 \therefore -2<m \le 2$

( i ), ( ii )에서 $-2 \le m \le 2$이므로 정수 $m$은 $5$개

33

[정답] $5$

판별식을 $D_1$이라 하면 모든 실수 $k$에 대하여 $D_1=(a-k)^2-4(k^2+2a)<0$

즉 $3k^2+2ak-a^2+8a>0$이 모든 실수 $k$에 대하여 성립해야 한다.

$k$에 대한 이차방정식 $3k^2+2ak-a^2+8a=0$의 판별식을 $D_2$라 하면 $\frac{D_2}{4}=a^2-3(-a^2+8a)<0$

$4a^2-24a<0$, $a(a-6)<0 \therefore 0<a<6$

따라서 정수 $a$는 $1$, $2$, $3$, $4$, $5$의 $5$개

34

[정답] $51$

(가)에서 $f(x)=a(x+2)(x-2)=a(x^2-4)$ $(a>0)$

(나)에서 $ax^2-4x-4a+17 \ge 0$이 모든 실수 $x$에 대하여 성립하므로

$\frac{D}{4}=4-a(17-4a)=4a^2-17a+4 \le 0$, $(4a-1)(a-4) \le 0 \therefore \frac{1}{4} \le a \le 4$

$f(4)=12a$이므로 $3 \le f(4) \le 48$

$\therefore M+m=48+3=51$

35

[정답] $0$

모든 실수 $x$에 대하여 $x^2-2(k-1)x+3>2x-1$, 즉 $x^2-2kx+4>0$이어야 한다.

판별식을 $D$라 하면 $\frac{D}{4}=k^2-4<0 \therefore -2<k<2$

$a=-2$, $b=2$이므로 $a+b=0$

36

[정답] $-\frac{5}{4}$

모든 실수 $x$에 대하여 $kx^2-4kx-1<2x$, 즉 $kx^2-(4k+2)x-1<0$이어야 한다.

이차함수이므로 $k \ne 0$이고, 위로 볼록해야 하므로 $k<0$

판별식을 $D$라 하면 $\frac{D}{4}=(2k+1)^2+k<0$, $4k^2+5k+1<0$, $(4k+1)(k+1)<0 \therefore -1<k<-\frac{1}{4}$

$k<0$이므로 $-1<k<-\frac{1}{4}$이고 $\alpha+\beta=-1+\left(-\frac{1}{4}\right)=-\frac{5}{4}$

37

[정답] $3$

모든 실수 $x$에 대하여 $(m+2)x^2-(2m+4)x+3>0$이어야 한다.

( i ) $m=-2$일 때, $3>0$이므로 성립한다.

( ii ) $m \ne -2$일 때, $m+2>0$이고 $\frac{D}{4}=(m+2)^2-3(m+2)=(m+2)(m-1)<0 \therefore -2<m<1$

( i ), ( ii )에서 $-2 \le m<1$이므로 정수 $m$은 $-2$, $-1$, $0$의 $3$개

38

[정답] ⑤

ㄱ. $f(x) > g(x)$에서 $x^2 - ax + b > ax + 2b$, 즉 $x^2 - 2ax - b > 0$이 모든 실수 $x$에 대하여 성립한다. (참)

ㄴ. $\frac{D}{4} = a^2 + b < 0$이므로 $b < -a^2 \leq 0$ (참)

ㄷ. 꼭짓점의 $y$좌표는 $-\frac{a^2}{4} + b$, 직선의 $y$절편은 $2b$이고

$\left(-\frac{a^2}{4} + b\right) - 2b = -\frac{a^2}{4} - b > -\frac{a^2}{4} + a^2 = \frac{3}{4}a^2 \geq 0$ $(because\ b < -a^2)$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

39

[정답] 2

$f(x) = x^2 - 4x - 4k + 3 = (x-2)^2 - 4k - 1$이라 하면 $3 \leq x < 5$에서 $f(x)$는 $x$의 값이 커질수록 커진다.

$3 \leq x < 5$에서 $f(x) < 0$이 항상 성립하려면 $f(5) \leq 0$이어야 한다.

$f(5) = 8 - 4k \leq 0 \therefore k \geq 2$

따라서 $k$의 최솟값은 2

40

[정답] 3

$f(x) = -x^2 + 4x + 3k - 4 = -(x-2)^2 + 3k$라 하면 $1 \leq x \leq 5$에서 최솟값은 축에서 더 먼 $x = 5$에서의 값 $f(5) = 3k - 9$

$f(5) = 3k - 9 \geq 0 \therefore k \geq 3$

따라서 $k$의 최솟값은 3

41

[정답] 3

$f(x) = x^2 - ax + a + 3 = \left(x - \frac{a}{2}\right)^2 - \frac{a^2}{4} + a + 3$

( i ) $\frac{a}{2} < 0$일 때, 최솟값 $f(0) = a + 3 \geq 0$에서 $a \geq -3 \therefore -3 \leq a < 0$

( ii ) $0 \leq \frac{a}{2} \leq 3$일 때, 최솟값 $f\left(\frac{a}{2}\right) = -\frac{a^2}{4} + a + 3 \geq 0$에서 $a^2 - 4a - 12 \leq 0$, $-2 \leq a \leq 6 \therefore 0 \leq a \leq 6$

( iii ) $\frac{a}{2} > 3$일 때, 최솟값 $f(3) = 12 - 2a \geq 0$에서 $a \leq 6$이므로 만족시키는 $a$는 없다.

( i )~( iii )에서 $-3 \leq a \leq 6$이므로 $M = 6$, $m = -3 \therefore M + m = 3$

42

[정답] 4

판별식을 $D$라 하면 $\frac{D}{4} = a^2 - (a+6) < 0$, $(a+2)(a-3) < 0 \therefore -2 < a < 3$

따라서 정수 $a$는 $-1$, 0, 1, 2의 4개

43

[정답] 10

(가)에서 $f(x) = (x+1)(x-2k) = x^2 + (1-2k)x - 2k$

(나)에서 이차방정식 $x^2 + (1-2k)x - 2k = x - 7k$, 즉 $x^2 - 2kx + 5k = 0$이 실근을 갖지 않으므로

$\frac{D}{4} = k^2 - 5k < 0 \therefore 0 < k < 5$

따라서 자연수 $k$는 1, 2, 3, 4이고 그 합은 10

44

[정답] 10

$f(x) = (x+2)(x-1)$, $g(x) = -(x-2)^2$

$f(2x) + 3g(x) = (2x+2)(2x-1) - 3(x-2)^2 = x^2 + 14x - 14$

$x^2 + 14x - 14 \leq 9x$에서 $x^2 + 5x - 14 \leq 0$, $(x+7)(x-2) \leq 0 \therefore -7 \leq x \leq 2$

따라서 정수 $x$는 10개

45

[정답] 5

(가)에서 $f(x) = ax^2$ $(a \neq 0)$

(나)에서 $f(x) + g(x) = -b(x-2)$ $(b > 0)$이므로 $g(x) = -ax^2 - bx + 2b$

(다)에서 $f(x) - g(x) = 2ax^2 + bx - 2b$는 $x = -1$일 때 최소이므로 $a > 0$이고 $-\frac{b}{4a} = -1$, $b = 4a$

$f(x) - g(x) = 2ax^2 + 4ax - 8a \leq 0$에서 $x^2 + 2x - 4 \leq 0 \therefore -1 - \sqrt{5} \leq x \leq -1 + \sqrt{5}$

$2 < \sqrt{5} < 3$이므로 정수 $x$는 $-3$, $-2$, $-1$, 0, 1의 5개

46

[정답] 35

(가)에서 $g(x) - 3 = -(x-2)^2$이므로 $g(x) = -(x-2)^2 + 3$

(나)에서 $f(x) - g(x) = 2(x+3)(x-1)$이므로 $f(x) = g(x) + 2x^2 + 4x - 6 = x^2 + 8x - 7 = (x+4)^2 - 23$

$f(x) = k - n$이 실근을 갖지 않으려면 $k - n < -23$, 즉 $k < n - 23$

$g(x) = k$가 실근을 갖지 않으려면 $k > 3$

$3 < k < n - 23$을 만족시키는 정수 $k$가 8개이므로 정수 $k$는 4, 5, $\cdots$, 11이고 $n - 23 = 12$

$\therefore n = 35$

47

[정답] $2+\sqrt{3}$

세 점 O, P, Q는 직선 $y=x$ 위에 있고 $\overline{\mathrm{OP}}=\overline{\mathrm{PQ}}$이므로 점 P의 $x$좌표를 $k$라 하면 점 Q의 $x$좌표는 $2k$이고, (다)에서 $k<2k$이므로 $k>0$

(가)에서 $f(x)-x=2(x-k)(x-2k)$, (나)에서 $g(x)-x=-(x-k)^2$

$f(x)+g(x)=2(x-k)(x-2k)-(x-k)^2+2x$

$=x^2+2(1-2k)x+3k^2$

이 식이 모든 실수 $x$에 대하여 0 이상이므로 $\frac{D}{4}=(1-2k)^2-3k^2=k^2-4k+1\le 0$

$\therefore 2-\sqrt{3}\le k\le 2+\sqrt{3}$

따라서 점 P의 $x$좌표의 최댓값은 $2+\sqrt{3}$

48

[정답] 22

가로의 길이를 $x$m라 하면 세로의 길이는 $(20-x)$m이고 $x\ge 20-x$에서 $10\le x<20$

넓이가 $96\mathrm{m}^2$ 이상이므로 $x(20-x)\ge 96$, $x^2-20x+96\le 0$, $(x-8)(x-12)\le 0\therefore 8\le x\le 12$

두 범위의 공통부분은 $10\le x\le 12$

따라서 가로의 길이의 최댓값과 최솟값의 합은 $12+10=22$

49

[정답] 1600

빵 한 개의 가격은 $(1000+10x)$원, 하루 판매량은 $(400-2x)$개이므로

$(1000+10x)(400-2x)\ge 448000$에서 $20(100+x)(200-x)\ge 448000$

$(100+x)(200-x)\ge 22400$, $x^2-100x+2400\le 0$, $(x-40)(x-60)\le 0\therefore 40\le x\le 60$

따라서 빵 한 개의 가격은 1400원 이상 1600원 이하이고 최댓값은 1600원

50

[정답] 4

$40t-5t^2\ge 60$에서 $5t^2-40t+60\le 0$, $t^2-8t+12\le 0$

$(t-2)(t-6)\le 0\therefore 2\le t\le 6$

따라서 높이가 60m 이상인 시간은 $6-2=4$(초) 동안

51

[정답] 9

$y^2=6x-2x^2$이고 $y$는 실수이므로 $6x-2x^2\ge 0$, $x(x-3)\le 0\therefore 0\le x\le 3$

$x^2+y^2=x^2+6x-2x^2=-x^2+6x=-(x-3)^2+9$

$0\le x\le 3$에서 $x=3$일 때 최댓값 9, $x=0$일 때 최솟값 0

따라서 최댓값과 최솟값의 합은 9

52

[정답] $2\sqrt{5}$

$\frac{8x+8}{x^2+4}=k$로 놓으면 $k(x^2+4)=8x+8$, 즉 $kx^2-8x+4k-8=0$

( i ) $k=0$일 때, $x=-1$이므로 $k=0$이 될 수 있다.

( ii ) $k\ne 0$일 때, 실수 $x$가 존재해야 하므로 $\frac{D}{4}=16-k(4k-8)\ge 0$, $k^2-2k-4\le 0\therefore 1-\sqrt{5}\le k\le 1+\sqrt{5}$ ( $k\ne 0$)

( i ), ( ii )에서 $1-\sqrt{5}\le k\le 1+\sqrt{5}$이므로 $M=1+\sqrt{5}$, $m=1-\sqrt{5}$

$\therefore M-m=2\sqrt{5}$

53

[정답] 23

$y=0$이면 $2x^2\ge 0$이므로 성립한다.

$x$에 대한 이차부등식 $2x^2+4ayx+3by^2\ge 0$이 모든 실수 $x$에 대하여 성립하려면 판별식을 $D$라 할 때

$\frac{D}{4}=(2ay)^2-2\times 3by^2=(4a^2-6b)y^2\le 0$이 모든 실수 $y$에 대하여 성립해야 하므로 $4a^2-6b\le 0$, 즉 $2a^2\le 3b$

$a=1$일 때 $b\ge\frac{2}{3}$이므로 $b$는 10개, $a=2$일 때 $b\ge\frac{8}{3}$이므로 $b$는 8개

$a=3$일 때 $b\ge 6$이므로 $b$는 5개, $a\ge 4$일 때 $b\ge\frac{32}{3}$이므로 없다.

따라서 순서쌍의 개수는 $10+8+5=23$

54

[정답] 16

실근을 가지므로 $\frac{D}{4}=(k-1)^2-(2k^2-4k-2)=-k^2+2k+3\ge 0$

$(k+1)(k-3)\le 0\therefore -1\le k\le 3$

근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha+\beta=2(k-1)$, $\alpha\beta=2k^2-4k-2$

$(\alpha-\beta)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=4(k-1)^2-4(2k^2-4k-2)$

$=-4k^2+8k+12=-4(k-1)^2+16$

$-1\le k\le 3$에서 $k=1$일 때 최댓값 16, $k=-1$ 또는 $k=3$일 때 최솟값 0

따라서 최댓값과 최솟값의 합은 16

55

[정답] 7

$x^2+2ax-4a\le 0$의 해가 한 개이므로 $\frac{D_1}{4}=a^2+4a=0$이고 $a\ne 0$이므로 $a=-4$

$-4x^2+4x+b-12>0$이 해를 갖지 않으므로 모든 실수 $x$에 대하여 $-4x^2+4x+b-12\le 0$

$\frac{D_2}{4}=4+4(b-12)\le 0\therefore b\le 11$

$a+b=-4+b\le 7$이므로 최댓값은 7

56

[정답] 28

(가)에서 $f(x)-4=a(x+1)(x-3)$ $(a>0)$이므로 $f(x)=a(x-1)^2-4a+4$

(나)에서 $f(x)\le -4$의 해가 한 개이므로 $f(x)$의 최솟값이 $-4$이다.

$-4a+4=-4 \therefore a=2$

$f(x)=2(x-1)^2-4$

이므로 $f(5)=32-4=28$

57

[정답] 6

이차방정식 $x^2-3x-a=0$의 두 실근을 $\alpha$, $\beta$ $(\alpha<\beta)$라 하면 해는 $\alpha<x<\beta$이고 $\alpha+\beta=3$

해의 범위는 $x=\frac{3}{2}$에 대하여 대칭이므로 정수인 해는 합이 3인 두 수씩 짝을 이룬다.

정수인 해의 합이 9이려면 정수인 해가 $-1$, 0, 1, 2, 3, 4이어야 하므로 $-2\le\alpha<-1$

$-a=\alpha\beta=\alpha(3-\alpha)$

이므로 $a=\alpha^2-3\alpha=\left(\alpha-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{9}{4}$

$-2\le\alpha<-1$에서 $a$는 $\alpha$의 값이 커질수록 작아지므로 $4<a\le 10$

따라서 정수 $a$는 5, 6, $\cdots$, 10의 6개

58

[정답] ⑤

ㄱ. $f(x)>3x-a^2$에서 $(a-1)x^2+(a-k-3)x+a^2+2a-3>0$

해가 $1<x<2$이므로 $a-1<0$이고 $(a-1)x^2+(a-k-3)x+a^2+2a-3=(a-1)(x-1)(x-2)$

상수항을 비교하면 $a^2+2a-3=2(a-1)$, $a^2=1$이고 $a<1$이므로 $a=-1$

$x$의 계수를 비교하면 $a-k-3=-3(a-1)$에서 $k=4a-6=-10 \therefore ak=10$ (참)

ㄴ. 이차방정식이므로 $a\ne 1$이고, 판별식 $D=(a-k)^2-4(a-1)(2a-3)\ge 0$이 모든 실수 $k$에 대하여 성립하려면 $k=a$일 때도 성립해야 하므로 $(a-1)(2a-3)\le 0$

$1\le a\le\frac{3}{2}$에서 $a\ne 1$인 정수 $a$는 없다. (참)

ㄷ. $k=a$이면 $f(x)=(a-1)x^2+2a-3$이고, $f(x)\le 0$의 해가 한 개이려면 $a-1>0$이고 $f(x)=0$이 중근을 가져야 하므로 $2a-3=0$

$a=\frac{3}{2}$일 때 $a-1=\frac{1}{2}>0$이므로 조건을 만족시키는 $a$는 1개이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

59

[정답] 45

$\alpha$, $\beta$는 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=k-x$의 교점의 $x$좌표이다.

(가)에서 $f(\beta)+\beta=k$이므로 $\beta=\frac{k}{2}$이고, $\beta$가 자연수이므로 $k$는 짝수이다.

(가), (나)에서 $f(x)$는 $x=\frac{k}{2}$일 때 최솟값 $\frac{k}{2}$를 가지므로 $f(x)=\frac{1}{2}\left(x-\frac{k}{2}\right)^2+\frac{k}{2}$

$\alpha=\frac{k}{2}-p$ ($p$는 자연수)라 하면 $f(\alpha)=k-\alpha=\frac{k}{2}+p$이므로 $\frac{1}{2}p^2+\frac{k}{2}=\frac{k}{2}+p \therefore p=2$, $\alpha=\frac{k}{2}-2$

$f(0)\le\alpha+\beta+f(\alpha)$에서 $\frac{k^2}{8}+\frac{k}{2}\le\frac{3k}{2}$, $k(k-8)\le 0 \therefore 0\le k\le 8$

$k$는 짝수이고 $\alpha=\frac{k}{2}-2$가 자연수이므로 $k=6$ 또는 $k=8$

$k=6$이면 $f(x)=\frac{1}{2}(x-3)^2+3$이므로 $f(6)=\frac{15}{2}$, $k=8$이면 $f(x)=\frac{1}{2}(x-4)^2+4$이므로 $f(6)=6$

따라서 모든 $f(6)$의 값의 곱은 $\frac{15}{2}\times 6=45$

60

[정답] 132

$g(x)=2f(x)-|f(x)|$라 하면 $f(x)=(x+6)(x-2)$이므로

$x\le -6$ 또는 $x\ge 2$일 때 $g(x)=f(x)=x^2+4x-12$, $-6<x<2$일 때 $g(x)=3f(x)=3x^2+12x-36$

$a$의 최솟값이 84 이하이려면 $a=84$일 때 부등식이 성립해야 하므로 모든 실수 $x$에 대하여 $g(x)\ge mx-84$

( i ) $-6<x<2$에서 $3x^2+(12-m)x+48\ge 0$이어야 한다. 축 $x=\frac{m-12}{6}$이 이 범위에 있으면$(-24<m<24)$ $(m-12)^2-576\le 0$에서 $-12\le m<24$이고, 범위 밖이면 양 끝에서의 값 $84+6m\ge 0$, $84-2m\ge 0$에서 $24\le m\le 42$이므로 $-12\le m\le 42$

( ii ) $x\le -6$ 또는 $x\ge 2$에서 $x^2+(4-m)x+72\ge 0$이어야 한다. 축 $x=\frac{m-4}{2}$가 $-6$과 2 사이에 있으면$(-8<m<8)$ 양 끝에서의 값 $84+6m$, $84-2m$이 양수이므로 성립하고, 그렇지 않으면 $(m-4)^2-288\le 0$에서 $4-12\sqrt{2}\le m\le 4+12\sqrt{2}$

$16<12\sqrt{2}<17$이므로 ( i ), ( ii )를 모두 만족시키는 정수 $m$은 $-12\le m\le 20$

따라서 정수 $m$은 $-12$, $-11$, $\cdots$, 20이고 그 합은 $13+14+\cdots+20=132$