집합과 원소

1

집합인 것만을

보 기

에서 있는 대로 고른 것은?

집합의 뜻과 표현
고1 05

ㄱ. 5보다 작은 자연수의 모임
ㄴ. 100에 가까운 홀수의 모임
ㄷ. 축구를 잘하는 나라의 모임
ㄹ. 5의 양의 배수 중 두 자리 수의 모임

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

2

집합의 원소의 개수에 대하여

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $n(\{\varnothing\})=0$
ㄴ. $n(\{0\})=1$
ㄷ. $n(\{1\})<n(\{2\})$
ㄹ. $n(\{\varnothing,\ 1\})-n(\varnothing)=2$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

3

집합 $A=\{1,\ 2,\ 3\}$에 대하여

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\{1,\ 3\}\in A$
ㄴ. $2\in A$
ㄷ. $\varnothing\in A$
ㄹ. $\{3\}\subset A$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

4

집합 $A=\{2,\ 3,\ 4\}$에 대하여 집합 $P=\{X\,|\,X\subset A\}$라 할 때,

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\varnothing\subset P$
ㄴ. $\{\varnothing,\ \{2,\ 3,\ 4\}\}\subset P$
ㄷ. $X\in P$이고 $n(X)\geq 2$이면 집합 X의 모든 원소의 곱은 짝수이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

집합의 표현과 새로운 집합

5

집합 $A=\{2^k \,|k=1,\ 2,\ 3\}$에 대하여
집합 $B=\{x-y\,|x\in A,\ y\in A\}$의 원소의 개수 $n(B)$를 구하시오.

6

세 집합 $A=\{a \mid -1\le a\le 2$인 정수$\}$, $B=\{b \mid -3\le b\le 5$인 정수$\}$, $C=\{ab\,|a\in A,\ b\in B\}$에 대하여 $n(C)$의 값을 구하시오.

집합의 원소의 개수

7

세 집합 $A=\{0,\ 1\}$, $B=\{x \mid |x|\le 5,\ x$는 정수$\}$, $C=\{x \mid x$는 12의 양의 약수$\}$에 대하여 $n(A)+n(B)+n(C)$의 값을 구하시오.

8

두 집합 $A=\{a \mid a=2n^2+1,\ n$은 3 이하의 자연수$\}$, $B=\{b \mid b$는 a를 5로 나누었을 때의 나머지, $a\in A\}$에 대하여 집합 B의 모든 원소의 합을 구하시오.

9

자연수 n에 대하여 자연수 전체의 집합의 부분집합
$A_n=\{x \mid x$는 $rootn$ 이하의 짝수$\}$
라 할 때, $A_n\subset A_{36}$을 만족시키는 자연수 n의 최댓값을 구하시오.

원소에 대한 조건이 주어진 집합

10

다음 조건을 만족시키는 공집합이 아닌 집합 A의 개수를 구하시오.

(가) 집합 A의 모든 원소는 자연수이다.
(나) $x\in A$이면 $\frac{18}{x}\in A$이다.

11

다음 조건을 만족시키는 집합 A가 오직 하나 존재하도록 하는 상수 k의 값을 구하시오.

(가) 실수 x에 대하여 $x \in A$이면 $\frac{x^2+k}{4} \in A$이다.
(나) $n(A) = 1$

집합 사이의 포함 관계

12

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $0 \in \varnothing$
ㄴ. $\varnothing \subset \{0\}$
ㄷ. $1 \subset \{1,\ 2,\ 3\}$
ㄹ. $\{1\} \subset \{1\}$

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

13

두 집합 $A = \{-1,\ 3\}$, $B = \{x \,|\, x^2 + ax + b = 0\}$에 대하여
$A \subset B$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

14

두 집합 $A=\{3,\ a\}$, $B=\{-a,\ 2a-1,\ a^2+3\}$에 대하여
$A \subset B$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

15

두 집합
$A=\{x\,|-x^2-x+6 \geq 0\}$, $B=$
$\{x\,|x^2-kx+k^2-19<0\}$
에 대하여 $A \subset B$가 성립하도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오.

서로 같은 집합

16

두 집합 $A=\{1,\ a^2-a\}$, $B=\{2,\ a^2-3\}$에 대하여 $A \subset B$이고 $B \subset A$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

17

두 집합 $A=\{3,\ a+5,\ b-2\}$, $B=\{a^2-1,\ 7,\ 8\}$에 대하여 $A=B$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

18

두 집합 $A=\{1,\ 2,\ 3\}$, $B=\{a,\ a+1\}$에 대하여 두 집합 X, Y를 각각 $X=\{x+y\,|x \in A,\ y \in B\}$, $Y=\{x-y\,|x \in A,\ y \in B\}$라 하자. $X=Y$일 때, 실수 a의 값을 구하시오.

19

두 집합 $A=\{x \mid x$는 a의 약수, a는 두 자리의 자연수 $itright.$, $B=\{b,\ c,\ d\}$에 대하여 $A=B$일 때, bcd의 최댓값을 구하시오.
(단, b, c, d는 서로 다른 실수이다.)

부분집합의 개수

20

집합 $A=\{1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9\}$의 부분집합 중에서 원소의 개수가 3 이상인 집합의 개수를 구하시오.

21

집합 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9\}$의 부분집합 A가 다음 조건을 만족시킬 때, 집합 A의 개수를 구하시오.

(가) $n(A)=3$
(나) $3\in A$

22

집합 $A=\{x\mid -2\le x<5,\ x\text{는 정수}\}$에 대하여 0과 4는 반드시 속하고, -1은 속하지 않는 집합 A의 부분집합의 개수를 구하시오.

23

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9\}$의 부분집합 중 홀수 3개와 적어도 2개의 짝수를 원소로 갖는 집합의 개수를 구하시오.

24

두 집합 $A=\{x\,|x^2-6x+8=0\}$, $B=\{x\mid x\text{는 }8\text{ 이하의 짝수인 자연수}\}$에 대하여 $A\subset X\subset B$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오.

25

집합 $X=\{x\mid x\text{는 소수}\}$의 원소 p에 대하여 공집합이 아닌 X의 부분집합 중에서 p보다 작은 원소들로만 이루어진 모든 집합의 개수를 $f(p)$라 하자. $f(17)$의 값을 구하시오.

26

집합 $A = \{x \mid x$는 10 이하의 자연수$itright$의 부분집합 중 다음 조건을 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오.

(가) $n(X) \geq 2$
(나) 집합 X의 모든 원소의 합과 곱은 모두 홀수이다.

27

전체집합 $U = \{x \mid 2 < x \leq 15$인 자연수$\}$의 공집합이 아닌 부분집합 A가 다음 조건을 만족시킬 때, 집합 A의 개수를 구하시오.

(가) 집합 A의 모든 원소의 곱은 홀수이고, 합은 짝수이다.
(나) $3 \notin A$, $15 \notin A$

부분집합의 원소의 합

28

집합 $\{1,\ 3,\ 5,\ 7\}$의 부분집합 중 원소의 개수가 2 이상인 모든 집합에 대하여 각 집합의 가장 큰 원소를 모두 더한 값을 구하시오.

29

집합 $U = \{1,\ 2,\ x,\ 4,\ 5\}$의 부분집합 중 원소의 개수가 2인 부분집합을 각각 A_1, A_2, A_3, $\cdots$, A_n이라 하고, 집합 A_k $(k = 1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ n)$의 모든 원소의 합을 s_k라 하자.

$s_1 + s_2 + s_3 + \cdots + s_n = 120$일 때, x의 값을 구하시오.

(단, $n(U) = 5$이다.)

30

집합 $A=\{a,\ a+2,\ a+4,\ a+6,\ a+8\}$의 모든 부분집합을 $\varnothing$, A_1, A_2, $\cdots$, A_n이라 하고, 집합 A_i의 모든 원소의 합을 S_i $(i=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$라 하자. $S_1+S_2+\cdots+S_n=400$일 때, $n-a$의 값을 구하시오. (단, a는 실수이다.)

단원종합문제

31

모든 원소가 자연수인 두 집합 $A=\{a,\ b,\ c,\ d\}$, $B=\left\{\sqrt{a},\ \sqrt{b},\ \sqrt{c},\ \sqrt{d}\right\}$에 대하여 두 집합 A, B에 모두 속하는 원소의 합이 13일 때, 집합 B의 모든 원소의 합을 구하시오.

(단, $a<b<c<d$)

32

두 집합 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ a\}$, $B=\{1,\ 3,\ 5\}$에 대하여 집합 $X=\{x-y\,|x\in A,\ y\in B\}$라 할 때, $n(X)=9$가 되도록 하는 모든 자연수 a의 값의 합을 구하시오.

33

자연수 전체의 집합의 두 부분집합 $A=\left\{a,\ b,\ b-a,\ \frac{a+b}{5}\right\}$, $B=\left\{\sqrt{a},\ \sqrt{b},\ \sqrt{a+b},\ \sqrt{4a+4b}\right\}$에 대하여 집합 B에서 가장 큰 원소는 10이다. 집합 $X=\{x\mid x\in A$이고 $x\notin B\}$의 모든 원소의 합을 구하시오.

34

다음 조건을 만족시키는 실수 전체의 집합의 부분집합 A의 개수를 구하시오.

(가) $2a^2-1 \notin A$이면 $a \notin A$이다.
(나) 집합 A의 원소의 개수는 3보다 작다.
(다) $A \neq \varnothing$

35

집합
$A=\{x \mid x=2^a \times 3^b \times 5^c, 1 \leq x \leq 20, a, b, c$는 음이 아닌 정수$\}$의 부분집합 중 4의 배수를 모두 원소로 갖고, 12가 아닌 3의 배수를 적어도 하나 원소로 갖는 집합의 개수를 구하시오.

36

2023년 3월 고2 19번 [4점]

다음 조건을 만족시키는 집합 A의 개수는?

(가) $\{0\} \subset A \subset \{x \mid x$는 실수$\}$
(나) $a^2-2 \notin A$이면 $a \notin A$이다.
(다) $n(A)=4$

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

37

좌표평면 위의 원 $x^2+y^2=25$에 대하여 집합
$S=\{(x,\ y)\mid x^2+y^2=25,\ x,\ y\text{는 정수}\}$
라 할 때, 집합 S의 서로 다른 세 원소를 꼭짓점으로 하는 직각삼각형의 개수를 구하시오.

38

원소가 6개인 집합 $A=\{a,\ b,\ 5,\ 8,\ 9,\ 10\}$의 원소 k에 대하여 A의 부분집합 중 k를 최솟값으로 갖는 모든 집합의 개수를 $f(k)$라 하자. $f(a)=2f(b)$를 만족시키는 10 이하의 자연수 $a,\ b$의 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수를 구하시오.

39

양의 실수 전체의 집합의 세 부분집합 A, B, C가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $n(A)=1$, $n(B)=2$, $n(C)=3$
(나) $A=\{3\}$이고, 집합 B의 모든 원소의 합은 7,
집합 C의 모든 원소의 합은 10이다.

집합 $D=\{a+b+c \,|\, a\in A,\ b\in B,\ c\in C\}$의 모든 원소의 합의 최댓값을 구하시오.

40

전체집합 $U=\{x \mid x$는 19 이하의 자연수$\}$의 부분집합 A가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a\in A$이면 $2a\notin A$이다.
(나) 집합 A의 모든 원소의 합은 짝수이다.

$n(A)$가 최대일 때, 집합 A의 모든 원소의 합의 최댓값을 구하시오.

정답 및 풀이

1

[정답] ②

ㄱ, ㄹ은 속하는 대상을 분명하게 정할 수 있으므로 집합이다.

ㄴ의 '가까운', ㄷ의 '잘하는'은 기준이 분명하지 않으므로 집합이 아니다.

따라서 집합인 것은 ㄱ, ㄹ

2

[정답] ③

ㄱ. 집합 $\{\varnothing\}$의 원소는 $\varnothing$ 하나이므로 $n(\{\varnothing\})=1$ (거짓)

ㄴ. 집합 $\{0\}$의 원소는 0 하나이므로 $n(\{0\})=1$ (참)

ㄷ. $n(\{1\})=n(\{2\})=1$ (거짓)

ㄹ. $n(\{\varnothing,\ 1\})=2$, $n(\varnothing)=0$이므로 $2-0=2$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄹ

3

[정답] ④

ㄱ. $\{1,\ 3\}$은 집합 A의 원소가 아니라 부분집합이다. (거짓)

ㄴ. 2는 집합 A의 원소이다. (참)

ㄷ. $\varnothing$은 집합 A의 원소가 아니다. ($\varnothing\subset A$는 옳다.) (거짓)

ㄹ. $3\in A$이므로 $\{3\}\subset A$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄹ

4

[정답] ⑤

집합 P는 집합 A의 부분집합을 모두 원소로 갖는 집합이다.

ㄱ. 공집합은 모든 집합의 부분집합이다. (참)

ㄴ. $\varnothing\in P$, $\{2,\ 3,\ 4\}\in P$이므로 $\{\varnothing,\ \{2,\ 3,\ 4\}\}\subset P$ (참)

ㄷ. 원소가 2개 이상인 A의 부분집합은 2 또는 4를 반드시 가지므로 원소의 곱은 짝수이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ

5

[정답] 7

$A=\{2,\ 4,\ 8\}$이므로 $x-y$의 값은 0, ±2, ±4, ±6

$B=\{-6,\ -4,\ -2,\ 0,\ 2,\ 4,\ 6\}$이므로 $n(B)=7$

6

[정답] 15

$A=\{-1,\ 0,\ 1,\ 2\}$, $B=\{-3,\ -2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$

$a=-1$일 때 ab는 -5 이상 3 이하의 정수, $a=1$일 때 -3 이상 5 이하의 정수, $a=0$일 때 0

$a=2$일 때 ab는 -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10

따라서 $C=\{-6,\ -5,\ -4,\ \cdots,\ 5,\ 6,\ 8,\ 10\}$이고, -6 이상 6 이하의 정수 13개와 8, 10이므로 $n(C)=15$

7

[정답] 19

$n(A)=2$

$|x|\le5$인 정수는 -5부터 5까지 11개이므로 $n(B)=11$

12의 양의 약수는 1, 2, 3, 4, 6, 12이므로 $n(C)=6$

$\therefore n(A)+n(B)+n(C)=19$

8

[정답] 7

$n=1$, 2, 3일 때 $a=3$, 9, 19이므로 $A=\{3,\ 9,\ 19\}$

3, 9, 19를 5로 나누었을 때의 나머지는 3, 4, 4이므로 $B=\{3,\ 4\}$

따라서 집합 B의 모든 원소의 합은 7

9

[정답] 63

$A_{36}=\{2,\ 4,\ 6\}$

$A_n\subset A_{36}$이려면 $8\notin A_n$이어야 하므로 $\sqrt{n}<8$, 즉 $n<64$

따라서 n의 최댓값은 63

10

[정답] 7

$\frac{18}{x}$가 자연수이므로 x는 18의 양의 약수 1, 2, 3, 6, 9, 18 중 하나이다.

1과 18, 2와 9, 3과 6은 함께 속하거나 함께 속하지 않으므로 세 묶음 중 공집합이 아닌 부분을 고르면 된다.

따라서 집합 A의 개수는 $2^3-1=7$

11

[정답] 4

$A=\{a\}$라 하면 $\frac{a^2+k}{4}=a$, 즉 $a^2-4a+k=0$

이 이차방정식의 실근 하나마다 조건을 만족시키는 집합 A가 하나씩 정해지므로, 실근이 오직 하나(중근)이어야 한다.

판별식 $16-4k=0$ $\therefore k=4$

12

[정답] ③

ㄱ. 공집합은 원소가 없으므로 $0 \notin \varnothing$ (거짓)

ㄴ. 공집합은 모든 집합의 부분집합이다. (참)

ㄷ. 1은 집합 $\{1,\ 2,\ 3\}$의 원소이므로 $1 \in \{1,\ 2,\ 3\}$로 써야 한다. (거짓)

ㄹ. 모든 집합은 자기 자신의 부분집합이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄹ

13

[정답] 6

$A \subset B$이므로 $-1, 3$은 이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 두 근이다.

근과 계수의 관계에서 $-a=-1+3=2, b=(-1)\times 3=-3$이므로 $a=-2, b=-3$

$\therefore ab=6$

14

[정답] 0

$3 \in B$이어야 한다. $a^2+3=3$이면 $a=0$이고, $A=\{3,\ 0\}, B=\{0,\ -1,\ 3\}$이므로 $A \subset B$

$-a=3$이면 $a=-3$, $A=\{3,\ -3\}, B=\{3,\ -7,\ 12\}$로 $-3 \notin B$

$2a-1=3$이면 $a=2$, $A=\{3,\ 2\}, B=\{-2,\ 3,\ 7\}$로 $2 \notin B$

따라서 $a=0$

15

[정답] 4

$x^2+x-6 \le 0$에서 $(x+3)(x-2) \le 0$이므로 $A=\{x\,|-3 \le x \le 2\}$

$f(x)=x^2-kx+k^2-19$라 하면 $B=\{x\,|f(x)<0\}$이고, $A \subset B$이려면 $-3 \le x \le 2$에서 항상 $f(x)<0$이어야 한다.

$y=f(x)$의 그래프는 아래로 볼록하므로 $f(-3)<0, f(2)<0$이면 된다.

$f(-3)=k^2+3k-10<0$에서 $-5<k<2$, $f(2)=k^2-2k-15<0$에서 $-3<k<5$

따라서 $-3<k<2$이고 정수 k는 $-2, -1, 0, 1$의 4개

16

[정답] 2

$A \subset B$이고 $B \subset A$이므로 $A=B$이다.

$1 \in A$이므로 $1 \in B$에서 $a^2-3=1 \therefore a=\pm 2$

$a=-2$이면 $A=\{1,\ 6\}, B=\{2,\ 1\}$로 $A \neq B$

$a=2$이면 $A=\{1,\ 2\}, B=\{2,\ 1\}$로 $A=B \therefore a=2$

17

[정답] 12

$3 \in A$이므로 $3 \in B$에서 $a^2-1=3 \therefore a=\pm 2$

$a=-2$이면 $a+5=3$이 되어 $n(A) \le 2$이므로 $A=B$일 수 없다.

$a=2$이면 $A=\{3,\ 7,\ b-2\}, B=\{3,\ 7,\ 8\}$이므로 $b-2=8 \therefore b=10$

$\therefore a+b=12$

18

[정답] $-\frac{1}{2}$

$X=\{a+1,\ a+2,\ a+3,\ a+4\}$, $Y=\{-a,\ 1-a,\ 2-a,\ 3-a\}$이다.

두 집합의 원소는 모두 차가 1인 연속한 네 수이므로 가장 작은 원소끼리 같아야 한다.

$a+1=-a \therefore a=-\frac{1}{2}$

이때 $X=Y=\left\{\frac{1}{2},\ \frac{3}{2},\ \frac{5}{2},\ \frac{7}{2}\right\}$

19

[정답] 343

$n(A)=3$이므로 a는 약수가 3개인 수, 즉 소수의 제곱이다.

두 자리 수인 소수의 제곱은 $25, 49$이고 $A=\{1,\ 5,\ 25\}$ 또는 $\{1,\ 7,\ 49\}$

bcd는 집합 A의 모든 원소의 곱이므로 최댓값은 $1\times 7\times 49=343$

20

[정답] 16

원소의 개수가 $3, 4, 5$인 부분집합의 개수는 ${}_5\mathrm{C}_3+{}_5\mathrm{C}_4+{}_5\mathrm{C}_5=10+5+1=16$

(전체 $2^5=32$개는 원소가 k개인 것과 $5-k$개인 것이 짝을 이루므로 그 절반으로 구해도 된다.)

21

[정답] 28

3을 반드시 갖고, 나머지 원소 8개 중 2개를 고르므로 ${}_8\mathrm{C}_2=28$

22

[정답] 16

$A=\{-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4\}$이므로 $n(A)=7$

$0, 4$를 반드시 갖고 -1을 갖지 않는 부분집합의 개수는 $2^{7-2-1}=2^4=16$

23

[정답] 110

홀수 $1, 3, 5, 7, 9$ 중 3개를 고르는 방법은 ${}_5\mathrm{C}_3=10$

짝수 $2, 4, 6, 8$ 중 2개 이상을 고르는 방법은 ${}_4\mathrm{C}_2+{}_4\mathrm{C}_3+{}_4\mathrm{C}_4=11$

따라서 구하는 집합의 개수는 $10\times 11=110$

24

[정답] 4

$x^2-6x+8=(x-2)(x-4)=0$이므로 $A=\{2,\ 4\}, B=\{2,\ 4,\ 6,\ 8\}$

집합 X는 B의 부분집합 중 $2, 4$를 모두 갖는 것이므로 그 개수는 $2^{4-2}=4$

25

[정답] 63

17보다 작은 소수는 2, 3, 5, 7, 11, 13의 6개이다.

$f(17)$은 집합 $\{2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 11,\ 13\}$의 공집합이 아닌 부분집합의 개수이므로 $2^6-1=63$

26

[정답] 11

원소의 곱이 홀수이려면 모든 원소가 홀수이어야 하므로 $X\subset\{1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9\}$

홀수의 합이 홀수이려면 원소의 개수가 홀수이어야 하고, (가)에서 $n(X)=3$ 또는 $n(X)=5$

따라서 집합 X의 개수는 ${}_5\mathrm{C}_3+{}_5\mathrm{C}_5=10+1=11$

27

[정답] 15

(가)에서 곱이 홀수이므로 모든 원소가 홀수이고, (나)에서 $A\subset\{5,\ 7,\ 9,\ 11,\ 13\}$

홀수의 합이 짝수이려면 원소의 개수가 짝수이어야 하고, $A\neq\varnothing$이므로 원소는 2개 또는 4개이다.

따라서 집합 A의 개수는 ${}_5\mathrm{C}_2+{}_5\mathrm{C}_4=10+5=15$

28

[정답] 67

가장 큰 원소가 3인 집합은 $\{1,\ 3\}$의 1개

가장 큰 원소가 5인 집합은 5를 갖고 1, 3 중 적어도 하나를 가지므로 $2^2-1=3$개

가장 큰 원소가 7인 집합은 7을 갖고 1, 3, 5 중 적어도 하나를 가지므로 $2^3-1=7$개

따라서 구하는 값은 $3\times1+5\times3+7\times7=67$

29

[정답] 18

원소가 5개인 집합에서 원소가 2개인 부분집합은 $n={}_5\mathrm{C}_2=10$개

각 원소는 원소가 2개인 부분집합 중 4개에 속하므로 $s_1+s_2+\cdots+s_n=4(1+2+x+4+5)=4(x+12)$

$4(x+12)=120\therefore x=18$

30

[정답] 30

집합 A의 부분집합은 $2^5=32$개이므로 $n=31$

각 원소는 $2^4=16$개의 부분집합에 속하므로 $16(5a+20)=400\therefore a=1$

$\therefore n-a=30$

31

[정답] 18

집합 B의 원소가 자연수이므로 a, b, c, d는 모두 제곱수이고, 두 집합에 모두 속하는 원소도 제곱수이다.

합이 13인 서로 다른 제곱수는 4, 9뿐이다. ($1+4+9=14$, $1+4=5$, $1+9=10$)

4, $9\in B$이므로 16, $81\in A$이고 4, $9\in A$이다. 또 1은 두 집합에 모두 속하지 않으므로 $1\notin A$

따라서 $A=\{4,\ 9,\ 16,\ 81\}$, $B=\{2,\ 3,\ 4,\ 9\}$이고 집합 B의 모든 원소의 합은 18

32

[정답] 11

a를 뺀 원소 1, 2, 3, 4로 만든 $x-y$는 -4, -3, $\cdots$, 3의 8개이다.

a로 만든 수 $a-1$, $a-3$, $a-5$ 중 -4 이상 3 이하가 아닌 것이 정확히 하나이어야 한다. (a는 1, 2, 3, 4가 아닌 자연수)

$a=5$이면 4, 2, 0으로 새로운 수 1개, $a=6$이면 5, 3, 1로 1개, $a=7$이면 6, 4, 2로 2개, $a\geq8$이면 $a-5\geq3$이므로 2개 이상이다.

따라서 $a=5$ 또는 $a=6$이고 그 합은 11

33

[정답] 32

a, b, $b-a$가 자연수이므로 $b>a$이고, 집합 B에서 가장 큰 원소는 $\sqrt{4a+4b}=2\sqrt{a+b}=10\therefore a+b=25$

$\sqrt{a}$, $\sqrt{b}$가 자연수이므로 a, b는 제곱수이고 $a+b=25$, $a<b$에서 $a=9$, $b=16$

$A=\{9,\ 16,\ 7,\ 5\}$, $B=\{3,\ 4,\ 5,\ 10\}$이므로 $X=\{7,\ 9,\ 16\}$

따라서 집합 X의 모든 원소의 합은 32

34

[정답] 6

(가)에서 $a \in A$인데 $2a^2-1 \notin A$이면 모순이므로 $a \in A$이면 $2a^2-1 \in A$이다. $f(a)=2a^2-1$이라 하자.

ⅰ) $n(A)=1$: $f(a)=a$에서 $2a^2-a-1=0$, $a=1$ 또는 $a=-\frac{1}{2}$ $\therefore$ 2개

ⅱ) $n(A)=2$, $A=\{a,\ b\}$: 두 원소가 모두 $f(x)=x$를 만족시키면 $\{1,\ -\frac{1}{2}\}$

$f(a)=b$, $f(b)=b$이면 $b=1$일 때 $2a^2-1=1$에서 $a=-1$, $b=-\frac{1}{2}$일 때 $2a^2-1=-\frac{1}{2}$에서 $a=\frac{1}{2}$ $\therefore \{-1,\ 1\}$, $\{\frac{1}{2},\ -\frac{1}{2}\}$

$f(a)=b$, $f(b)=a$ $(a \neq b)$이면 두 식을 빼서 $2(a+b)=-1$, $2a^2+a-\frac{1}{2}=0$에서 $\left\{\frac{-1+\sqrt{5}}{4},\ \frac{-1-\sqrt{5}}{4}\right\}$

따라서 집합 A의 개수는 $2+1+2+1=6$

35

[정답] 496

$A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 8,\ 9,\ 10,\ 12,\ 15,\ 16,\ 18,\ 20\}$

4의 배수 4, 8, 12, 16, 20은 반드시 갖는다.

12가 아닌 3의 배수 3, 6, 9, 15, 18 중 적어도 하나를 가지는 방법은 $2^5-1=31$

나머지 원소 1, 2, 5, 10은 자유롭게 고르므로 $2^4=16$ $\therefore 31\times16=496$

36

[정답] ①

(나)에서 $a \in A$이면 $a^2-2 \in A$이다.

$0 \in A$이므로 $-2 \in A$, $(-2)^2-2=2 \in A$, $2^2-2=2$ $\therefore$ $\{-2,\ 0,\ 2\} \subset A$

$A=\{-2,\ 0,\ 2,\ t\}$ (t는 -2, 0, 2가 아닌 실수)라 하면 $t^2-2 \in A$

$t^2-2=-2$이면 $t=0$, $t^2-2=2$이면 $t=\pm2$로 모순, $t^2-2=0$이면 $t=\pm\sqrt{2}$, $t^2-2=t$이면 $t=-1$ ($t \neq 2$)

따라서 집합 A의 개수는 3

37

[정답] 60

$S=\{(\pm5,\ 0),\ (0,\ \pm5),\ (\pm3,\ \pm4),\ (\pm4,\ \pm3)\}$이므로 $n(S)=12$

원에 내접하는 삼각형이 직각삼각형이려면 빗변이 원의 지름이어야 한다.

S의 12개 점은 원점에 대하여 대칭인 6쌍으로 나누어지므로 지름은 6개이고, 지름마다 나머지 10개의 점 중 하나를 고르면 된다.

따라서 직각삼각형의 개수는 $6\times10=60$

38

[정답] 7

A의 원소 중 k보다 큰 원소가 j개이면 $f(k)=2^j$이므로 $f(a)=2f(b)$이면 a보다 큰 원소가 b보다 큰 원소보다 1개 많다. 즉, $a<b$이고 a와 b 사이에 다른 원소가 없다.

a, b는 5, 8, 9, 10이 아닌 서로 다른 자연수이다.

ⅰ) $b<5$: $a<b\leq4$인 순서쌍은 $(1,\ 2)$, $(1,\ 3)$, $(1,\ 4)$, $(2,\ 3)$, $(2,\ 4)$, $(3,\ 4)$ 중 사이에 다른 원소가 없는 것으로 모두 가능하므로 6개

ⅱ) $a<5<b$이면 사이에 5가 있어 불가능, $5<a<b$이면 $a=6$, $b=7$의 1개

따라서 순서쌍의 개수는 7

39

[정답] 59

$B=\{b_1,\ b_2\}$, $C=\{c_1,\ c_2,\ c_3\}$이라 하면 집합 D의 원소는 $3+b_i+c_j$ 꼴의 6개 수 중 서로 다른 것이다.

같은 수가 있으면 한 번만 더하므로 6개가 모두 다를 때 합이 가장 크다.

이때 합은 $6\times3+3(b_1+b_2)+2(c_1+c_2+c_3)=18+21+20=59$

$B=\{1,\ 6\}$, $C=\{2,\ 3,\ 5\}$이면 $D=\{6,\ 7,\ 9,\ 11,\ 12,\ 14\}$로 6개가 모두 다르므로 최댓값은 59

40

[정답] 148

U의 원소를 1, 2, 4, 8, 16 / 3, 6, 12 / 5, 10 / 7, 14 / 9, 18 / 11 / 13 / 15 / 17 / 19처럼 '2배' 관계로 묶으면, 한 묶음에서 이웃한 두 수를 함께 넣을 수 없다.

각 묶음에서 넣을 수 있는 원소는 많아야 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1개이므로 $n(A)\leq13$이고, 첫 묶음은 1, 4, 16, 둘째 묶음은 3, 12만 가능하다.

$n(A)=13$이면 A는 1, 4, 16, 3, 12, 11, 13, 15, 17, 19와 5 또는 10, 7 또는 14, 9 또는 18을 갖는다.

고정된 원소의 합은 111이고, 나머지 세 원소를 모두 큰 수로 고르면 $10+14+18=42$로 합 153은 홀수이다.

합이 짝수가 되도록 하나를 작은 수로 바꾸면 차이가 5, 7, 9로 모두 홀수이므로, 가장 적게 줄이는 $10\rightarrow5$를 택하여 최댓값은 $153-5=148$