

1

이차함수 $y = -2x^2 + ax + 5$ 의 그래프와 x 축이 서로 다른 두 점 $A(b, 0)$, $B(5, 0)$ 에서 만날 때, $a - 2b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

이차함수와 이차방정식의 관계

고1

05

2

이차함수 $y = x^2 - kx + 15$ 의 그래프와 x 축이 두 점 A, B 에서 만난다. $\overline{AB} = 2$ 가 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 곱을 구하시오.

3

이차함수 $y = -x^2 + ax + a + 1$ 의 그래프와 x 축이 두 점 A, B에서 만나고, $\overline{OA} + \overline{OB} = 12$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

이차함수의 그래프와 x축의 위치 관계

4

이차함수 $y = x^2 - 2kx + k^2 + k - 2$ 의 그래프가 x 축과 만나도록 하는 정수 k 의 최댓값을 구하시오.

5

이차함수 $y = x^2 - 6x + k + 7$ 의 그래프와 x 축이 서로 다른 두 점에서 만나고, 이차함수 $y = -x^2 + 2kx - k - 12$ 의 그래프와 x 축은 접하도록 하는 실수 k 의 값을 구하시오.

6

이차함수 $f(x) = x^2 - kx + 3k - 9$ 의 그래프가 x 축과 점 A에서 접하고, y 축과 점 B에서 만날 때, 삼각형 OAB의 넓이를 구하시오. (단, O는 원점이고, k 는 상수이다.)

7

이차함수 $y = x^2 - 2(a + k)x + k^2 + bk + a$ 의 그래프가 실수 k 의 값에 관계없이 항상 x 축에 접할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이고 $a > 0$ 이다.)

8

이차함수 $y = x^2 + 2ax + 10a - b^2 - 4b - 28$ 의 그래프와 x 축이 만나지 않도록 하는 두 정수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

9

이차함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 의 그래프가 x 축과 만나지 않을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, a, b 는 실수이다.)

보기

$\neg. b < 0$

$\neg. 2a - 4b > 1$

$\neg. 2a + b > -4$

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg$
④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg$

이차함수의 그래프와 직선의 교점

10

이차함수 $y = x^2 - 2x + 1$ 의 그래프와 두 직선 $y = x$, $y = -x$ 의 교점의 개수를 각각 p, q 라 할 때, $p + q$ 의 값을 구하시오.

11

두 유리수 a, b 에 대하여 두 이차함수 $y = x^2 - 6x + 1$, $y = -x^2 + ax + b$ 의 그래프가 만나는 서로 다른 두 점을 P, Q 라 하자. 점 P 의 x 좌표가 $1 - \sqrt{3}$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

12

양수 m 에 대하여 직선 $y = mx$ 가 이차함수 $y = x^2 - 3$ 의 그래프와 두 점 A, B 에서 만난다. 두 점 A, B 에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 A_1, B_1 이라 하면 두 선분 AA_1, BB_1 의 길이의 차가 4일 때, m 의 값을 구하시오.

13

이차함수 $f(x) = x^2 - 2x + 3 - k$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 가 서로 다른 두 점에서 만날 때, 두 교점의 x 좌표를 각각 a, b 라 하자. $-9 < f(a) \times f(b) < 9$ 를 만족시키는 정수 k 의 개수를 구하시오.

14

양의 실수 k, m 에 대하여 이차함수 $y = 2(x - k)^2$ 의 그래프와 직선 $y = mx$ 가 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 두 점 A, B에서 y 축에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 하자. 선분 AB의 길이가 $3\sqrt{5}$, 선분 CD의 길이가 6일 때, $m + k$ 의 값을 구하시오.

15

이차항의 계수가 1인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 꼭짓점은 직선 $y = mx$ 위에 있고, 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = mx + 4$ 의 교점의 x 좌표는 α, β 이다. 곡선 $y = f(x)$ 의 축의 방정식이 $x = \frac{\alpha + \beta - 3}{2}$ 일 때, $|\alpha - \beta|$ 의 값을 구하시오. (단, m, α, β 는 실수이다.)

16

이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 서로 다른 두 점 사이의 거리가 a , 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = 3$ 의 서로 다른 두 교점 사이의 거리가 $a + 6$, 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = 9$ 의 서로 다른 두 교점 사이의 거리가 $a + 12$ 이다. 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = m$ 이 한 점에서 만날 때, 상수 m 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

17

이차함수 $y = -x^2 + 5x + 1$ 의 그래프와 <보기>의 각 직선의 위치 관계에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보
기

- ㄱ. 직선 $y = -x + 3$ 과 서로 다른 두 점에서 만난다.
 ㄴ. 직선 $y = x + 5$ 와 한 점에서 만난다.
 ㄷ. 직선 $y = 3x + 4$ 와 만나지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18

이차함수 $y = x^2 + 2ax + 6$ 의 그래프와 직선 $y = -x - a^2 + 2$ 가 만나지 않도록 하는 모든 자연수 a 의 값의 합을 구하시오.

19

직선 $y = x - k$ 가 이차함수 $y = x^2 + (2k - 1)x - 1$ 의 그래프와 한 점에서 만나고, 이차함수 $y = 2x^2 + 5x + k$ 의 그래프와 만나지 않도록 하는 실수 k 의 값을 구하시오.

20

이차함수 $y = x^2 + 2kx - 3k + 1$ 의 그래프와 직선 $y = kx - 10$ 이 한 점에서 만나도록 하는 모든 실수 k 의 값의 곱을 구하시오.

21

이차함수 $y = x^2 + 2x + n - 19$ 의 그래프와 직선 $y = 2ax - a^2 - a$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 자연수 n 의 개수를 $f(a)$ 라 할 때, $f(a) = 0$ 이 되는 정수 a 의 최솟값을 구하시오.

22

실수 a 에 대하여 이차함수 $f(x) = -3x^2 + 8x + 4$ 의 그래프와 직선 $y = 2x + a$ 의 교점의 개수를 $h(a)$ 라 하자. $f(a) = h(a)$ 를 만족시키는 모든 a 의 값의 곱을 구하시오.

23

이차항의 계수가 1인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 x 축과 두 점 $(-2, 0)$, $(4, 0)$ 에서 만나고, 이차항의 계수가 -1 인 이차함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 x 축과 두 점 $(1, 0)$, $(4, 0)$ 에서 만난다. 함수 $y = 2f(x) + kg(x)$ 의 그래프와 직선 $y = kx - 4$ 가 만나지 않도록 하는 정수 k 의 최솟값을 구하시오.

24

함수 $f(x) = x^2 + 4x - 12n + 40$ 의 그래프와 x 축이 만나는 점의 개수를 A , 함수 $g(x) = x^2 - 10x - 36n + 94$ 의 그래프와 직선 $y = 2x - 2$ 가 만나는 점의 개수를 B 라 하자. $A = B$ 가 되도록 하는 10 이하의 자연수 n 의 개수를 구하시오.

25

이차함수 $y = x^2 + x - 1$ 의 그래프와 직선 $y = 3x + k$ 가 점 (p, q) 에서 접할 때, $k + p + q$ 의 값을 구하시오.
(단, k 는 실수이다.)

26

상수 k 에 대하여 이차함수 $y = -x^2 + 7x + 4$ 의 그래프와 직선 $y = -x + k$ 가 점 P에서 접한다. 직선 $y = -x + k$ 와 y 축이 만나는 점을 Q라 할 때, 삼각형 OPQ의 넓이를 구하시오. (단, O는 원점이다.)

27

두 양수 m, n 에 대하여 직선 $y = mx + 1$ 이 두 이차함수 $y = \frac{1}{2}x^2 + 9$, $y = x^2 + 2x + n$ 의 그래프에 동시에 접할 때, $m + n$ 의 값을 구하시오.

28

이차함수 $y = x^2 - ax + 2a - 3$ 의 그래프는 a 의 값에 관계없이 항상 점 P 를 지난다. 이 이차함수의 그래프가 직선 $y = -x + b$ 와 점 P 에서 접할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

29

이차함수 $y = x^2 - 4kx + 12k$ 의 그래프와 직선 $y = 2ax - b - 4k^2$ 이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 접할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

30

이차함수 $y = ax^2 + x + b$ 의 그래프가 두 직선 $y = 5x + 2, y = -x + 5$ 에 동시에 접할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

31

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq f(1)$ 이다.

(나) $f(-2) = 0$

함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x + k$ 가 접할 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

이차함수의 그래프의 성질과 방정식

32

x 에 대한 이차방정식 $2x^2 + ax + b = 0$ 의 한 근이 5이고, 이차함수 $y = 2x^2 + ax + b$ 의 그래프가 직선 $x = 1$ 에 대하여 대칭일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

33

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 모든 자연수 k 의 값의 합을 구하시오.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq f(2)$ 이다.
 (나) $f(5) = 10$
 (다) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 4k - 15$ 이다.

34

양수 a 에 대하여 이차함수 $f(x) = 2x^2 - 4ax$ 의 그래프의 꼭짓점을 A, x 축과 만나는 두 점을 각각 O, B라 하자. 점 A를 지나고 최고차항의 계수가 -1 인 이차함수 $y = g(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점을 B, C라 하자. 양수 b 에 대하여 $\overline{BC} = 2b$ 일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, O는 원점이다.)

보

기

ㄱ. $g(2a + b) = b^2$
 ㄴ. $f(a) - g(2a) < g(2a + b) + f(2a)$
 ㄷ. 방정식 $f(x) = g(x)$ 의 서로 다른 두 실근이 2, 4이면 $b = 1$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

35

이차항의 계수가 1인 이차함수 $y = f(x)$ 와 일차함수 $y = g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 x 축에 접한다.

(나) 두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프가 접하는 점의 x 좌표는 α 이다.

(다) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립한다.

이차식 $f(x)$ 를 $g(x)$ 로 나누었을 때의 나머지가 4일 때, $|\alpha - \beta|$ 의 값을 구하시오.

36

이차항의 계수가 3인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 x 축과 두 점 $(-4, 0), (5, 0)$ 에서 만나고, 이차항의 계수가 -2 인 이차함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 x 축과 두 점 $(2, 0), (5, 0)$ 에서 만난다. 함수 $y = f(x) + 3g(x)$ 의 그래프와 x 축이 만나는 서로 다른 모든 점의 x 좌표의 합을 구하시오.

37

함수 $y = |x^2 - 8x|$ 의 그래프와 직선 $y = a$ 가 서로 다른 네 점에서 만나도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

38

방정식 $|x^2 - 4x| = x + k$ 가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오.

39

함수 $y = |(x + 1)(x - 4)|$ 의 그래프와 직선 $y = mx + 3$ 이 서로 다른 네 점에서 만나도록 하는 실수 m 의 값의 범위가 $\alpha < m < \beta$ 일 때, $\beta - \alpha$ 의 값을 구하시오.

40

최고차항의 계수가 1인 두 이차함수 $f(x), g(x)$ 와 실수 k 에 대하여 함수 $h(x)$ 를 $x < k$ 일 때 $h(x) = f(x)$, $x \geq k$ 일 때 $h(x) = g(x)$ 라 하자. 함수 $h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $h(2 - x) = h(2 + x)$

(나) 방정식 $h(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

(다) 함수 $h(x)$ 의 최솟값은 -1 이다.

함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 직선 $y = mx - 2m - 4$ 가 접하도록 하는 모든 실수 m 의 값의 곱을 구하시오.

41

두 유리수 a, b 에 대하여 이차함수 $f(x) = x^2 + ax - 3$ 의 그래프와 일차함수 $g(x) = 2x + b$ 의 그래프가 두 점 A, B에서 만나고 점 A의 x 좌표는 $2 - \sqrt{3}$ 이다. 함수 $h(x)$ 를 $f(x) \leq g(x)$ 일 때 $h(x) = f(x)$, $f(x) > g(x)$ 일 때 $h(x) = g(x)$ 라 할 때, 방정식 $h(x) = t$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 실수 t 의 값의 범위는 $\alpha < t < \beta$ 이다. $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값을 구하시오.

이차방정식의 근의 위치

42

이차함수 $y = x^2 - 4x + 8$ 의 그래프와 직선 $y = 2x + k$ 가 서로 다른 두 점 A, B에서 만나고, 두 점 A, B의 x 좌표가 모두 양수가 되도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

43

이차방정식 $x^2 - 4x + a = 0$ 의 서로 다른 두 실근이 모두 0과 3 사이에 있도록 하는 실수 a 의 값의 범위가 $\alpha < a < \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

44

이차방정식 $x^2 + 2ax + 3a - 4 = 0$ 의 두 실근 사이에 -1 과 2 가 모두 있도록 하는 정수 a 의 최댓값을 구하시오.

45

x 에 대한 이차방정식 $kx^2 - 2x + k - 4 = 0$ 의 한 근은 1보다 작고 다른 한 근은 1보다 크도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오. (단, $k \neq 0$)

고난도

46

최고차항의 계수가 1이고 꼭짓점의 x 좌표가 α 인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x) = -3x + k$ 가 서로 다른 두 실수 α, β 를 근으로 가질 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, k 는 실수이다.)

보

기

ㄱ. $\beta > \alpha - 3$
ㄴ. $f(0) - k = \alpha^2 - 3\alpha$
ㄷ. $f(0) \leq 3\alpha + 3\beta + f(\alpha)$ 이면 $f(\alpha + 3) > k$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

47

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축은 서로 다른 두 점에서 만나고, 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 이차함수 $y = 2x^2 - 4x$ 의 그래프와 x 축이 만나는 두 점 중에서 한 점만을 지난다.

(나) 함수 $y = f(x) + 1$ 의 그래프와 x 축은 한 점에서 만난다.

$f(3) < 0$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

48

최고차항의 계수가 각각 1, -1 인 두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(-1) > 0$
 (나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)g(x) = -x^2(x^2 - 4)$ 가 성립한다.
 (다) 직선 $y = mx$ 와 두 이차함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프가 각각 접하도록 하는 상수 m 의 값이 존재한다.

$f(m) + g(m)$ 의 값을 구하시오.

49

실수 k 에 대하여 이차함수 $f(x) = x^2 - 2kx + k^2 - 14$ 의 그래프와 직선 $y = 2$ 가 두 점 A, B에서 만나고, 두 직선 OA, OB의 기울기의 곱이 -1 이다. 삼각형 AOB의 넓이를 S 라 할 때, $k^2 \times S$ 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, $k^2 \neq 16$ 이다.)

50

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(p) = f(2p) = 0$ 이고, 방정식 $f(2x - 1) = 0$ 의 서로 다른 모든 실근의 합이 10일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오. (단, p 는 0이 아닌 실수이다.)

51

최고차항의 계수가 1이고 계수가 정수인 이차식 $P(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $P(-1) = P(5)$

(나) 복소수 $z = a + bi$ (a, b 는 실수)에 대하여 $z - 1$ 은 방정식 $P(x) = 0$ 의 한 허근이다.

이차함수 $y = P(x)$ 의 그래프와 직선 $y = bx + 7$ 이 한 점에서 만날 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

52 2026년 9월 고1 28번 [4점]

이차함수 $f(x) = (x + 3)(x - k)$ ($k > 0$)이 $f(-2) < f(0)$ 을 만족시킨다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 서로 다른 두 점을 각각 A, B라 하고, y 축과 만나는 점을 C라 하자. 삼각형 ABC가 이등변삼각형일 때, 삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

53 2025년 3월 고1 29번 [4점]

이차항의 계수가 음수인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 점 A(3, 6)을 지나고 꼭짓점이 제1사분면 위에 있다. 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 y 축과 만나는 점을 B, x 축과 만나는 점 중 x 좌표가 음수인 점을 C라 하자. 점 B를 지나고 x 축과 평행한 직선이 선분 AC와 만나는 점을 D라 할 때, 삼각형 ABD와 삼각형 BCD의 넓이는 각각 $\frac{3}{2}, \frac{9}{2}$ 이다. 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 꼭짓점의 y 좌표가 k 일 때, $16k$ 의 값을 구하시오. (단, 점 B의 y 좌표는 0보다 크고 6보다 작다.)

54 2025년 6월 고1 16번 [4점]

두 실수 a ($a > 2$), b 에 대하여 이차함수 $y = x^2 - (a + 1)x + a$ 의 그래프와 직선 $y = bx - b$ 가 한 점 $A(1, 0)$ 에서만 만난다. 함수 $y = x^2 - (a + 1)x + a$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 B , y 축과 만나는 점을 C , 직선 $y = bx - b$ 가 y 축과 만나는 점을 D 라 하자. 삼각형 OAD 의 넓이를 S_1 , 사각형 $ABCD$ 의 넓이를 S_2 라 할 때, $S_1 : S_2 = 2 : 7$ 이 되도록 하는 a 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)

55 2026년 9월 고1 19번 [4점]

최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점을 각각 $A(4, 0)$, $B(a, 0)$ ($a > 4$)라 하고, y 축과 만나는 점을 C 라 하자. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = -x$ 가 한 점 P 에서만 만난다. 삼각형 OPB 의 넓이를 S_1 , 삼각형 OPC 의 넓이를 S_2 라 할 때, $S_1 = S_2$ 가 되도록 하는 a 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)

56

이차함수 $y = ax^2$ ($a < 0$)의 그래프와 직선 $y = -2x - 4$ 가 만나는 두 점 A, B의 x 좌표를 각각 α, β ($\alpha < \beta$)라 하자. 점 B에서 x 축에 내린 수선의 발을 H, 점 A에서 선분 BH에 내린 수선의 발을 C라 하자. $\overline{BC} = 6$ 일 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값을 구하시오.

57

직선 $y = 2x + k$ 가 두 함수 $f(x) = x^2 - 7x, g(x) = \frac{1}{2}x - \frac{7}{2}$ 의 그래프와 각각 만나는 점 중에서 서로 다른 점의 개수가 2가 되도록 하는 상수 k 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값을 구하시오.

58

세 양수 a, b, c 에 대하여 두 이차함수 $f(x) = (x - a)^2 + b, g(x) = -\frac{1}{2}(x - c)^2 + 4$ 가 있다. x 에 대한 이차방정식 $f(x) = g(x)$ 는 서로 다른 두 실근 α, β ($\alpha < \beta$)를 갖는다. 함수 $h(x)$ 를 $\alpha \leq x \leq \beta$ 일 때 $h(x) = f(x), x < \alpha$ 또는 $x > \beta$ 일 때 $h(x) = g(x)$ 라 하면, 함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 가 서로 다른 세 점에 서로 만나도록 하는 실수 k 의 값은 1과 2이다. 함수 $y = h(x)$ 의 그래프가 직선 $y = 1$ 과 만나는 서로 다른 세 점의 x 좌표의 합을 S , 직선 $y = 2$ 와 만나는 서로 다른 세 점의 x 좌표의 합을 T 라 하자. $S - T = \frac{a}{4}$ 일 때, $h(7)$ 의 값을 구하시오.

59

최고차항의 계수가 4인 이차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

- (가) 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 함수 $g(x)$ 의 최솟값보다 크다.

(나) 두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프는 모두 직선 $y = 2x - 4$ 와 접한다.

(다) 두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프가 만나는 점의 x 좌표는 $-2, 2$ 이다.

$f(2) - g(1)$ 의 값을 구하시오.

최고차항의 계수가 a ($a < 0$)인 두 이차함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $f(3) = g(3)$ 이다. 함수 $h(x)$ 를 $x \leq 3$ 일 때 $h(x) = f(x)$, $x > 3$ 일 때 $h(x) = g(x)$ 라 할 때, 함수 $h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 직선 $y = f(0)$ 이 만나는 점의 x 좌표는 0, 4, 12뿐이다.
(나) 두 실수 α, β ($\alpha < 3 < \beta$)에 대하여 함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 직선 $y = 2x - 8$ 이 만나는 점의 x 좌표는 $\alpha, 3, \beta$ 이다.

$\alpha + \beta = 6$ 일 때, $h(-2) + h(5)$ 의 값을 구하시오.

두 이차함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 최고차항의 계수는 서로 부호가 반대이고 절댓값이 같은 정수이다.
(나) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 x 축과 한 점 $(0, 0)$ 에서만 만난다.
(다) 방정식 $f(x) + g(x) = 0$ 의 해는 $x = 2$ 이다.
(라) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) - g(x) \geq f(1) - g(1)$ 이다.

x 에 대한 방정식 $\{f(x) - k\} \{g(x) - k\} = 0$ 이 실근을 갖지 않도록 하는 정수 k 의 개수가 3일 때, $f(17) + g(17)$ 의 값을 구하시오.

정답 및 풀이

1
[정답] 10
점 B(5, 0)을 지나므로
 $-50 + 5a + 5 = 0$,
 $a = 9$
 $-2x^2 + 9x + 5 = 0$ 에서
 $2x^2 - 9x - 5 = 0$,
 $(2x + 1)(x - 5) = 0$
 $x = -\frac{1}{2}$ 또는 $x = 5$ 이므로
 $b = -\frac{1}{2}$
 $\therefore a - 2b =$
 $9 + 1 = 10$

2
[정답] -64
두 점 A, B의 x 좌표를 α ,
 β 라 하면 α, β 는 이차방정
식 $x^2 - kx + 15 = 0$ 의
두 근이므로
 $\alpha + \beta = k, \alpha\beta = 15$
 $\overline{AB}^2 = (\alpha -$
 $\beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 -$
 $4\alpha\beta = k^2 - 60 = 4$
 $k^2 = 64$ 이므로 $k = 8$ 또
는 $k = -8$
따라서 모든 k 의 값의 곱
은 -64

3
[정답] 10
 $-x^2 + ax + a + 1 = 0$
에서 $x^2 - ax - a -$
 $1 = 0, (x + 1)(x -$
 $a - 1) = 0$
 $x = -1$ 또는 $x = a + 1$
이고, $a > 0$ 이므로 $a +$
 $1 > 0$
 $\overline{OA} +$
 $\overline{OB} = 1 +$
 $(a + 1) = 12$
 $\therefore a = 10$

4
[정답] 2
이차방정식 $x^2 - 2kx +$
 $k^2 + k - 2 = 0$ 의 판별
식을 D 라 하면 $D \geq 0$ 이
어야 하므로
 $\frac{D}{4} = k^2 - (k^2 + k -$
 $2) = -k + 2 \geq 0$
 $\therefore k \leq 2$
따라서 정수 k 의 최댓값은
2

5
[정답] -3
 $x^2 - 6x + k + 7 = 0$ 의
판별식을 D_1 이라 하면
 $\frac{D_1}{4} = 9 - (k + 7) =$
 $2 - k > 0 \therefore$
 $k < 2$
 $-x^2 + 2kx - k -$
 $12 = 0$, 즉 $x^2 - 2kx +$
 $k + 12 = 0$ 의 판별식을
 D_2 라 하면
 $\frac{D_2}{4} = k^2 - k - 12 =$
 $(k + 3)(k - 4) = 0$ 에서
 $k = -3$ 또는 $k = 4$
 $k < 2$ 이므로 $k = -3$

6
[정답] $\frac{27}{2}$
이차방정식 $x^2 - kx +$
 $3k - 9 = 0$ 의 판별식을
 D 라 하면 x 축에 접하므로
 $D = k^2 - 4(3k - 9) =$
 $k^2 - 12k + 36 = (k -$
 $6)^2 = 0 \therefore$
 $k = 6$
 $f(x) = x^2 - 6x + 9 =$
 $(x - 3)^2$ 이므로 A(3, 0),
B(0, 9)
삼각형 OAB의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times 3 \times 9 = \frac{27}{2}$

7
[정답] 3
이차방정식 $x^2 - 2(a +$
 $k)x + k^2 + bk + a = 0$
의 판별식을 D 라 하면
 $\frac{D}{4} = (a + k)^2 - (k^2 +$
 $bk + a) = (2a - b)k +$
 $a^2 - a = 0$
이 등식이 k 에 대한 항등
식이므로 $2a - b = 0$,
 $a^2 - a = 0$
 $a > 0$ 이므로 $a = 1, b =$
 $2 \therefore a + b = 3$

8
[정답] 3
이차방정식 $x^2 + 2ax +$
 $10a - b^2 - 4b - 28 =$
0의 판별식을 D 라 하면
 $D < 0$ 이어야 하므로
 $\frac{D}{4} = a^2 - 10a + b^2 +$
 $4b + 28 = (a - 5)^2 +$
 $(b + 2)^2 - 1 < 0$
즉 $(a - 5)^2 + (b +$
 $2)^2 < 1$ 이고 a, b 가 정수
이므로 $a - 5 = 0, b +$
 $2 = 0$
 $a = 5, b = -2$
 $\therefore a + b = 3$

9
[정답] ③
 $x^2 + ax + b = 0$ 의 판별
식을 D 라 하면 $D =$
 $a^2 - 4b < 0$, 즉 $4b > a^2$
 $\therefore b > \frac{a^2}{4} \geq 0$ 이므로
 $b > 0$ (거짓)
 $\therefore 2a - 4b < 2a -$
 $a^2 = 1 - (a - 1)^2 \leq 1$
이므로 $2a - 4b < 1$ (거
짓)
 $\therefore 2a + b > 2a +$
 $\frac{a^2}{4} = \frac{(a+4)^2}{4} - 4 \geq -4$
이므로 $2a + b > -4$ (참)
따라서 옳은 것은 ㄷ이다.

10
[정답] 2
 $x^2 - 2x + 1 = x$, 즉
 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 의 판별
식은 $9 - 4 = 5 > 0$ 이므
로 $p = 2$
 $x^2 - 2x + 1 = -x$, 즉
 $x^2 - x + 1 = 0$ 의 판별
식은 $1 - 4 = -3 < 0$ 이
므로 $q = 0$
 $\therefore p + q = 2$

11

[정답] 3

두 점 P, Q의 x 좌표는 $x^2 - 6x + 1 = -x^2 + ax + b$, 즉 $2x^2 - (6 + a)x + 1 - b = 0$ 의 두 근이다.

계수가 유리수이고 한 근이 $1 - \sqrt{3}$ 이므로 다른 한 근은 $1 + \sqrt{3}$

두 근의 합: $2 = \frac{6+a}{2}$ 에서 $a = -2$

두 근의 곱: $(1 - \sqrt{3})(1 + \sqrt{3}) = -2 = \frac{1-b}{2}$ 에서 $b = 5$

therefore $a + b = 3$

12

[정답] 2

두 점 A, B의 x 좌표를 α , β ($\alpha < \beta$)라 하면 α , β 는 $x^2 - mx - 3 = 0$ 의 두 근이므로

$\alpha + \beta = m$, $\alpha\beta = -3 < 0$ 에서 $\alpha < 0 < \beta$

$m > 0$ 이므로

$\overline{AA_1} =$

$|m\alpha| = -m\alpha$,

$\overline{BB_1} = m\beta$

두 길이의 차는 $|m\beta -$

$(-m\alpha)| = m|\alpha +$

$\beta| = m^2 = 4$

therefore $m = 2$

13

[정답] 11

a, b 는 $x^2 - 2x + 3 -$

$k = x$, 즉 $x^2 - 3x + 3 - k = 0$ 의 서로 다른

두 실근이므로

판별식 $D = 9 - 4(3 - k) = 4k - 3 > 0$ 에서

$k > \frac{3}{4}$

두 교점은 직선 $y = x$ 위

의 점이므로 $f(a) = a$,

$f(b) = b$

$f(a) \times f(b) = ab =$

$3 - k$ 이므로 $-9 < 3 -$

$k < 9$ 에서 $-6 < k <$

12

$\frac{3}{4} < k < 12$ 인 정수 k 는

1, 2, ..., 11의 11개

14

[정답] 4

두 점 A, B의 x 좌표를 α ,

β 라 하면 $A(\alpha, m\alpha)$,

$B(\beta, m\beta)$

$\overline{CD} = m|\beta -$

$\alpha| = 6$, $\overline{AB} =$

$\sqrt{1 + m^2}|\beta - \alpha| =$

$3\sqrt{5}$

두 식을 나누면 $\frac{\sqrt{1+m^2}}{m} =$

$\frac{\sqrt{5}}{2}$, $4 + 4m^2 = 5m^2$ 이

므로 $m = 2$, $|\beta - \alpha| =$

3

α, β 는 $2(x - k)^2 = 2x$,

즉 $x^2 - (2k + 1)x +$

$k^2 = 0$ 의 두 근이므로

$(\beta - \alpha)^2 = (2k +$

$1)^2 - 4k^2 = 4k + 1 =$

9 therefore $k = 2$

따라서 $m + k = 4$

15

[정답] 5

꼭짓점이 (p, mp) 이므로

$f(x) = (x - p)^2 + mp$

$(x - p)^2 + mp =$

$mx + 4$, 즉 $x^2 - (2p +$

$m)x + p^2 + mp - 4 =$

0의 두 근이 α, β 이므로

$\alpha + \beta = 2p + m$,

$\alpha\beta = p^2 + mp - 4$

축의 방정식이 $x = p$ 이므

로 $p = \frac{\alpha + \beta - 3}{2} =$

$\frac{2p + m - 3}{2}$ 에서 $m = 3$

$(\alpha - \beta)^2 = (\alpha +$

$\beta)^2 - 4\alpha\beta = (2p +$

$3)^2 - 4(p^2 + 3p -$

$4) = 25$

therefore $|\alpha - \beta| = 5$

16

[정답] $-\frac{3}{8}$

곡선 $y = f(x)$ 와 직선

$y = m$ 이 한 점에서 만나

므로 꼭짓점의 y 좌표가 m

이다. $f(x) = p(x -$

$q)^2 + m$ 이라 하자.

방정식 $f(x) = k$ 의 두 근

은 $q + \sqrt{\frac{k-m}{p}}$ 이므로

두 교점 사이의 거리는

$2\sqrt{\frac{k-m}{p}}$

k 가 커질수록 거리가 길어

지므로 $p > 0$ 이고

$a^2 = \frac{4(-m)}{p}$, $(a +$

$6)^2 = \frac{4(3-m)}{p}$, $(a +$

$12)^2 = \frac{4(9-m)}{p}$

두 번째 식에서 첫 번째 식

을 빼면 $12a + 36 = \frac{12}{p}$,

즉 $\frac{1}{p} = a + 3$

세 번째 식에서 첫 번째 식

을 빼면 $24a + 144 =$

$\frac{36}{p} = 36(a + 3)$ 이므로

$a = 3$, $\frac{1}{p} = 6$

$a^2 = -4m \times 6$ 에서

$9 = -24m$ therefore

$m = -\frac{3}{8}$

17

[정답] ⑤

ㄱ. $-x^2 + 5x + 1 = -x + 3$, 즉 $x^2 - 6x + 2 = 0$ 의 판별식은 $36 - 8 = 28 > 0$ 이므로 서로 다른 두 점에서 만난다.

(참)

ㄴ. $-x^2 + 5x + 1 = x + 5$, 즉 $x^2 - 4x + 4 = 0$ 의 판별식은 $16 - 16 = 0$ 이므로 한 점에서 만난다. (참)

ㄷ. $-x^2 + 5x + 1 = 3x + 4$, 즉 $x^2 - 2x + 3 = 0$ 의 판별식은 $4 - 12 = -8 < 0$ 이므로 만나지 않는다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

18

[정답] 6

$x^2 + 2ax + 6 = -x - a^2 + 2$, 즉 $x^2 + (2a + 1)x + a^2 + 4 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = (2a + 1)^2 - 4(a^2 + 4) = 4a - 15 < 0 \text{ therefore } a < \frac{15}{4}$$

따라서 자연수 a 는 1, 2, 3이고 그 합은 6

19

[정답] 2

$x^2 + (2k - 1)x - 1 = x - k$, 즉 $x^2 + 2(k - 1)x + k - 1 = 0$ 의 판별식을 D_1 이라 하면

$$\frac{D_1}{4} = (k - 1)^2 - (k - 1) = (k - 1)(k - 2) = 0$$

에서 $k = 1$ 또는 $k = 2$
 $2x^2 + 5x + k = x - k$, 즉 $x^2 + 2x + k = 0$ 의 판별식을 D_2 라 하면

$$\frac{D_2}{4} = 1 - k < 0 \text{에서 } k > 1$$

따라서 $k = 2$

20

[정답] -44

$x^2 + 2kx - 3k + 1 = kx - 10$, 즉 $x^2 + kx - 3k + 11 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = k^2 - 4(-3k + 11) = k^2 + 12k - 44 = 0$$

이 k 에 대한 이차방정식의 판별식이 $144 + 176 > 0$ 이므로 서로 다른 두 실근을 갖고,

근과 계수의 관계에 의하여 모든 k 의 값의 곱은 -44

21

[정답] 7

$x^2 + 2x + n - 19 = 2ax - a^2 - a$, 즉 $x^2 + 2(1 - a)x + n - 19 + a^2 + a = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (1 - a)^2 - (n - 19 + a^2 + a) = 20 - 3a - n > 0 \text{ therefore } n < 20 - 3a$$

$f(a) = 0$ 이라면 $n < 20 - 3a$ 인 자연수 n 이 없어야 하므로 $20 - 3a \leq 1$, 즉 $a \geq \frac{19}{3}$

따라서 정수 a 의 최솟값은 7

22

[정답] $-\frac{2}{3}$

$-3x^2 + 8x + 4 = 2x + a$, 즉 $3x^2 - 6x + a - 4 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면 $\frac{D}{4} = 9 - 3(a - 4) = 3(7 - a)$

$a < 7$ 이면 $h(a) = 2$,
 $a = 7$ 이면 $h(a) = 1$,
 $a > 7$ 이면 $h(a) = 0$

(i) $a < 7$ 일 때 $-3a^2 + 8a + 4 = 2$, $3a^2 - 8a - 2 = 0$ 에서 $a = \frac{4 + \sqrt{22}}{3}$ 이고 두 값 모두 7보다 작다.

(ii) $a = 7$ 일 때 $f(7) = -147 + 56 + 4 = -87 \neq 1$

(iii) $a > 7$ 일 때 $-3a^2 + 8a + 4 = 0$, $3a^2 - 8a - 4 = 0$ 에서 $a = \frac{4 + 2\sqrt{7}}{3}$ 이고 두 값 모두 7보다 작으므로 해당 없음
 따라서 a 의 값은 $3a^2 - 8a - 2 = 0$ 의 두 근이고 그 곱은 $-\frac{2}{3}$

23

[정답] 3

$f(x) = (x + 2)(x - 4) = x^2 - 2x - 8$,
 $g(x) = -(x - 1)(x - 4) = -x^2 + 5x - 4$
 $2f(x) + kg(x) = (2 - k)x^2 + (5k - 4)x - 16 - 4k$

$2f(x) + kg(x) = kx - 4$ 에서 $(2 - k)x^2 + (4k - 4)x - 12 - 4k = 0 \dots \dots \textcircled{1}$
 $k = 2$ 이면 $\textcircled{1}$ 은 $4x - 20 = 0$ 이 되어 $x = 5$ 에서 만나므로 안 된다.

$k \neq 2$ 이면 $\textcircled{1}$ 이 실근을 갖지 않아야 하므로 $\frac{D}{4} = (2k - 2)^2 + (2 - k)(12 + 4k) = 28 - 12k < 0 \text{ therefore } k > \frac{7}{3}$

따라서 정수 k 의 최솟값은 3

24

[정답] 8

$x^2 + 4x - 12n + 40 = 0$ 의 판별식을 D_1 이라 하면 $\frac{D_1}{4} = 4 + 12n - 40 = 12(n - 3)$

$n < 3$ 이면 $A = 0$, $n = 3$ 이면 $A = 1$, $n > 3$ 이면 $A = 2$

$x^2 - 10x - 36n + 94 = 2x - 2$, 즉 $x^2 - 12x - 36n + 96 = 0$ 의 판별식을 D_2 라 하면 $\frac{D_2}{4} = 36 + 36n - 96 = 12(3n - 5)$

자연수 n 에 대하여 $n = 1$ 이면 $B = 0$, $n \geq 2$ 이면 $B = 2$
 $A = B$ 인 자연수 n 은 $n = 1$ 과 $n = 4, 5, \dots, 10$

따라서 구하는 개수는 $1 + 7 = 8$

25

[정답] 0

$x^2 + x - 1 = 3x + k$, 즉 $x^2 - 2x - 1 - k = 0$ 이 중근을 가져야 하므로 판별식을 D 라 하면 $\frac{D}{4} = 1 + 1 + k = 0$

therefore $k = -2$

이때 $x^2 - 2x + 1 = 0$ 에서 중근 $x = 1$ 이므로 $p = 1$, $q = 3 \times 1 - 2 = 1$

therefore $k + p + q = 0$

26

[정답] 40

$-x^2 + 7x + 4 = -x + k$, 즉 $x^2 - 8x + k - 4 = 0$ 이 중근을 가져야 하므로

판별식을 D 라 하면 $\frac{D}{4} = 16 - (k - 4) = 0$
 therefore $k = 20$

이때 $(x - 4)^2 = 0$ 에서 접점의 x 좌표는 4이고 $P(4, 16)$, $Q(0, 20)$
 삼각형 OPQ 의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 20 \times 4 = 40$

27

[정답] 6

$\frac{1}{2}x^2 + 9 = mx + 1$, 즉 $x^2 - 2mx + 16 = 0$ 이 중근을 가지므로 $m^2 - 16 = 0$

$m > 0$ 이므로 $m = 4$

$x^2 + 2x + n = 4x + 1$, 즉 $x^2 - 2x + n - 1 = 0$ 이 중근을 가지므로 $1 - (n - 1) = 0$ therefore $n = 2$

therefore $m + n = 6$

28

[정답] 8

$y = x^2 - 3 + a(2 - x)$ 이므로 a 의 값에 관계없이 $x = 2$ 일 때 $y = 1$, 즉 $P(2, 1)$

직선 $y = -x + b$ 가 점 P 를 지나므로 $1 = -2 + b$, $b = 3$

$x^2 - ax + 2a - 3 = -x + 3$, 즉 $x^2 + (1 - a)x + 2a - 6 = 0$ 이 $x = 2$ 를 중근으로 가지므로

$x^2 + (1 - a)x + 2a - 6 = (x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$ 에서 $1 - a = -4$, $2a - 6 = 4$ therefore $a = 5$

therefore $a + b = 8$

29

[정답] 12

$x^2 - 4kx + 12k = 2ax - b - 4k^2$, 즉 $x^2 - 2(2k + a)x + 4k^2 + 12k + b = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4} = (2k + a)^2 - (4k^2 + 12k + b) = (4a - 12)k + a^2 - b = 0$

이 등식이 k 에 대한 항등식이므로 $4a - 12 = 0$, $a^2 - b = 0$

$a = 3$, $b = 9$ therefore $a + b = 12$

30

[정답] 7

$ax^2 + x + b = 5x + 2$, 즉 $ax^2 - 4x + b - 2 = 0$ 이 중근을 가지므로 판별식 $\frac{D_1}{4} = 4 - a(b - 2) = 0$, 즉 $a(b - 2) = 4 \dots \dots \textcircled{7}$

$ax^2 + x + b = -x + 5$, 즉 $ax^2 + 2x + b - 5 = 0$ 이 중근을 가지므로 판별식 $\frac{D_2}{4} = 1 - a(b - 5) = 0$, 즉 $a(b - 5) = 1 \dots \dots \textcircled{8}$

$\textcircled{7} - \textcircled{8}$ 에서 $3a = 3$, $a = 1$ 이고 $\textcircled{7}$ 에서 $b = 6$

therefore $a + b = 7$

31

[정답] $-\frac{41}{4}$

(가)에서 $x = 1$ 일 때 최소이므로 $f(x) = (x - 1)^2 + q$

(나)에서 $9 + q = 0$, $q = -9$ 이므로 $f(x) = x^2 - 2x - 8$

$x^2 - 2x - 8 = x + k$, 즉 $x^2 - 3x - 8 - k = 0$ 이 중근을 가지므로 판별식 $D = 9 + 4(8 + k) = 0$ therefore $k = -\frac{41}{4}$

32

[정답] 26

그래프가 직선 $x = 1$ 에 대하여 대칭이므로 x 축과 만나는 두 점도 직선 $x = 1$ 에 대하여 대칭이다.

한 근이 5이므로 다른 근은 $2 \times 1 - 5 = -3$

근과 계수의 관계에 의하여 $5 + (-3) = -\frac{a}{2}$, $5 \times (-3) = \frac{b}{2}$

$a = -4$, $b = -30$

therefore $a - b = 26$

33

[정답] 10

(가)에서 $x = 2$ 일 때 최소
이므로 $f(x) = (x - 2)^2 + q$

(나)에서 $9 + q = 10$,
 $q = 1$ 이므로 $f(x)$ 의 최솟
값은 1

(다)에서 $1 \leq 4k - 15$,
 $k \leq 4$

따라서 자연수 k 는 1, 2, 3
, 4이고 그 합은 10

34

[정답] ⑤

$f(x) = 2x(x - 2a)$ 이므
로 $A(a, -2a^2)$,
 $B(2a, 0)$

$C(c, 0)$ 이라 하면

$g(x) = -(x - 2a)(x - c)$ 이고 $g(a) = -2a^2$ 에서 $a(a - c) = -2a^2$ *therefore* $c = 3a$

$\overline{BC} = a = 2b$

이므로 $g(x) = -(x - 4b)(x - 6b)$

$\neg$. $2a + b = 5b$ 이므로
 $g(5b) = -b \times (-b) = b^2$ (참)

$\sqsubset$. $f(a) = -2a^2 = -8b^2$, $g(2a) = f(2a) = 0$, $g(2a + b) = b^2$ 이므로 $-8b^2 < b^2$ (참)

$\sqsupset$. $f(x) - g(x) = 2x^2 - 8bx + (x - 4b)(x - 6b) = 3x^2 - 18bx + 24b^2 = 3(x - 2b)(x - 4b)$

두 실근이 $2b, 4b$ 이므로
 $2b = 2$, $b = 1$ (참)

따라서 옳은 것은 $\neg$, $\sqsubset$,
 $\sqsupset$ 이다.

35

[정답] 4

(다)에서 $x = \beta$ 일 때 최소
이고, (가)에서 최솟값이 0
이므로 $f(x) = (x - \beta)^2$

(나)에서 방정식 $f(x) - g(x) = 0$ 이 중근 α 를 가
지므로 $f(x) - g(x) = (x - \alpha)^2$

$g(x) = (x - \beta)^2 - (x - \alpha)^2 = (\alpha - \beta)(2x - \alpha - \beta)$ 이고
 $g(x)$ 는 일차식이므로
 $\alpha \neq \beta$

나머지정리에 의하여 나머
지는 $f\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) = \left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)^2 = 4$

therefore $|\alpha - \beta| = 4$

36

[정답] 13

$f(x) = 3(x + 4)(x - 5)$, $g(x) = -2(x - 2)(x - 5)$

$f(x) + 3g(x) = 3(x + 4)(x - 5) - 6(x - 2)(x - 5) = 3(x - 5)\{(x + 4) - 2(x - 2)\} = 3(x - 5)(8 - x)$

$f(x) + 3g(x) = 0$ 의 해
는 $x = 5$ 또는 $x = 8$

따라서 x 좌표의 합은 $5 + 8 = 13$

37

[정답] 15

$y = x^2 - 8x = (x - 4)^2 - 16$ 이므로 $y = |x^2 - 8x|$ 의 그래프는 $y = x^2 - 8x$ 의 그래프에
서 x 축 아래 부분을 x 축에
대하여 대칭이동한 것이
다.

$0 \leq x \leq 8$ 에서 $y = -x^2 + 8x$ 이고 이 부분의
꼭짓점은 (4, 16)

직선 $y = a$ 와 서로 다른
네 점에서 만나려면 $0 < a < 16$

따라서 정수 a 는 1, 2, ...,
15의 15개

38

[정답] $\frac{9}{4}$

방정식의 실근의 개수는
 $y = |x^2 - 4x|$ 의 그래프
와 직선 $y = x + k$ 의 교
점의 개수와 같다.

$y = |x^2 - 4x|$ 의 그래프
는 $0 \leq x \leq 4$ 에서 $y = -x^2 + 4x$, 그 밖에서는
 $y = x^2 - 4x$ 이다.

(i) 직선이 $y = -x^2 + 4x$ ($0 \leq x \leq 4$)에 접할
때: $x^2 - 3x + k = 0$ 의
판별식 $9 - 4k = 0$ 에서
 $k = \frac{9}{4}$ (접점의 x 좌표는 $\frac{3}{2}$)

이때 접점 외에 $x < 0$,
 $x > 4$ 인 부분에서 한 점
씩 만나므로 교점은 세 개

(ii) 직선이 원점을 지날 때
 $k = 0$: $|x^2 - 4x| = x$ 의
실근은 $x = 0, 3, 5$ 의 세
개

$0 < k < \frac{9}{4}$ 이면 네 점,
 $k > \frac{9}{4}$ 또는 $-4 < k < 0$
이면 두 점, $k \leq -4$ 이면
한 점 이하에서 만난다.

따라서 $k = 0$ 또는 $k = \frac{9}{4}$
이고 그 합은 $\frac{9}{4}$

[정답] $\frac{15}{4}$

$-1 < x < 4$ 에서 $y = -(x+1)(x-4) = -x^2 + 3x + 4$, $x \leq -1$ 또는 $x \geq 4$ 에서 $y = (x+1)(x-4)$

직선 $y = mx + 3$ 은 m 의 값에 관계없이 점 $(0, 3)$ 을 지나고, $x = 0$ 에서 곡선의 y 좌표는 $4 > 3$ 이므로 점 $(0, 3)$ 은 $-1 < x < 4$ 인 부분의 곡선보다 아래에 있다.

(i) 직선이 점 $(-1, 0)$ 을 지날 때 $0 = -m + 3$ *therefore* $m = 3$

(ii) 직선이 점 $(4, 0)$ 을 지날 때 $0 = 4m + 3$ *therefore* $m = -\frac{3}{4}$

$-\frac{3}{4} < m < 3$ 이면 $x = -1$, $x = 4$ 에서 직선이 곡선보다 위에 있고 $x = 0$ 에서 아래에 있으므로 $-1 < x < 4$ 에서 두 점, $x < -1$, $x > 4$ 에서 각각 한 점, 모두 네 점에서 만난다.

$m = 3$ 또는 $m = -\frac{3}{4}$ 이면 세 점, $m > 3$ 또는 $m < -\frac{3}{4}$ 이면 두 점에서 만난다.

따라서 $\alpha = -\frac{3}{4}$, $\beta = 3$ 이므로 $\beta - \alpha = \frac{15}{4}$

[정답] -4

$k \neq 2$ 이면 (가)에서 두 이차함수가 같아져 $y = h(x)$ 는 축이 $x = 2$ 인 하나의 포물선이 되고 $h(x) = 0$ 의 실근이 3개일 수 없으므로 $k = 2$ 이고 $g(x) = f(4-x)$ $h(x) = 0$ 의 실근은 $x < 2$ 인 근과 그와 대칭인 근이 짝을 이루므로 실근이 3개 이려면 $h(2) = 0$ 이고 $x < 2$ 에서 $f(x) = 0$ 의 근이 하나뿐이다.

$f(x) = (x-2)(x-r)$ ($r < 2$)이고 (다)에서 최솟값 $-\frac{(2-r)^2}{4} = -1$ 이므로 $r = 0$

$f(x) = x^2 - 2x$ ($x < 2$), $g(x) = x^2 - 6x + 8$ ($x \geq 2$)

직선 $y = m(x-2) - 4$ 는 m 의 값에 관계없이 점 $(2, -4)$ 를 지난다.

$x^2 - 2x = mx - 2m - 4$, 즉 $x^2 - (m+2)x + 2m + 4 = 0$ 이 중근을 가지려면 $(m+2)(m-6) = 0$ 이고, 접점의 x 좌표 $\frac{m+2}{2} < 2$ 이어야 하므로 $m = -2$

$x^2 - 6x + 8 = mx - 2m - 4$, 즉 $x^2 - (m+6)x + 2m + 12 = 0$ 이 중근을 가지려면 $(m+6)(m-2) = 0$ 이고, 접점의 x 좌표 $\frac{m+6}{2} \geq 2$ 이어야 하므로 $m = 2$

따라서 모든 m 의 값의 곱은 -4

[정답] 28

두 점 A, B의 x 좌표는 $x^2 + (a-2)x - 3 - b = 0$ 의 두 근이고 계수가 유리수이므로 두 근은 $2 + \sqrt{3}$

두 근의 합 $4 = 2 - a$ 에서 $a = -2$, 두 근의 곱 $1 = -3 - b$ 에서 $b = -4$

$f(x) = (x-1)^2 - 4$, $g(x) = 2x - 4$

$2 - \sqrt{3} \leq x \leq 2 + \sqrt{3}$ 에서 $h(x) = f(x)$ 이고 이 구간에서 $h(x)$ 는 최솟값 -4 를 가지며, 양 끝값은 $g(2 - \sqrt{3}) = -2\sqrt{3}$, $g(2 + \sqrt{3}) = 2\sqrt{3}$

그 밖에서는 $h(x) = g(x)$ 로 증가하므로 $x < 2 - \sqrt{3}$ 에서 $h(x) < -2\sqrt{3}$, $x > 2 + \sqrt{3}$ 에서 $h(x) > 2\sqrt{3}$

$h(x) = t$ 의 실근이 세 개 이려면 $-4 < t < -2\sqrt{3}$

따라서 $\alpha = -4$, $\beta = -2\sqrt{3}$ 이므로 $\alpha^2 + \beta^2 = 16 + 12 = 28$

[정답] 8

두 점의 x 좌표는 $x^2 - 4x + 8 = 2x + k$, 즉 $x^2 - 6x + 8 - k = 0$ 의 서로 다른 두 실근이다.

판별식을 D 라 하면 $\frac{D}{4} = 9 - (8-k) = 1+k > 0$ *therefore* $k > -1$

두 근이 모두 양수이려면 두 근의 합 $6 > 0$, 두 근의 곱 $8 - k > 0$ *therefore* $k < 8$

$-1 < k < 8$ 인 정수 k 는 $0, 1, \dots, 7$ 의 8개

[정답] 7

$f(x) = x^2 - 4x + a = (x-2)^2 + a - 4$ 라 하면 $y = f(x)$ 의 그래프의 축은 $x = 2$ 이고 $0 < 2 < 3$ 이다.

두 근이 모두 0과 3 사이에 있으려면 다음을 모두 만족시켜야 한다.

판별식을 D 라 하면 $\frac{D}{4} = 4 - a > 0$ *therefore* $a < 4$

$f(0) = a > 0$, $f(3) = 9 - 12 + a = a - 3 > 0$ *therefore* $a > 3$

따라서 $3 < a < 4$ 이므로 $\alpha = 3$, $\beta = 4$ *therefore* $\alpha + \beta = 7$

[정답] -1

$f(x) = x^2 + 2ax + 3a - 4$ 라 하면 $y = f(x)$ 의 그래프는 아래로 볼록하므로

두 근 사이에 -1 과 2 가 모두 있으려면 $f(-1) < 0$, $f(2) < 0$

$f(-1) = 1 - 2a + 3a - 4 = a - 3 < 0$ 에서 $a < 3$

$f(2) = 4 + 4a + 3a - 4 = 7a < 0$ 에서 $a < 0$

따라서 $a < 0$ 이므로 정수 a 의 최댓값은 -1

45

[정답] 2

$$f(x) = kx^2 - 2x + k - 4 \text{라 하면 } f(1) = k - 2 + k - 4 = 2k - 6$$

(i) $k > 0$ 일 때 $y = f(x)$ 의 그래프는 아래로 볼록하므로 $f(1) < 0$ 이어야 한다. $2k - 6 < 0$ 에서 $k < 3$ *therefore* $0 < k < 3$

(ii) $k < 0$ 일 때 $y = f(x)$ 의 그래프는 위로 볼록하므로 $f(1) > 0$ 이어야 한다. $2k - 6 > 0$ 에서 $k > 3$ 이므로 $k < 0$ 과 맞지 않는다.

따라서 $0 < k < 3$ 이고 정수 k 는 1, 2의 2개

46

[정답] ②

$$f(x) = (x - \alpha)^2 + q \text{라 하면 } f(x) + 3x - k = x^2 - (2\alpha - 3)x + \alpha^2 + q - k = 0 \text{의 두 근이 } \alpha, \beta$$

$$\neg. \alpha + \beta = 2\alpha - 3 \text{이므로 } \beta = \alpha - 3 \text{ (거짓)}$$

$$\neg. \alpha\beta = \alpha^2 + q - k = f(0) - k \text{이고 } \alpha\beta = \alpha(\alpha - 3) \text{이므로 } f(0) - k = \alpha^2 - 3\alpha \text{ (참)}$$

$$\square. f(0) = \alpha^2 + q, f(\alpha) = q \text{이므로 } \alpha^2 + q \leq 6\alpha - 9 + q, (\alpha - 3)^2 \leq 0 \text{에서 } \alpha = 3, \beta = 0$$

$$f(x) + 3x - k = x(x - 3) \text{이므로 } f(6) + 18 - k = 18, \text{ 즉 } f(\alpha + 3) = f(6) = k \text{ (거짓)}$$

따라서 옳은 것은 ㄴ이다.

47

[정답] 15

$$(나)에서 f(x) + 1 = (x - p)^2, \text{ 즉 } f(x) = (x - p)^2 - 1 \text{이므로 } f(x) = 0 \text{의 두 근은 } p - 1, p + 1$$

$$y = 2x^2 - 4x \text{의 그래프와 } x \text{축이 만나는 점은 } (0, 0), (2, 0)$$

(가)에서 $p - 1, p + 1$ 중 0, 2를 하나만 포함해야 한다.

$$p = 1 \text{이면 두 점을 모두 지나므로 안 되고, } p = -1 \text{ (두 근 } -2, 0) \text{ 또는 } p = 3 \text{ (두 근 } 2, 4)$$

$$p = -1 \text{ 이면 } f(3) = 15 > 0 \text{이므로 안 되고, } p = 3 \text{ 이면 } f(3) = -1 < 0$$

$$f(x) = (x - 3)^2 - 1 \text{ therefore } f(-1) = 16 - 1 = 15$$

48

[정답] 8

$$(나)에서 f(x)g(x) = -x \cdot x \cdot (x - 2)(x + 2) \text{이므로 } f(x) \text{는 일차식 } x, x, x - 2, x + 2 \text{ 중 두 개의 곱이다.}$$

$$f(x) = x^2 \text{이면 } g(x) = -(x^2 - 4) \text{이고, 직선 } y = mx \text{가 } y = x^2 \text{에 접하려면 } m = 0 \text{인데 직선 } y = 0 \text{은 } y = g(x) \text{에 접하지 않는다.}$$

$$f(x) = (x - 2)(x + 2) \text{ 이면 } f(-1) = -3 < 0, f(x) = x(x + 2) \text{ 이면 } f(-1) = -1 < 0 \text{이므로 (가)에 어긋난다.}$$

$$f(x) = x(x - 2), g(x) = -x(x + 2) \text{ 이면 } f(-1) = 3 > 0 \text{이고, } x(x - 2) = mx, -x(x + 2) = mx \text{가 각각 중근을 가지려면 } m = -2 \text{로 같으므로 (다)를 만족시킨다.}$$

$$\text{therefore } f(-2) + g(-2) = 8 + 0 = 8$$

49

[정답] 96

$$(x - k)^2 - 14 = 2 \text{에서 } x = k - 4 \text{ 또는 } x = k + 4 \text{이므로 } A(k - 4, 2), B(k + 4, 2)$$

$$\frac{2}{k-4} \times \frac{2}{k+4} = -1 \text{에서 } 4 = -(k^2 - 16)$$

$$\text{therefore } k^2 = 12$$

$$S = \frac{1}{2} \times$$

$$\overline{AB} \times 2 =$$

$$\frac{1}{2} \times 8 \times 2 = 8$$

$$\text{therefore } k^2 \times S = 96$$

50

[정답] 32

$$f(x) = 2(x - p)(x - 2p)$$

$$f(2x - 1) = 0 \text{이면 } 2x - 1 = p \text{ 또는 } 2x - 1 = 2p \text{이므로 } x = \frac{p+1}{2} \text{ 또는 } x = \frac{2p+1}{2}$$

$$p \neq 0 \text{이므로 두 근은 서로 다르고 합은 } \frac{3p+2}{2} = 10$$

$$\text{therefore } p = 6$$

$$f(x) = 2(x - 6)(x - 12) \text{ therefore } f(4) = 2 \times (-2) \times (-8) = 32$$

51

[정답] 1

$$(가)에서 그래프의 축이 $x = 2$ 이므로 $P(x) = x^2 - 4x + c$ (c 는 정수)$$

$$(나)에서 $(a - 1) + bi$ 가 허근이므로 $b \neq 0$ 이고 $(a - 1) - bi$ 도 근이다.$$

$$\text{두 근의 합 } 2(a - 1) = 4 \text{에서 } a = 3, \text{ 두 근의 곱 } (a - 1)^2 + b^2 = 4 + b^2 = c$$

$$x^2 - 4x + c = bx + 7, \text{ 즉 } x^2 - (4 + b)x + c - 7 = 0 \text{이 중근을 가지므로 } (4 + b)^2 - 4(c - 7) = 0$$

$$(4 + b)^2 - 4(b^2 - 3) = 0 \text{에서 } 3b^2 - 8b - 28 = 0, (b + 2)(3b - 14) = 0$$

$$c = b^2 + 4 \text{가 정수이어야 하므로 } b = -2$$

$$\text{therefore } a + b = 1$$

52

[정답] 167

$$f(-2) = -2 - k, \\ f(0) = -3k \text{이므로} \\ -2 - k < -3k \text{에서} \\ k < 1$$

$$A(-3, 0), B(k, 0), \\ C(0, -3k) \text{라 하면} \\ \overline{AB} = k + 3, \\ \overline{AC} = \sqrt{9 + 9k^2}, \\ \overline{BC} = \sqrt{10k} \\ \overline{AB} = \overline{BC} \text{이면 } k = \frac{3}{\sqrt{10}-1} > 1, \\ \overline{AC} = \overline{BC} \text{이면 } k = 3 \\ \text{이므로 } 0 < k < 1 \text{에 맞지 않는다.} \\ \overline{AB} = \overline{AC} \text{에서 } (k+3)^2 = 9 + 9k^2, 8k^2 = 6k \text{ therefore } k = \frac{3}{4} \\ \text{넓이는 } \frac{1}{2} \times \frac{15}{4} \times \frac{9}{4} = \frac{135}{32} \text{이므로 } p+q = 32 + 135 = 167$$

53

[정답] 121

$$B(0, b) \ (0 < b < 6) \text{라 하면 두 삼각형 ABD, BCD는 밑변 BD가 같고 높이가 각각 } 6-b, b \text{이다.} \\ \text{넓이의 비가 } 1:3 \text{이므로} \\ (6-b):b = 1:3 \\ \text{therefore } b = \frac{9}{2} \\ \frac{1}{2} \times \overline{BD} \times \frac{9}{2} = \frac{9}{2} \text{에서} \\ \overline{BD} = 2 \\ C(c, 0) \ (c < 0) \text{이라 하면 점 D는 선분 AC를 } 3:1 \text{로 내분하는 점이므로 } D\left(\frac{9+c}{4}, \frac{9}{2}\right) \\ \frac{9+c}{4} = 2 \text{이면 } c = -1, \\ \frac{9+c}{4} = -2 \text{이면 } c = -17 \\ f(x) = px^2 + qx + \frac{9}{2} \text{에 대하여 } c = -1 \text{이면 } f(-1) = 0, f(3) = 6 \text{에서 } p = -1, q = \frac{7}{2} \\ c = -17 \text{이면 } p = \frac{1}{85} > 0 \text{이 되어 조건에 맞지 않는다.} \\ f(x) = -x^2 + \frac{7}{2}x + \frac{9}{2} = -\left(x - \frac{7}{4}\right)^2 + \frac{121}{16} \\ \text{이므로 } k = \frac{121}{16} \\ \text{therefore } 16k = 121$$

54

[정답] 3

$$x^2 - (a+1)x + a = bx - b \text{에서 } (x-1)(x-a) - b(x-1) = (x-1)(x-a-b) = 0 \\ \text{한 점에서만 만나므로} \\ x = 1 \text{이 중근이어야 하고} \\ a+b = 1, \text{ 즉 } b = 1-a \\ B(a, 0), C(0, a), D(0, a-1) \text{이므로} \\ S_1 = \frac{1}{2} \times 1 \times (a-1) = \frac{a-1}{2} \\ S_2 = (\text{삼각형 OBC}) - (\text{삼각형 OAD}) = \frac{a^2}{2} - \frac{a-1}{2} = \frac{a^2-a+1}{2} \\ S_1:S_2 = 2:7 \text{에서} \\ 7(a-1) = 2(a^2-a+1), 2a^2-9a+9=0, (2a-3)(a-3)=0 \\ a > 2 \text{이므로 } a = 3$$

55

[정답] 16

$$f(x) = p(x-4)(x-a) \ (p > 0) \text{라 하면} \\ C(0, 4pa) \\ \text{두 삼각형 OPB, OPC는 밑변 OP가 같으므로 넓이가 같으려면 두 점 B, C에서 직선 OP까지의 거리가 같아야 한다.} \\ \text{두 점 B, C는 직선 } y = -x \text{에 대하여 같은 쪽에 있으므로 직선 BC는 직선 } y = -x \text{와 평행하다.} \\ \text{직선 BC의 기울기가 } -1 \text{이므로 } C(0, a), 4pa = a \text{ therefore } p = \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4}(x-4)(x-a) = -x, \text{ 즉 } x^2 - ax + 4a = 0 \text{이 중근을 가지므로 } a^2 - 16a = 0 \\ a > 4 \text{이므로 } a = 16$$

56

[정답] 5

$$A(\alpha, -2\alpha-4), B(\beta, -2\beta-4) \text{이고} \\ C(\beta, -2\alpha-4) \text{이므로} \\ \overline{BC} = (-2\alpha-4) - (-2\beta-4) = 2(\beta-\alpha) = 6 \\ \text{therefore } \beta-\alpha = 3 \\ \alpha, \beta \text{는 } ax^2 = -2x-4, \text{ 즉 } ax^2 + 2x + 4 = 0 \text{의 두 근이므로 } \alpha + \beta = -\frac{2}{a}, \alpha\beta = \frac{4}{a} \\ (\beta-\alpha)^2 = (\alpha+\beta)^2 - 4\alpha\beta = \frac{4}{a^2} - \frac{16}{a} = 9 \text{에서 } 9a^2 + 16a - 4 = 0, (9a-2)(a+2) = 0 \\ a < 0 \text{이므로 } a = -2 \text{이고 } \alpha + \beta = 1, \alpha\beta = -2 \\ \text{therefore } \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 1 + 4 = 5$$

[정답] 16

직선 $y = 2x + k$ 와 직선 $y = g(x)$ 는 기울기가 다르므로 항상 한 점에서 만난다. 이 점을 P라 하자.

직선과 곡선 $y = f(x)$ 의 교점의 x 좌표는 $x^2 - 7x = 2x + k$, 즉 $x^2 - 9x - k = 0$ 의 실근이고 판별식은 $D = 81 + 4k$

(i) $D < 0$ 이면 서로 다른 점은 P 하나뿐이다.

(ii) $D = 0$, 즉 $k = -\frac{81}{4}$ 이면 접점의 x 좌표는 $\frac{9}{2}$ 이고, 점 P의 x 좌표는 $2x - \frac{81}{4} = \frac{1}{2}x - \frac{7}{2}$ 에서 $\frac{67}{6}$ 이므로 서로 다른 점은 2개

(iii) $D > 0$ 이면 곡선과 두 점에서 만나므로 서로 다른 점이 2개이려면 점 P가 곡선 위에 있어야 한다. 즉 세 그래프가 한 점에서 만난다.

$f(x) = g(x)$ 에서 $2x^2 - 15x + 7 = 0$, $(2x - 1)(x - 7) = 0$ 이므로 세 그래프가 만나는 점은 $(\frac{1}{2}, -\frac{13}{4})$ 또는 $(7, 0)$

직선이 이 점을 지나면 $k = -\frac{17}{4}$ 또는 $k = -14$ (모두 $D > 0$)

따라서 k 의 값은 $-\frac{81}{4}$, -14 , $-\frac{17}{4}$ 이므로 $M - m = -\frac{17}{4} + \frac{81}{4} = 16$

[정답] -4

$y = h(x)$ 의 그래프는 가운데가 아래로 볼록한 $y = f(x)$, 양쪽이 위로 볼록한 $y = g(x)$ 의 일부이다.

직선 $y = k$ 와 세 점에서 만나는 것은 k 가 $y = f(x)$ 의 꼭짓점의 y 좌표이거나 두 교점 $(\alpha, f(\alpha))$, $(\beta, f(\beta))$ 중 낮은 점의 y 좌표일 때이므로 $b = 1$ 이고 낮은 교점의 y 좌표는 2

$y = 1$ 일 때: $f(x) = 1$ 에서 $x = a$, $g(x) = 1$ 에서 $(x - c)^2 = 6$, $x = c + \sqrt{6}$ 이므로 $S = a + 2c$
 $y = 2$ 일 때: $f(x) = 2$ 에서 $x = a - 1$, $a + 1$, $g(x) = 2$ 에서 $x = c - 2$, $c + 2$ 이고 이 중 하나는 낮은 교점으로 겹친다.

$c + 2 = a + 1$ 이면 $T = (a - 1) + (a + 1) + (c - 2) = 2a + c - 2$ 이고 $S - T = c - a + 2 = 1 = \frac{a}{4}$ 에서 $a = 4$, $c = 3$

$c - 2 = a - 1$ 이면 $T = 2a + c + 2$, $S - T = c - a - 2 = -1 = \frac{a}{4}$ 에서 $a < 0$ 이므로 맞지 않는다.

$f(x) = (x - 4)^2 + 1$, $g(x) = -\frac{1}{2}(x - 3)^2 + 4$ 이고 $f(x) = g(x)$ 에서 $3x^2 - 22x + 35 = 0$, $x = \frac{7}{3}$ 또는 $x = 5$ ($f(5) = 2$ 로 낮은 교점)

$7 > \beta = 5$ 이므로

$h(7) = g(7) = -\frac{1}{2} \times 16 + 4 = -4$

[정답] 13

(나)에서 $f(x) - (2x - 4) = 4(x - p)^2$, $g(x) - (2x - 4) = (x - q)^2$ 이라 하자.

(다)에서 $f(x) - g(x) = 3(x + 2)(x - 2) = 3x^2 - 12$

$4(x - p)^2 - (x - q)^2 = 3x^2 - (8p - 2q)x + 4p^2 - q^2$ 이므로 $8p - 2q = 0$, $4p^2 - q^2 = -12$

$q = 4p$, $-12p^2 = -12$ 이므로 $p = 1$ 또는 $p = -1$

$f(x) = 4(x - p)^2 + 2x - 4$ 의 최솟값은 $x = p - \frac{1}{4}$ 일 때 $2p - \frac{17}{4}$

$g(x) = (x - 4p)^2 + 2x - 4$ 의 최솟값은 $x = 4p - 1$ 일 때 $8p - 5$

(가)에서 $2p - \frac{17}{4} > 8p - 5$, $p < \frac{1}{8}$ 이므로 $p = -1$

$f(2) = 4 \times 9 + 0 = 36$, $g(1) = 25 + 2 - 4 = 23$ therefore $f(2) - g(1) = 13$

[정답] 17

(나)에서 $f(3) = g(3) = 2 \times 3 - 8 = -2$ 이므로

$f(x) - (2x - 8) = a(x - 3)(x - \alpha)$, $g(x) - (2x - 8) = a(x - 3)(x - \beta)$

(가)에서 $g(4) =$

$g(12) = f(0)$ 이므로 $y = g(x)$ 의 그래프의 축은 $x = 8$

$g(x) = ax^2 - a(3 + \beta)x + 3a\beta + 2x - 8$ 의 축에서 $\frac{a(3+\beta)-2}{2a} = 8$, 즉 $a(\beta - 13) = 2$

$g(4) = a(4 - \beta)$, $f(0) = 3a\alpha - 8 = 3a(6 - \beta) - 8$ 이므로 $a(4 - \beta) = 3a(6 - \beta) - 8$, 즉 $a(\beta - 7) = -4$

두 식에서 $6a = -6$,

$a = -1$, $\beta = 11$, $\alpha = -5$

$f(x) = -(x - 3)(x + 5) + 2x - 8 = -x^2 + 7$ 이므로 $x \leq 3$ 에서

$f(x) = f(0)$ 인 x 는 0뿐이고 (가)를 만족시킨다.

$g(x) = -(x - 3)(x - 11) + 2x - 8$

$h(-2) = f(-2) = 3$,

$h(5) = g(5) = 12 + 2 = 14$ therefore

$h(-2) + h(5) = 17$

[정답] 60

(나)에서 $f(x) = px^2$ (p 는 0이 아닌 정수), (가)에서 $g(x) = -px^2 + bx + c$

$f(x) + g(x) = bx + c$
이고 (다)에서 해가 $x = 2$ 뿐이므로 $b \neq 0, c = -2b$

$f(x) - g(x) = 2px^2 - bx + 2b$ 가 (라)에서 $x = 1$ 일 때 최소이므로 $p > 0$ 이고 $\frac{b}{4p} = 1, b = 4p$

$f(x) = px^2 \geq 0,$
 $g(x) = -p(x^2 - 4x + 8) = -p\{(x - 2)^2 + 4\} \leq -4p$

방정식이 실근을 갖지 않으려면 $f(x) = k,$
 $g(x) = k$ 가 모두 실근을 갖지 않아야 하므로
 $-4p < k < 0$

이를 만족시키는 정수 k 는 $4p - 1$ 개이므로 $4p - 1 = 3, p = 1$

$f(17) + g(17) = 4(17 - 2) = 60$