



FICHA TÉCNICA

BPC-157

Body Protection Compound 157, PL 14736, Bepecin

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA FITNESS · BUILD PERFORMANCE

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación de reparación tisular: tendón, ligamento, músculo, mucosa gastrointestinal y anastomosis. Es el compuesto más pedido de la línea y también el que más se malinterpreta.

Fragmento parcial de una proteína protectora del jugo gástrico humano. En modelos animales regula al alza el receptor VEGFR2 y la vía FAK–paxilina, promueve angiogénesis en el sitio de lesión, e interactúa con el sistema óxido nítrico y con la vía dopaminérgica y serotoninérgica. No se ha identificado un receptor propio.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Pentadecapéptido gástrico
Fórmula molecular (referencia)	C62H98N16O22
Peso molecular aprox.	1419.53 Da
CAS	137525-51-0
Secuencia	GEPPPGKPADDAGLV
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 5MG · 10MG · 20MG
Contenido del vial	BPC-157 liofilizado como sal de acetato. Contenido neto de péptido típico 80–90 % de la masa del vial; el resto es contraión, agua residual y manitol si el fabricante usa agente de carga.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Aceleración de la cicatrización de tendón de Aquiles seccionado y de ligamento colateral medial (rata).
- Protección de mucosa gástrica e intestinal frente a AINEs y alcohol (rata, ratón).
- Aceleración de cierre de anastomosis colónica y de fístulas (rata).
- Contrarresta el síndrome de abstinencia y la discinesia inducida por haloperidol (rata).
- Estable en jugo gástrico humano durante más de 24 h in vitro — la base del interés por vía oral.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: –20 °C protegido de la luz, estable años. Reconstituido: 2–8 °C, usar dentro de 20–30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática o agua estéril para inyección. Muy soluble. Dirigir el chorro a la pared del vial, no sobre la torta liofilizada.
- Estabilidad: Notablemente estable para un péptido de 15 residuos: no tiene cisteína, ni metionina, ni puentes disulfuro que oxidar. Los pares Asp-Ala y Asp-Asp son el punto débil (isomerización lenta a pH ácido).
- Manejo: Sin datos de toxicidad aguda publicados. Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: No caracterizada en humano. En rata la vida media plasmática es de minutos; el efecto observado excede con mucho la exposición plasmática, lo que sugiere acción local.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Sin aprobación regulatoria en ninguna jurisdicción.
- Prohibido por la AMA/WADA desde 2022 (clase S0, sustancias no aprobadas).

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

TB-500

Timosina β4 fragmento 17-23 (Ac-LKKTETQ)

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA FITNESS · BUILD PERFORMANCE

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación de migración celular y remodelado de matriz extracelular: tendón, miocardio, córnea y piel.

La región LKKTETQ es el sitio de unión a G-actina de la timosina β4. Secuestra monómeros de actina y modula la polimerización del citoesqueleto, lo que en modelos animales se traduce en mayor migración de células endoteliales y de fibroblastos hacia la herida.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Fragmento peptídico de timosina β4
Fórmula molecular (referencia)	C37H65N9O14
Peso molecular aprox.	872 Da
CAS	885340-08-9 (fragmento acetilado)
Secuencia	Ac-LKKTETQ-OH
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 5MG · 10MG
Contenido del vial	Nomenclatura ambigua en el mercado. Lo que se vende como «TB-500» es casi siempre el heptapéptido acetilado LKKTETQ, no la timosina β4 completa (43 residuos, MW 4963). Los viales PEPTIDEX se surten como el fragmento; el certificado de análisis debe confirmar la masa 872 Da y no 4963 Da.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Timosina β4 completa acelera reparación cardíaca tras infarto y reactiva progenitores epicárdicos (ratón).
- Reduce inflamación y acelera cierre en úlcera corneal (conejo, ensayo humano fase 2 para ojo seco).
- Mejora resistencia a la tracción en tendón lesionado (caballo, rata).
- El fragmento LKKTETQ reproduce parte de la actividad promigratoria in vitro, con potencia menor que la proteína completa.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C. Reconstituido: 2-8 °C, 20-30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Soluble; el heptapéptido más que la proteína completa.
- Estabilidad: Sin cisteína ni metionina. La Thr y la Gln del extremo C son susceptibles de desamidación lenta.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: Fragmento: minutos en plasma. Timosina β4 completa: ~2 h.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Sin aprobación regulatoria.
- Prohibido por la AMA/WADA (S2, factores de crecimiento).
- Verificar en el CoA si el vial contiene fragmento o proteína completa: son compuestos distintos.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

BPC-157 + TB-500

Blend de reparación

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA FITNESS · BUILD PERFORMANCE

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Presentación combinada de los dos compuestos de reparación más solicitados, coliofilizados en un solo vial.

Ver las fichas individuales. No hay datos publicados de sinergia entre ambos; la combinación es una conveniencia de formulación, no un hallazgo farmacológico.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Mezcla liofilizada de dos péptidos
Fórmula molecular (referencia)	Sin registro público
Peso molecular aprox.	Sin registro público
CAS	Sin registro público
Secuencia	GEPPPGKPADDAGLV + Ac-LKKTETQ-OH
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 10MG · 20MG
Contenido del vial	Proporción declarada por lote — típicamente 1:1 en masa. Un vial de 10 MG contiene por tanto ~5 mg de cada componente, no 10 mg de cada uno. Este punto es la causa más frecuente de error de cálculo del cliente y debe leerse en la etiqueta.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- No existe literatura sobre la mezcla como tal. Toda la evidencia disponible corresponde a cada compuesto por separado.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C. Reconstituido: 2-8 °C, 20-30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Ambos componentes son solubles; una sola reconstitución sirve para los dos.
- Estabilidad: Limitada por el componente menos estable de los dos.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: Ver fichas individuales.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Sin aprobación regulatoria.
- Ambos componentes prohibidos por la AMA/WADA.
- El CoA debe reportar pureza y proporción de CADA componente por separado.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

IGF-1 LR3

Long R3 IGF-1, Mecasermina análoga

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA FITNESS · BUILD PERFORMANCE

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación de señalización anabólica e hipertrofia. Es el único producto de la línea que es una proteína recombinante y no un péptido sintético, con todo lo que eso implica en manejo.

Agonista del receptor IGF-1R. Las dos modificaciones respecto al IGF-1 nativo reducen ~100 veces su afinidad por las proteínas transportadoras IGFBP, de modo que la fracción libre y la vida media efectiva aumentan mucho. Activa PI3K–Akt–mTOR y la vía MAPK.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Análogo recombinante de factor de crecimiento (proteína, 83 aa)
Fórmula molecular (referencia)	C400H625N111O115S9
Peso molecular aprox.	9111 Da
CAS	946870-92-4
Secuencia	Análogo de IGF-1 humano: Arg en posición 3 (sustituye Glu) y extensión N-terminal de 13 residuos.
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 0.1MG · 1MG
Contenido del vial	Proteína recombinante expresada en E. coli, liofilizada con agente de carga (típicamente manitol o trehalosa) y a veces ácido acético residual. El contenido neto de proteína puede ser muy inferior a la masa del vial.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Aumento de síntesis proteica y de peso de músculo esquelético (rata, ratón).
- Uso industrial extendido como suplemento de medio de cultivo celular en biomanufactura, por su resistencia a IGFBP.
- IGF-1 nativo (mecasermina) está aprobado por la FDA para deficiencia primaria grave de IGF-1; el análogo LR3 no lo está.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C o -80 °C. Reconstituido: 2–8 °C máximo 14 días, o alicuotado a -20 °C. Evitar ciclos de congelación-descongelación.
- Reconstitución: NO usar agua bacteriostática sola: la proteína precipita a pH neutro. Reconstituir con ácido acético 0.01 N o con el diluyente que indique el CoA, y diluir después. Nunca agitar — agitar una proteína la desnaturaliza en la interfase aire-líquido.
- Estabilidad: Mucho menos robusta que un péptido sintético. Tres puentes disulfuro que se pueden barajar, agregación dependiente de concentración y de agitación.
- Manejo: Factor de crecimiento mitogénico. Manejar con guantes; evitar aerosoles.
- Vida media: ~20–30 h en circulación (frente a ~12–15 h del IGF-1 unido a IGFBP-3 y minutos del IGF-1 libre).

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Sin aprobación regulatoria en esta forma análoga.
- Prohibido por la AMA/WADA (S2).
- Requiere cadena de frío real. Es el producto del catálogo con mayor riesgo de llegar inactivo.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

IPAMORELIN

NNC 26-0161

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA FITNESS · BUILD PERFORMANCE

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación de liberación pulsátil de hormona de crecimiento con mínima señal colateral. Es el secretagogo más selectivo del catálogo.

Agonista selectivo del GHS-R1a en hipófisis e hipotálamo. A diferencia de GHRP-2 y GHRP-6, no eleva de forma apreciable ACTH, cortisol ni prolactina en el rango de dosis estudiado — ésa es toda su razón de ser.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Secretagogo de GH — agonista del receptor de grelina (GHS-R1a)
Fórmula molecular (referencia)	C38H49N9O5
Peso molecular aprox.	711.85 Da
CAS	170851-70-4
Secuencia	Aib-His-D-2-Nal-D-Phe-Lys-NH2
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 5MG · 10MG
Contenido del vial	Pentapéptido sintético liofilizado, sal de acetato. Contiene tres residuos no proteinogénicos (Aib, D-2-naftilalanina, D-fenilalanina) que son los que le dan resistencia a proteasas.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Liberación de GH dependiente de dosis sin elevación de ACTH ni cortisol (rata, cerdo, humano fase 1).
- Ausencia del efecto orexigénico marcado que caracteriza a GHRP-6.
- Desarrollo clínico interrumpido en fase 2 para íleo postoperatorio, no por seguridad sino por resultado insuficiente.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C. Reconstituido: 2-8 °C, 20-30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Muy soluble.
- Estabilidad: Buena. Sin cisteína ni metionina; la amidación C-terminal bloquea la exopeptidasa.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: ~2 h.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Sin aprobación regulatoria.
- Prohibido por la AMA/WADA (S2).

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

CJC-1295 (DAC)

CJC-1295 con Drug Affinity Complex, DAC:GRF

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA FITNESS · BUILD PERFORMANCE

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación de elevación sostenida de GH e IGF-1 durante días, en lugar de pulsos.

Agonista del receptor de GHRH. Las cuatro sustituciones bloquean la degradación por DPP-4 y la isomerización de Asp; el grupo maleimida del DAC forma un enlace covalente con la Cys34 de la albúmina sérica al inyectarse, lo que arrastra la vida media de minutos a días.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Análogo de GHRH con conjugación a albúmina
Fórmula molecular (referencia)	C165H269N47O46
Peso molecular aprox.	3647.15 Da
CAS	863288-34-0
Secuencia	YaDAIFTQSYRKVLAQLSARKLLQDILSR-NH2 con linker maleimidopropionil en el extremo C (a = D-Ala)
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 5MG · 10MG
Contenido del vial	Análogo de GHRH(1-29) con cuatro sustituciones (D-Ala2, Gln8, Ala15, Leu27) más el linker DAC. Liofilizado como sal de acetato.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Elevación sostenida de GH (2–10×) e IGF-1 (1.5–3×) durante hasta 6 días tras dosis única (humano, fase 1).
- Efecto acumulativo con dosis semanales múltiples (humano, fase 1).
- El desarrollo se detuvo tras una muerte en un ensayo con un compuesto relacionado de la misma compañía; la relación causal nunca se estableció públicamente.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: –20 °C. Reconstituido: 2–8 °C, hasta 30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Soluble.
- Estabilidad: Buena en liofilizado. El grupo maleimida es hidrolizable: una vez en solución pierde capacidad de conjugación con el tiempo, aunque el péptido siga íntegro. Es un caso donde HPLC puede decir «puro» y el producto ya no funcionar como DAC.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: ~6–8 días.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Sin aprobación regulatoria.
- Prohibido por la AMA/WADA (S2).
- Confusión de mercado constante: mucho producto etiquetado «CJC-1295» es en realidad la versión SIN DAC (Modified GRF 1-29). Verificar masa 3647 Da en el CoA.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

CJC-1295 (NO DAC)

Modified GRF (1-29), Mod-GRF 1-29, Sermorelin tetrasustituido

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA FITNESS · BUILD PERFORMANCE

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación de pulsos de GH con perfil fisiológico, habitualmente en co-administración con un agonista de grelina.

Agonista del receptor de GHRH. Sin DAC no hay unión a albúmina, de modo que la acción es un pulso de ~30 minutos que imita la secreción endógena en lugar de sostenerla.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Análogo de GHRH sin conjugación
Fórmula molecular (referencia)	C152H252N44O42
Peso molecular aprox.	3367.9 Da
CAS	863288-34-0 (mismo esqueleto peptídico)
Secuencia	YaDAIFTQSYRKVLAQLSARKLLQDILSR-NH2 (α = D-Ala), sin linker DAC
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 5MG · 10MG
Contenido del vial	Mismas cuatro sustituciones que la versión DAC, sin el linker. Liofilizado como sal de acetato.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Pico de GH a los 15–30 min y retorno a basal antes de 2 h (humano).
- Efecto sinérgico documentado al combinarlo con un agonista de GHS-R1a: las dos vías son independientes y se potencian.
- Sermorelin (GHRH 1-29 sin modificar) sí tuvo aprobación FDA, retirada del mercado en 2008 por motivos comerciales.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: –20 °C. Reconstituido: 2–8 °C, 20–30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Soluble.
- Estabilidad: Buena. Más estable que sermorelin nativo, que es precisamente lo que buscaban las sustituciones.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: ~30 min.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Sin aprobación regulatoria.
- Prohibido por la AMA/WADA (S2).
- Distinguir de la versión DAC: masa 3368 Da frente a 3647 Da.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

CJC-1295 + IPAMORELIN

Blend GHRH + GHS

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA FITNESS · BUILD PERFORMANCE

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

La combinación con más fundamento farmacológico del catálogo: dos receptores distintos que convergen sobre la misma célula somatótropa.

El análogo de GHRH aumenta la amplitud del pulso; el agonista de grelina aumenta la frecuencia y suprime somatostatina. Al actuar sobre receptores independientes, el efecto combinado supera la suma de los aislados — esto sí está documentado, a diferencia de la mezcla BPC+TB.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Mezcla liofilizada de análogo de GHRH y secretagogo
Fórmula molecular (referencia)	Sin registro público
Peso molecular aprox.	Sin registro público
CAS	Sin registro público
Secuencia	Mod-GRF(1-29) + Aib-His-D-2-Nal-D-Phe-Lys-NH2
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 10MG
Contenido del vial	Proporción declarada por lote, habitualmente 1:1 en masa. Un vial de 10 MG lleva ~5 mg de cada uno. Verificar en etiqueta antes de calcular.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Sinergia GHRH + GHRP demostrada de forma reproducible en humano desde los años noventa (prueba combinada GHRH-arginina y GHRH-GHRP como test diagnóstico de reserva hipofisaria).
- La combinación específica CJC/Ipamorelin no tiene ensayos propios publicados.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C. Reconstituido: 2-8 °C, 20-30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Ambos solubles.
- Estabilidad: Buena para ambos componentes.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: ~30 min (GHRH) y ~2 h (Ipamorelin).

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Sin aprobación regulatoria.
- Ambos componentes prohibidos por la AMA/WADA (S2).
- El CoA debe reportar pureza y proporción de cada componente.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA
SERMORELIN

GHRH (1-29), GRF (1-29), Geref

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA FITNESS · BUILD PERFORMANCE

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación del eje somatotropo. Es la secuencia nativa, sin modificar — el punto de comparación frente al cual se diseñaron CJC-1295 y tesamorelina.

Agonista del receptor de GHRH en hipófisis anterior. Conserva la actividad completa del GHRH de 44 residuos: los 15 residuos restantes no aportan potencia.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Fragmento activo de GHRH humano
Fórmula molecular (referencia)	C149H246N44O42S
Peso molecular aprox.	3357.9 Da
CAS	86168-78-7
Secuencia	YDAIFTNSYRKVLGQLSARKLLQDIMSR-NH2
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 5MG · 10MG
Contenido del vial	Los 29 primeros residuos del GHRH humano de 44 residuos, amidados en C. Liofilizado, habitualmente con manitol.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Aprobado por la FDA (Geref) como prueba diagnóstica de reserva de GH y para deficiencia de GH pediátrica. Retirado del mercado estadounidense en 2008 por decisión comercial del fabricante, no por seguridad — un dato que conviene tener claro.
- Perfil de seguridad humano bien caracterizado, cosa que casi ningún compuesto de esta lista puede decir.
- Preserva la retroalimentación por somatostatina, de modo que no anula el eje.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: 2–8 °C aceptable, –20 °C preferible. Reconstituido: 2–8 °C, usar en 14 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática o agua estéril. Soluble.
- Estabilidad: La Met27 es oxidable y la Asn8 desamida. Menos robusto que sus análogos modificados.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: ~11–12 min. Sustrato de DPP-4, que es exactamente lo que corrigieron las sustituciones del Mod-GRF.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Producto histórico aprobado; la presentación actual como material de investigación no lo está.
- Prohibido por la AMA/WADA (S2).

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA
TESAMORELIN

TH9507, Egrifta

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA FITNESS · BUILD PERFORMANCE

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

El único compuesto de la línea FITNESS con aprobación FDA vigente para una indicación de composición corporal.

Agonista del receptor de GHRH. El grupo hexenoil en el N-terminal bloquea el corte por DPP-4 sin alterar la unión al receptor, lo que multiplica la vida media respecto a sermorelin.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Análogo estabilizado de GHRH (1-44)
Fórmula molecular (referencia)	C221H366N72O67S
Peso molecular aprox.	5135.9 Da
CAS	218949-48-5
Secuencia	GHRH(1-44) humano con grupo trans-3-hexenoil en el N-terminal
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 5MG · 10MG · 20MG
Contenido del vial	GHRH humano completo de 44 residuos, N-acilado. Liofilizado con manitol.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Reducción de 15–18 % de tejido adiposo visceral frente a placebo en dos ensayos fase 3 en lipodistrofia asociada a VIH (humano, n>800). Aprobado por la FDA en 2010 como Egrifta.
- Reducción de triglicéridos y mejora del perfil lipídico en la misma población.
- Señal de mejora cognitiva en adultos mayores con deterioro leve (ensayo pequeño).
- El efecto sobre grasa visceral es selectivo: no reduce grasa subcutánea de forma comparable.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: –20 °C (la presentación comercial admite 2–8 °C). Reconstituido: usar de inmediato en formato clínico; 2–8 °C hasta 14 días en investigación.
- Reconstitución: Agua estéril para inyección. Egrifta comercial se reconstituye con un diluyente específico. Soluble.
- Estabilidad: Buena en liofilizado. Contiene Met y Asn susceptibles; la formulación con manitol es parte de la estabilización.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: ~26–38 min tras administración subcutánea.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Existe una versión aprobada por FDA (Egrifta) para lipodistrofia por VIH; el material de investigación NO es ese producto.
- Prohibido por la AMA/WADA (S2).

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

GHRP-2

Pralmorelin, KP-102

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA FITNESS · BUILD PERFORMANCE

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación de liberación de GH con potencia alta. Aprobado en Japón como agente diagnóstico.

Agonista de GHS-R1a. Más potente que ipamorelin sobre GH, pero mucho menos selectivo: eleva de forma medible prolactina, ACTH y cortisol.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Secretagogo de GH — agonista de GHS-R1a
Fórmula molecular (referencia)	C45H55N9O6
Peso molecular aprox.	817.96 Da
CAS	158861-67-7
Secuencia	D-Ala-D-2-Nal-Ala-Trp-D-Phe-Lys-NH2
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 5MG · 10MG
Contenido del vial	Hexapéptido sintético liofilizado, sal de acetato.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Aprobado en Japón (GHRP Kaken 100) como prueba diagnóstica de deficiencia de GH en adultos.
- Elevación de GH superior a GHRP-6 a dosis equimolares (humano).
- Aumento de apetito menor que GHRP-6 pero presente.
- Elevación de cortisol y prolactina de ~15–20 % sobre basal a dosis altas (humano).

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: –20 °C. Reconstituido: 2–8 °C, 20–30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Soluble.
- Estabilidad: Buena. El Trp es fotosensible: proteger de la luz es una instrucción real, no decorativa.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: ~30 min.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Aprobado sólo en Japón y sólo como diagnóstico.
- Prohibido por la AMA/WADA (S2).

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

GHRP-6

SKF-110679, Growth Hormone Releasing Hexapeptide

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA FITNESS · BUILD PERFORMANCE

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

El secretagogo original. Investigación de GH y, sobre todo, del efecto orexigénico de la vía grelina.

Agonista de GHS-R1a. Fue el compuesto cuyo estudio llevó al descubrimiento del receptor de grelina y después de la propia grelina — es decir, el fármaco precedió al ligando natural.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Secretagogo de GH — agonista de GHS-R1a
Fórmula molecular (referencia)	C46H56N12O6
Peso molecular aprox.	873.02 Da
CAS	87616-84-0
Secuencia	His-D-Trp-Ala-Trp-D-Phe-Lys-NH2
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 5MG · 10MG
Contenido del vial	Hexapéptido sintético liofilizado, sal de acetato.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Aumento marcado y reproducible del apetito (humano, rata): el más pronunciado de la clase.
- Liberación de GH dependiente de dosis (humano).
- Elevación de cortisol y prolactina, mayor que ipamorelin.
- Efectos citoprotectores cardíacos independientes de GH descritos en modelos de isquemia (rata).

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: −20 °C. Reconstituido: 2–8 °C, 20–30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Soluble.
- Estabilidad: Dos residuos de triptófano: es el péptido más fotosensible de la línea FITNESS. Vial ámbar o protección de luz obligatoria.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: ~15–20 min.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Sin aprobación regulatoria.
- Prohibido por la AMA/WADA (S2).

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA
HEXARELIN

Examorelin, EP-23905

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA FITNESS · BUILD PERFORMANCE

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación de GH y de cardioprotección. Es el análogo de GHRP-6 metilado en posición 2.

Agonista de GHS-R1a más potente que GHRP-6, y además ligando de CD36 en tejido cardiovascular — esa segunda vía es la que explica los efectos cardíacos independientes de GH.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Secretagogo de GH — agonista de GHS-R1a y de CD36
Fórmula molecular (referencia)	C47H58N12O6
Peso molecular aprox.	887.04 Da
CAS	140703-51-1
Secuencia	His-D-2-methyl-Trp-Ala-Trp-D-Phe-Lys-NH2
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 2MG · 5MG
Contenido del vial	Hexapéptido sintético liofilizado, sal de acetato.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Efecto cardioprotector en isquemia-reperfusión, presente incluso en animales hipofisectomizados, lo que prueba que no depende de GH (rata).
- Liberación de GH potente pero con desensibilización del receptor documentada tras administración continua (humano): el efecto decae con el uso sostenido.
- Elevación de cortisol y prolactina comparable o superior a GHRP-2.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C. Reconstituido: 2-8 °C, 20-30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Soluble.
- Estabilidad: Dos Trp: fotosensible. Proteger de la luz.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: ~55-70 min.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Sin aprobación regulatoria.
- Prohibido por la AMA/WADA (S2).
- Desensibilización documentada — el único de la clase con esa advertencia explícita en literatura humana.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA
HGH 191AA

Somatropina, hormona de crecimiento humana recombinante, rhGH

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA FITNESS · BUILD PERFORMANCE

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

El producto de referencia del eje. Todo lo demás en esta categoría existe para estimular su liberación endógena en lugar de administrarla.

Agonista del receptor de GH (dimerización de GHR y señalización JAK2-STAT5). Actúa directamente y también de forma indirecta a través de la producción hepática de IGF-1.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Proteína recombinante de 191 aminoácidos
Fórmula molecular (referencia)	C990H1528N262O300S7
Peso molecular aprox.	22124 Da
CAS	12629-01-5
Secuencia	Secuencia idéntica a la somatropina humana hipofisaria, 191 residuos, dos puentes disulfuro (Cys53-Cys165, Cys182-Cys189).
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 10IU · 12IU · 15IU · 24IU · 36IU
Contenido del vial	Proteína recombinante expresada en E. coli, liofilizada con manitol, glicina y fosfato como tampón. Dosificada en Unidades Internacionales: 1 UI ≈ 0.33 mg de proteína. Un vial de 10 UI contiene ~3.3 mg.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Farmacología humana exhaustivamente caracterizada. Aprobada por la FDA para deficiencia de GH pediátrica y adulta, síndrome de Turner, Prader-Willi, talla baja idiopática, síndrome de intestino corto y caquexia por VIH.
- El efecto sobre masa magra es real y dependiente de dosis; el efecto sobre fuerza en adultos sanos es mucho menor de lo que suele suponerse (metaanálisis).
- Efectos adversos dependientes de dosis bien documentados: retención hídrica, artralgia, síndrome del túnel carpiano, resistencia a la insulina.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: 2–8 °C (algunos fabricantes admiten temperatura ambiente hasta la reconstitución). Reconstituido: 2–8 °C estrictamente, 14–21 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática, en chorro dirigido a la pared del vial. NUNCA agitar: la agitación desnaturaliza la proteína en la interfase aire-líquido y no hay forma visual de detectarlo.
- Estabilidad: Sensible a calor, agitación, congelación de la solución y luz. Es la molécula más frágil del catálogo junto con IGF-1 LR3.
- Manejo: Manejar con guantes. La identidad de una somatropina sólo se confirma con masa intacta 22124 Da; la HPLC de fase reversa sola no distingue variantes deamidadas.
- Vida media: ~3–4 h subcutánea; el efecto biológico vía IGF-1 dura mucho más.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Existe versión aprobada por FDA; el material de investigación NO es ese producto.
- Prohibida por la AMA/WADA (S2).
- Sustancia controlada a nivel federal en EE. UU. (21 U.S.C. §333(e)): su distribución para usos no aprobados es delito federal. Es el único artículo del catálogo con esa exposición penal específica.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

RETATRUTIDE

LY3437943

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA FITNESS · BUILD PERFORMANCE

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación metabólica de última generación. Es el compuesto en desarrollo con mayor magnitud de pérdida de peso reportada en fase 2.

Agonismo balanceado en tres receptores: GIPR, GLP-1R y GCGR. Los dos primeros actúan sobre saciedad e insulina; el componente glucagón añade gasto energético, que es lo que separa a este compuesto de los agonistas duales. La lipidación permite dosificación semanal por unión a albúmina.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Triple agonista GIP / GLP-1 / glucagón, lipidado
Fórmula molecular (referencia)	C221H342N46O68
Peso molecular aprox.	4731.33 Da
CAS	2381089-83-2
Secuencia	Esqueleto de GIP de 39 residuos con sustituciones optimizadas y cadena de ácido graso C20 diácido en Lys17.
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 5MG · 10MG · 15MG · 20MG · 30MG · 40MG · 50MG · 60MG
Contenido del vial	Péptido sintético lipidado, liofilizado, sal de acetato. Los viales de masa alta (40–60 MG) requieren especial cuidado en el cálculo de concentración.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Pérdida de peso media de 24.2 % a 48 semanas con la dosis de 12 mg en fase 2 (humano, n=338) — la cifra más alta publicada para un agente farmacológico.
- Reducción de HbA1c comparable a los mejores agonistas duales en diabetes tipo 2 (fase 2).
- Fase 3 (programa TRIUMPH) en curso.
- Efectos adversos gastrointestinales dependientes de dosis y de velocidad de escalada; aumento leve de frecuencia cardíaca.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C. Reconstituido: 2–8 °C, hasta 30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Soluble, pero la lipidación hace que se disuelva más lento que un péptido no acilado: dar tiempo, no agitar.
- Estabilidad: Buena. La cadena grasa favorece autoasociación a concentraciones altas — un aspecto opalescente puede ser micelización reversible y no degradación.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: ~6 días. Compatible con administración semanal.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- NO aprobado en ninguna jurisdicción. En investigación clínica fase 3.
- Producto en investigación activa: la copia sintética no equivale al material de ensayo clínico.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

SEMAGLUTIDE

Ozempic, Wegovy, Rybelsus (marcas del innovador)

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA FITNESS · BUILD PERFORMANCE

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación metabólica. Es el compuesto de referencia contra el que se miden todos los demás de esta categoría.

Agonista del receptor de GLP-1. Aib8 bloquea DPP-4; la lipidación C18 con espaciador AEEA da unión fuerte a albúmina y vida media de una semana. Reduce ingesta por acción central en hipotálamo y tronco, y enlentece el vaciamiento gástrico.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Agonista de GLP-1R, lipidado
Fórmula molecular (referencia)	C187H291N45O59
Peso molecular aprox.	4113.58 Da
CAS	910463-68-2
Secuencia	Análogo de GLP-1(7-37): Aib8, Arg34, y cadena C18 diácido unida vía espaciador AEEA-AEEA a Lys26.
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 5MG · 10MG · 15MG · 20MG · 30MG
Contenido del vial	Péptido sintético lipidado, liofilizado, sal de acetato. El producto de investigación no es equivalente al medicamento de marca, que incluye fosfato disódico, propilenglicol y fenol como formulación.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- STEP 1: pérdida de peso media 14.9 % a 68 semanas (humano, n=1961).
- SELECT: reducción de 20 % en eventos cardiovasculares mayores en pacientes con obesidad y enfermedad cardiovascular sin diabetes (humano, n=17604).
- SUSTAIN: control glucémico superior a otros agonistas de GLP-1 en diabetes tipo 2.
- Efectos adversos gastrointestinales frecuentes; señal de riesgo de tumores de células C en roedor, no confirmada en humano.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C. Reconstituido: 2-8 °C, hasta 30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Disolución lenta por la lipidación; no agitar.
- Estabilidad: Buena. Autoasocia en heptámeros a concentración alta, lo que es normal y reversible.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: ~7 días.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Existe versión aprobada por FDA/EMA; el material de investigación NO es ese producto.
- Contraindicación de etiqueta del innovador: antecedente personal o familiar de carcinoma medular de tiroides o MEN2.
- Producto bajo patente vigente del innovador en la mayoría de jurisdicciones.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

TIRZEPATIDE

Mounjaro, Zepbound (marcas del innovador), LY3298176

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA FITNESS · BUILD PERFORMANCE

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación metabólica. El primer doble agonista incretínico que llegó al mercado.

Agonismo dual GIPR/GLP-1R con sesgo hacia GIP. La adición del brazo GIP mejora la tolerabilidad gastrointestinal relativa y añade efecto sobre lipólisis y sensibilidad a insulina en adipocito.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Doble agonista GIP / GLP-1, lipidado
Fórmula molecular (referencia)	C225H348N48O68
Peso molecular aprox.	4813.45 Da
CAS	2023788-19-2
Secuencia	Esqueleto de GIP de 39 residuos con Aib2 y Aib13, amidado en C, y cadena C20 diácido vía doble AEEA en Lys20.
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 5MG · 10MG · 15MG · 20MG · 30MG · 40MG · 50MG · 60MG
Contenido del vial	Péptido sintético lipidado, liofilizado, sal de acetato.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- SURMOUNT-1: pérdida de peso media 20.9 % a 72 semanas con 15 mg (humano, n=2539).
- SURPASS-2: superioridad frente a semaglutida 1 mg en HbA1c y en peso (humano).
- SURMOUNT-OSA: aprobado por FDA en 2024 para apnea obstructiva del sueño en obesidad.
- Perfil de efectos adversos gastrointestinales similar al de los agonistas de GLP-1.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C. Reconstituido: 2-8 °C, hasta 30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Disolución lenta; no agitar.
- Estabilidad: Buena.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: ~5 días.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Existe versión aprobada por FDA/EMA; el material de investigación NO es ese producto.
- Misma advertencia de carcinoma medular de tiroides que semaglutida.
- Producto bajo patente vigente del innovador.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

MAZDUTIDE

IBI362, LY3305677, OXM-3

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA FITNESS · BUILD PERFORMANCE

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación metabólica. Es la vía oxintomodulina, distinta del esqueleto GIP de retatrutida y tirzepatida.

Agonismo dual GLP-1R/GCGR derivado de la oxintomodulina nativa. El componente glucagón aporta gasto energético y efecto hepático sobre esteatosis; el componente GLP-1 aporta saciedad y control glucémico.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Doble agonista GLP-1 / glucagón, análogo de oxintomodulina
Fórmula molecular (referencia)	C210H322N46O67
Peso molecular aprox.	4563.1 Da
CAS	2259884-03-0
Secuencia	Análogo lipidado de oxintomodulina de 39 residuos.
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 5MG · 10MG
Contenido del vial	Péptido sintético lipidado, liofilizado, sal de acetato.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Pérdida de peso de hasta 15.4 % a 48 semanas con 9 mg en población china (fase 2, GLORY-1 y estudios previos).
- Reducción marcada de grasa hepática, atribuida al brazo glucagón (fase 2).
- Aprobado en China en 2025 para control de peso; sin aprobación en EE. UU. ni UE.
- Base de evidencia predominantemente en población asiática, lo que limita la extrapolación.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C. Reconstituido: 2-8 °C, hasta 30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Disolución lenta; no agitar.
- Estabilidad: Buena.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: ~7-8 días.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Aprobado únicamente en China. Sin aprobación FDA/EMA.
- Producto en investigación activa fuera de China.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA
CAGRILINTIDE

AM833, NNC0174-0833

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA FITNESS · BUILD PERFORMANCE

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación de saciedad por una vía distinta a las incretinas. Rara vez se estudia solo; su interés está en la combinación.

Agonista dual del receptor de amilina (AMY) y del receptor de calcitonina (CTR). La amilina es la hormona cosecretada con insulina por la célula beta; señala saciedad en área postrema y enlentece el vaciamiento gástrico por una vía independiente de GLP-1. Ésa independencia es la razón de que combine bien.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Análogo de amilina de acción prolongada
Fórmula molecular (referencia)	C194H312N54O59S2
Peso molecular aprox.	4409 Da
CAS	1415456-99-3
Secuencia	Análogo de amilina humana de 37 residuos con puente disulfuro Cys2-Cys7 y cadena grasa C20.
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 5MG · 10MG
Contenido del vial	Péptido sintético lipidado con un puente disulfuro intramolecular, liofilizado, sal de acetato.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Pérdida de peso de 10.8 % a 26 semanas en monoterapia con 4.5 mg (fase 2, humano).
- Semivida de eliminación de 159–195 h, compatible con dosificación semanal.
- El grueso del desarrollo es como componente de CagriSema.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C. Reconstituido: 2–8 °C, hasta 30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Disolución lenta.
- Estabilidad: El puente disulfuro Cys2-Cys7 puede barajarse en condiciones reductoras o a pH alcalino. Evitar agentes reductores y pH>8.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: ~7–8 días (159–195 h).

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- NO aprobado en ninguna jurisdicción. En desarrollo clínico.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

CAGRI + SEMA

CagriSema

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA FITNESS · BUILD PERFORMANCE

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

La combinación metabólica con más respaldo de ensayo del catálogo. Dos vías de saciedad independientes en un solo vial.

Amilina y GLP-1 señalizan saciedad por circuitos distintos que convergen en hipotálamo y tronco encefálico. La combinación produce mayor reducción de ingesta que cualquiera de los dos por separado.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Mezcla de análogo de amilina y agonista de GLP-1
Fórmula molecular (referencia)	Sin registro público
Peso molecular aprox.	Sin registro público
CAS	Sin registro público
Secuencia	Cagrilintide + Semaglutida
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 5MG · 10MG
Contenido del vial	Proporción declarada por lote; el innovador desarrolla la combinación en relación 1:1 en masa. Un vial de 10 MG contiene ~5 mg de cada componente. Verificar en etiqueta.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- REDEFINE-1: pérdida de peso media 22.7 % a 68 semanas (humano, n=3417), por encima de cada componente en monoterapia.
- REDEFINE-2 en diabetes tipo 2 con magnitud menor, como es habitual en esa población.
- El resultado quedó por debajo de las expectativas del mercado pese a ser clínicamente sustancial.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C. Reconstituido: 2-8 °C, hasta 30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Disolución lenta; no agitar.
- Estabilidad: Limitada por cagrilintida (puente disulfuro).
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: ~7 días ambos componentes.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- NO aprobado. En desarrollo clínico.
- El CoA debe reportar pureza y proporción de cada componente por separado.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

AOD-9604

hGH fragmento 176-191, Tyr-hGH(177-191)

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA FITNESS · BUILD PERFORMANCE

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación de lipólisis sin las acciones metabólicas de la GH completa.

Reproduce la actividad lipolítica del extremo C-terminal de la GH sin el dominio de unión al receptor de GH: no eleva IGF-1 ni afecta la sensibilidad a la insulina. En adipocito estimula lipólisis e inhibe lipogénesis por una vía β3-adrenérgica en roedor.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Fragmento C-terminal modificado de hormona de crecimiento
Fórmula molecular (referencia)	C78H123N23O23S2
Peso molecular aprox.	1815.1 Da
CAS	221231-10-3
Secuencia	Tyr-LRIVQCRSVEGSCGF (residuos 177-191 de hGH con Tyr añadida en N), puente disulfuro Cys182-Cys189.
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 5MG · 10MG
Contenido del vial	Péptido sintético con un puente disulfuro, liofilizado, sal de acetato.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Reducción de masa grasa en modelos de obesidad genética y dietética (ratón ob/ob).
- Ensayos clínicos fase 2 en obesidad humana: NO alcanzaron el objetivo primario de pérdida de peso. Éste es el dato central de la ficha y suele omitirse en la literatura comercial.
- Señal de condroprotección en osteoartritis explorada posteriormente.
- Estatus de GRAS negado por la FDA como ingrediente alimentario en 2015.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C. Reconstituido: 2-8 °C, 20-30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Soluble.
- Estabilidad: El puente disulfuro puede reducirse o barajarse. Evitar agentes reductores.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: ~30 min.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Sin aprobación regulatoria. Falló su objetivo primario en fase 2 humana.
- Prohibido por la AMA/WADA (S2).

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA
ADIPOTIDE

FTPP, Prohibitin-targeting peptide 1, CKGGRAKDC-GG-D(KLAKLAK)2

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA FITNESS · BUILD PERFORMANCE

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación de ablación selectiva de vasculatura adiposa. Es, con diferencia, el compuesto de mecanismo más agresivo del catálogo.

El motivo CKGGRAKDC se une a prohibitina expresada en el endotelio de la vasculatura de tejido adiposo blanco. Una vez internalizado, el dominio D(KLAKLAK)2 —un péptido anfipático de D-aminoácidos— rompe la membrana mitocondrial y dispara apoptosis. El resultado es destrucción del aporte vascular al adipocito, no lipólisis.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Péptido proapoptótico dirigido a vasculatura de tejido adiposo
Fórmula molecular (referencia)	C152H252N44O42
Peso molecular aprox.	2611.41 Da
CAS	Sin registro público
Secuencia	CKGGRAKDC-GG-D(KLAKLAK)2, cíclico por puente disulfuro en el motivo de direccionamiento.
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 5MG · 10MG
Contenido del vial	Péptido quimérico sintético con puente disulfuro, liofilizado. Dos dominios: uno de direccionamiento y uno citotóxico.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Reducción de peso de ~30 % con restauración de sensibilidad a insulina en primate obeso (macaco Rhesus), el estudio que lo hizo famoso.
- Nefrotoxicidad dependiente de dosis observada en el mismo estudio de primate: cambios degenerativos en túbulo renal, reversibles al suspender.
- El desarrollo clínico no avanzó. No existen datos de fase 2 ni de seguridad a largo plazo en humano.
- El mecanismo no discrimina entre vasculatura adiposa y otros lechos que expresen prohibitina.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C. Reconstituido: 2-8 °C, uso a corto plazo.
- Reconstitución: Agua bacteriostática o solución salina estéril. Soluble.
- Estabilidad: Puente disulfuro sensible a reducción — y su apertura destruye el direccionamiento sin destruir el dominio citotóxico, que es el peor escenario posible.
- Manejo: Péptido citotóxico. Manejar con guantes y protección ocular; evitar cualquier aerosol. Desechar como residuo químico.
- Vida media: Corta, del orden de minutos a una hora.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Sin aprobación regulatoria. Sin datos de seguridad en humano.
- Nefrotoxicidad documentada en primate.
- Mecanismo citotóxico intrínseco: el dominio KLAKLAK mata cualquier célula en la que entre.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

5-AMINO-1MQ

5-amino-1-metilquinolinio

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA FITNESS · BUILD PERFORMANCE

① DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación del metabolismo del adipocito por la vía NNMT/NAD⁺. Se incluye en la línea FITNESS pese a no ser un péptido.

Inhibidor competitivo de la nicotinamida N-metiltransferasa, la enzima citosólica que metila nicotinamida a 1-metilnicotinamida consumiendo SAM. Su inhibición aumenta el pool de nicotinamida disponible para resíntesis de NAD⁺ y desplaza el metabolismo del adipocito hacia mayor gasto.

② COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Molécula pequeña — inhibidor de NNMT (no es un péptido)
Fórmula molecular (referencia)	C ₁₀ H ₁₁ N ₂ ⁺ (catión); C ₁₀ H ₁₁ N ₂ como yoduro
Peso molecular aprox.	159.21 Da
CAS	42464-96-0 (sal de yoduro)
Secuencia	No aplica. Es un catión quinolinio de molécula pequeña.
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 5MG · 10MG · 50MG
Contenido del vial	Sal de yoduro o de cloruro del catión quinolinio, en polvo. Peso molecular de la sal (286.11 para el yoduro) frente al del catión (159.21): confirmar cuál reporta el CoA antes de calcular concentración.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

③ APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Reducción de masa grasa y de tamaño de adipocito sin cambio en la ingesta (ratón con dieta alta en grasa).
- Promoción de diferenciación de mioblastos y de regeneración muscular in vitro.
- NO existen ensayos clínicos publicados en humano. Toda la evidencia es preclínica.
- La inhibición de NNMT tiene implicaciones oncológicas ambivalentes: NNMT está sobreexpresada en varios tumores, pero también participa en homeostasis normal.

④ DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

⑤ RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Polvo: -20 °C protegido de la luz. Solución: preparar fresca o alicuotar a -20 °C.
- Reconstitución: Soluble en agua y en DMSO. Como molécula pequeña, no requiere las precauciones de un péptido.
- Estabilidad: Buena como sólido. El anillo quinolinio es fotosensible.
- Manejo: Molécula pequeña de toxicidad no caracterizada. Manejar con guantes; evitar inhalación del polvo.
- Vida media: No caracterizada en humano.

⑥ EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Sin aprobación regulatoria. Sin datos en humano.
- No es un péptido: los métodos analíticos de la línea (HPLC de péptidos, LC-MS de masa intacta) requieren adaptación.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

AICAR

Acadesina, AICA ribonucleótido, 5-aminoimidazol-4-carboxamida ribósido

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA FITNESS · BUILD PERFORMANCE

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación del metabolismo energético y de la biogénesis mitocondrial vía AMPK.

Se fosforila intracelularmente a ZMP, que mimetiza el AMP y activa alostéricamente la AMP-quinasa. La AMPK activada aumenta captación de glucosa, oxidación de ácidos grasos y biogénesis mitocondrial, y frena las vías anabólicas.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Molécula pequeña — activador de AMPK (no es un péptido)
Fórmula molecular (referencia)	C9H14N4O5
Peso molecular aprox.	258.23 Da
CAS	2627-69-2
Secuencia	No aplica. Es un nucleósido.
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 50MG · 100MG
Contenido del vial	Nucleósido sintético en polvo. Las presentaciones son de masa alta (50–100 MG) porque su potencia molar es baja comparada con los péptidos del catálogo.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- El famoso «ejercicio en una píldora»: aumento de resistencia de ~44 % en ratón sedentario (Narkar et al., Cell 2008).
- Ensayos clínicos humanos en cardioprotección durante cirugía de bypass: resultados mixtos, sin aprobación.
- Investigado en leucemia linfocítica crónica por su efecto proapoptótico.
- La traducción de los resultados de roedor a humano ha sido pobre; las dosis efectivas en ratón son muy altas en términos de masa.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Polvo: -20 °C. Solución: 2–8 °C corto plazo.
- Reconstitución: Soluble en agua. No requiere precauciones de péptido.
- Estabilidad: Buena como sólido.
- Manejo: Manejar con guantes; evitar inhalación del polvo.
- Vida media: Corta; se elimina rápido y requiere exposición sostenida para efecto.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Sin aprobación regulatoria.
- Prohibido por la AMA/WADA (S4.4, moduladores metabólicos) — es uno de los compuestos que motivó la creación de esa categoría.
- No es un péptido.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

MOTS-C

Mitochondrial ORF of the 12S rRNA type-c

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA FITNESS · BUILD PERFORMANCE

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación de homeostasis metabólica y de envejecimiento. Es un péptido codificado por el genoma mitocondrial, no por el nuclear — una clase entera descubierta hace poco más de una década.

Se transloca al núcleo bajo estrés metabólico y regula genes de respuesta adaptativa vía ATF1. Activa AMPK y modula la vía de folato-metionina. Es señalización retrógrada de la mitocondria al núcleo.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Péptido derivado de mitocondria (MDP)
Fórmula molecular (referencia)	C101H152N28O22S2
Peso molecular aprox.	2174.6 Da
CAS	1627580-64-6
Secuencia	MRWQEMGYIFYPRKLR
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 10MG · 20MG · 40MG
Contenido del vial	Hexadecapéptido sintético liofilizado, sal de acetato.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Prevención de obesidad inducida por dieta y de resistencia a insulina (ratón).
- Mejora de capacidad de ejercicio en ratón envejecido.
- Los niveles circulantes en humano descienden con la edad y correlacionan con sensibilidad a insulina (estudios observacionales).
- Un polimorfismo de MOTS-c (K14Q) se asocia a longevidad en población japonesa.
- Sin ensayos clínicos de intervención publicados.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C. Reconstituido: 2-8 °C, 20-30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Soluble.
- Estabilidad: Contiene dos metioninas (posiciones 1 y 6): es el péptido más oxidable de la línea. La oxidación a metionina-sulfóxido añade +16 Da por residuo y se ve en LC-MS. Proteger de aire y de metales traza.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: Corta en plasma; el efecto documentado es transcripcional y persiste más.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Sin aprobación regulatoria. Sin datos de intervención en humano.
- Prohibido por la AMA/WADA (S4.4).

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

SS-31

Elamipretida, MTP-131, Bendavia

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA FITNESS · BUILD PERFORMANCE

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación de disfunción mitocondrial. Es el compuesto de esta categoría con desarrollo clínico humano más avanzado.

Su alternancia de residuos aromáticos y catiónicos le permite atravesar membranas y concentrarse en la membrana mitocondrial interna, donde se asocia a cardiolipina. Al hacerlo estabiliza la cristae, mejora el acoplamiento de la cadena respiratoria y reduce la producción de especies reactivas de oxígeno. No es un antioxidante que consuma radicales: reduce la fuga que los genera.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Tetrapéptido dirigido a mitocondria
Fórmula molecular (referencia)	C32H49N9O5
Peso molecular aprox.	639.8 Da
CAS	736992-21-5
Secuencia	D-Arg-Dmt-Lys-Phe-NH2 (Dmt = 2,6-dimetiltirosina)
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 10MG · 50MG
Contenido del vial	Tetrapéptido sintético con dos residuos no naturales, liofilizado, sal de acetato. Carga positiva neta, lo que gobierna su comportamiento.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Mejora de función mitocondrial en músculo esquelético humano envejecido (fase 1/2).
- Ensayos fase 3 en miopatía mitocondrial primaria (MMPOWER-3): objetivo primario no alcanzado.
- Aprobación FDA en 2025 para síndrome de Barth bajo la vía acelerada, tras un recorrido regulatorio inusualmente accidentado.
- Explorada en isquemia-reperusión cardíaca y en enfermedad renal (fase 2).

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C. Reconstituido: 2-8 °C, 20-30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Muy soluble por la carga catiónica.
- Estabilidad: Buena. Sin cisteína ni metionina; la Dmt es más resistente a oxidación que la tirosina normal.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: ~2-4 h.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Existe versión aprobada por FDA (síndrome de Barth); el material de investigación NO es ese producto.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

L-CARNITINE

Levocarnitina, ácido 3-hidroxi-4-trimetilamoniobutanoico

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA FITNESS · BUILD PERFORMANCE

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Transporte de ácidos grasos de cadena larga a la matriz mitocondrial. Es un nutriente esencial condicional, no un compuesto experimental.

Sustrato obligado del sistema carnitina-palmitoiltransferasa (CPT-1/CPT-2): sin carnitina, los ácidos grasos de cadena larga no cruzan la membrana mitocondrial interna y no se oxidan.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Aminoácido cuaternario (no es un péptido)
Fórmula molecular (referencia)	C7H15NO3
Peso molecular aprox.	161.2 Da
CAS	541-15-1
Secuencia	No aplica.
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 600MG · 1200MG
Contenido del vial	L-carnitina en polvo o solución. Las presentaciones de 600 y 1200 MG reflejan que la dosis fisiológica es de gramos, no de microgramos.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Levocarnitina inyectable está aprobada por la FDA para deficiencia primaria y secundaria de carnitina.
- En sujetos con carnitina normal, la suplementación no aumenta de forma consistente la oxidación de grasa (metaanálisis).
- La forma D es tóxica y desplaza competitivamente a la L: la estereoquímica del material es un criterio de calidad crítico, no un detalle.
- La carnitina oral se convierte parcialmente en TMAO por microbiota intestinal, con asociación epidemiológica a riesgo cardiovascular.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Polvo: seco y sellado. Muy higroscópico — la ganancia de peso por humedad es la causa más común de error de dosificación.
- Reconstitución: Muy soluble e higroscópica. La forma inyectable se presenta habitualmente ya en solución.
- Estabilidad: Excelente como sólido seco.
- Manejo: Riesgo bajo. Manejar con buenas prácticas de laboratorio.
- Vida media: Variable; depende de reservas tisulares y de función renal.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Existe versión aprobada por FDA (levocarnitina); el material de investigación NO es ese producto.
- Verificar en el CoA la pureza enantiomérica: la D-carnitina es tóxica.
- No es un péptido.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

LIPO-C + B12

MIC-B12, inyección lipotrópica

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA FITNESS · BUILD PERFORMANCE

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Formulación compuesta clásica de farmacia magistral. Es el único artículo del catálogo que se surte en solución (10 ML) y no liofilizado.

Metionina es donante de metilo y precursor de S-adenosilmetionina; colina e inositol participan en el transporte de lípidos y en la síntesis de fosfolípidos; B12 es cofactor de la metionina sintasa. La lógica es sostener las vías de exportación hepática de lípidos.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Mezcla en solución de compuestos lipotrópicos y vitamina B12
Fórmula molecular (referencia)	Sin registro público
Peso molecular aprox.	Sin registro público
CAS	Sin registro público
Secuencia	No aplica. Mezcla, no molécula única.
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 10ML
Contenido del vial	Composición variable por lote — típicamente metionina, inositol, colina (los tres «MIC») y cianocobalamina o metilcobalamina, en vehículo acuoso con conservador (habitualmente alcohol bencílico). La fórmula exacta de cada lote debe leerse en la etiqueta: no hay una definición estándar de «Lipo-C».
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- No existen ensayos clínicos controlados que demuestren pérdida de peso atribuible a inyecciones lipotrópicas.
- La deficiencia de B12 y la de colina son entidades reales con corrección documentada; eso es distinto de la mezcla como agente adelgazante.
- El uso es de práctica magistral, no de evidencia.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: 2–8 °C, protegido de la luz — la cobalamina es marcadamente fotosensible y el color rosa del vial es su indicador visual.
- Reconstitución: No requiere. Se surte en solución lista.
- Estabilidad: Limitada por la cobalamina. Una decoloración del rosa característico indica degradación.
- Manejo: Contiene conservador. Verificar composición del lote antes de usar.
- Vida media: Variable por componente.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Formulación magistral sin estandarización: la composición varía entre lotes y fabricantes.
- Sin evidencia clínica de eficacia para pérdida de peso.
- Al ser solución y no liofilizado, su vida útil es sustancialmente más corta que la del resto del catálogo.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

ADAMAX

Análogo de Semax adamantilado

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA FITNESS · BUILD PERFORMANCE

① DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación de neuroprotección y de BDNF, como análogo estabilizado de Semax.

Análogo de la familia Semax/ACTH(4-10). La adamantilación aumenta lipofilia y resistencia a proteasas, con la intención de mejorar penetración de barrera hematoencefálica y duración. El mecanismo propuesto es el mismo de Semax: modulación de BDNF y de la vía melanocortinérgica.

② COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Péptido nootrópico — análogo de melanocortina/Semax
Fórmula molecular (referencia)	Sin registro público
Peso molecular aprox.	Sin registro público
CAS	Sin registro público
Secuencia	Declarado por proveedores como Ac-MEHFPGPAG-NH2 con modificación adamantilo. Las descripciones comerciales NO son consistentes entre sí.
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 10MG
Contenido del vial	Péptido sintético liofilizado. Ésta es la ficha con menor calidad de información pública del catálogo, y la ficha debe decirlo.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

③ APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- NO existen ensayos clínicos publicados.
- NO existe una entrada de registro CAS pública ni caracterización estructural revisada por pares.
- Toda la información disponible procede de descripciones de proveedores, que difieren entre sí en secuencia y en masa.
- La evidencia de la familia (Semax) no es transferible sin datos propios.

④ DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

⑤ RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C. Reconstituido: 2-8 °C, 20-30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática.
- Estabilidad: Contiene metionina: oxidable. Proteger de aire.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: No caracterizada.

⑥ EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Compuesto pobremente caracterizado: sin CAS, sin literatura revisada por pares, sin consenso de estructura entre proveedores.
- Exigir al proveedor masa intacta por LC-MS y secuenciación: es el único modo de saber qué contiene el vial.
- Sin aprobación regulatoria.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

ARA-290

Cibinetida, péptido de la hélice B de EPO

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA FITNESS · BUILD PERFORMANCE

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación de neuropatía de fibra pequeña e inflamación tisular. Diseñado explícitamente para separar la protección tisular de la EPO de su efecto sobre glóbulos rojos.

Agonista del «receptor de reparación innata», un heterodímero del receptor de EPO con el receptor beta común (CD131). Ese receptor sólo se expresa en tejido lesionado o inflamado, lo que da selectividad por el sitio de daño. No activa el homodímero EPOR responsable de la eritropoyesis: no aumenta el hematocrito.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Péptido derivado de eritropoyetina, no hematopoyético
Fórmula molecular (referencia)	C51H84N16O21
Peso molecular aprox.	1257.3 Da
CAS	1208243-50-8
Secuencia	pyroGlu-EQLERALNSS (pyroglutamato N-terminal)
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 10MG
Contenido del vial	Undecapéptido sintético con pyroglutamato en N, liofilizado, sal de acetato.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Mejora de densidad de fibra nerviosa corneal y de síntomas en neuropatía de fibra pequeña asociada a sarcoidosis (fase 2, humano, n=64).
- Reducción de dolor neuropático en diabetes tipo 2 (fase 2, humano).
- Ausencia confirmada de efecto sobre hemoglobina y hematocrito en los ensayos humanos — el objetivo de diseño se cumplió.
- Sin fase 3 completada; sin aprobación.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C. Reconstituido: 2-8 °C, 20-30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Soluble.
- Estabilidad: Buena. Sin cisteína ni metionina. El pyroglutamato N-terminal ya está ciclado, lo que bloquea la aminopeptidasa.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: ~2 min en plasma. El efecto es muy superior a la exposición, lo que indica señalización mantenida tras la unión.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Sin aprobación regulatoria. Designación de medicamento huérfano en EE. UU. y UE para sarcoidosis.
- No confundir con EPO: no es hematopoyético y no comparte su perfil de riesgo trombótico.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

GHK-CU

Cobre tripéptido-1, glicil-L-histidil-L-lisina cobre(II)

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA BEAUTY · ELEVATE AESTHETICS

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

El compuesto ancla de la línea BEAUTY. Investigación de remodelado dérmico, síntesis de colágeno y cicatrización.

GHK es un fragmento de la cadena alfa-2 del colágeno tipo I, liberado al degradarse la matriz: funciona como señal endógena de «hay daño aquí». Su afinidad por el cobre(II) es tal que lo captura de la albúmina. El complejo estimula síntesis de colágeno, elastina, proteoglicanos y glicosaminoglicanos, modula MMP y TIMP, y el cobre entregado es cofactor de la lisil-oxidasa que entrecruza el colágeno nuevo.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Complejo tripéptido-cobre
Fórmula molecular (referencia)	C14H22CuN6O4
Peso molecular aprox.	401.93 Da
CAS	89030-95-5 (complejo de cobre); 49557-75-7 (GHK libre)
Secuencia	Gly-His-Lys, acomplexado con Cu(II) en relación 1:1
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 50MG · 100MG
Contenido del vial	Complejo azul intenso de tripéptido y cobre(II), liofilizado. El color azul es el propio complejo: un polvo blanco etiquetado GHK-Cu es GHK libre sin cobre, y ése es el modo de fallo más frecuente y más fácil de detectar del catálogo — se ve a simple vista.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Aumento de densidad de colágeno y mejora de firmeza y arrugas en ensayos clínicos dermatológicos (humano, tópico).
- Aceleración de cicatrización en úlcera diabética y en herida quirúrgica (humano, tópico).
- Estimulación de folículo piloso y aumento de tamaño de folículo (humano, tópico).
- Análisis de expresión génica: GHK-Cu modula más de 4000 genes humanos hacia un perfil más juvenil (Pickart et al.).
- Los niveles plasmáticos de GHK descienden de ~200 ng/mL a los 20 años a ~80 ng/mL a los 60.
- La evidencia sólida es TÓPICA. La vía inyectable no tiene ensayos clínicos equivalentes.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C protegido de la luz. Reconstituido: 2-8 °C, 20-30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Muy soluble; la solución debe quedar azul clara. Turbidez o precipitado verde indica disociación del cobre.
- Estabilidad: El complejo se disocia a pH ácido y en presencia de quelantes (EDTA, citrato). No mezclar con vitamina C ni con ácidos: el cobre libre resultante es prooxidante y el tripéptido pierde toda su función.
- Manejo: Complejo de cobre. Evitar contacto prolongado con piel; el cobre libre es irritante.
- Vida media: Corta en plasma. El interés terapéutico es local.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Aprobado como ingrediente cosmético; NO aprobado para uso inyectable.
- Verificar color azul del liofilizado: es la comprobación de identidad más barata que existe.
- Incompatible con quelantes y con ácido ascórbico.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

AHK-CU

Cobre tripéptido-3, alanil-L-histidil-L-lisina cobre(II)

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA BEAUTY · ELEVATE AESTHETICS

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación de folículo piloso y angiogénesis dérmica. Es el análogo de GHK-Cu con la glicina sustituida por alanina.

Análogo estructural de GHK-Cu con perfil desplazado hacia estimulación de VEGF y de proliferación de papila dérmica. La sustitución Gly → Ala añade un metilo que cambia la afinidad relativa por distintos objetivos.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Complejo tripéptido-cobre
Fórmula molecular (referencia)	C15H24CuN6O4
Peso molecular aprox.	415.94 Da
CAS	148579-77-1 (complejo)
Secuencia	Ala-His-Lys, acomplexado con Cu(II)
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 20MG · 50MG
Contenido del vial	Complejo azul de tripéptido y cobre(II), liofilizado. Mismo criterio visual que GHK-Cu: si no es azul, no es el complejo.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Aumento de proliferación de células de papila dérmica y de VEGF in vitro.
- Aumento de longitud de tallo piloso en folículo humano cultivado ex vivo.
- Uso cosmético establecido en formulaciones capilares.
- Base de evidencia sustancialmente menor que la de GHK-Cu; casi toda in vitro.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C protegido de la luz. Reconstituido: 2-8 °C, 20-30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Solución azul clara.
- Estabilidad: Mismas incompatibilidades que GHK-Cu: quelantes, pH ácido, ascorbato.
- Manejo: Complejo de cobre. Evitar contacto prolongado con piel.
- Vida media: Corta.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Aprobado como ingrediente cosmético; NO aprobado para uso inyectable.
- Evidencia mayormente in vitro.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

MATRIXYL

Palmitoil pentapéptido-4, Pal-KTTKS, Matrixyl (Sederma)

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA BEAUTY · ELEVATE AESTHETICS

① DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación de estimulación de matriz extracelular. Es un ingrediente cosmético con historia comercial de veinticinco años, no un compuesto experimental.

KTTKS es un subfragmento del propéptido C-terminal del colágeno tipo I. Al igual que GHK, es una señal de recambio de matriz: su presencia indica al fibroblasto que hay colágeno degradándose y dispara síntesis de colágeno I, III y de fibronectina.

② COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Matriquina lipitada
Fórmula molecular (referencia)	C39H75N9O9
Peso molecular aprox.	802.1 Da
CAS	214047-00-4
Secuencia	Palmitoil-Lys-Thr-Thr-Lys-Ser
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 10MG
Contenido del vial	Pentapéptido con cadena palmítica de 16 carbonos, liofilizado. La cadena grasa es lo que le permite atravesar el estrato córneo — sin ella, KTTKS no penetra.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

③ APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Reducción de rugosidad cutánea y de profundidad de arrugas frente a vehículo en ensayo doble ciego de 12 semanas (humano, tópico).
- Estimulación de colágeno I, III y fibronectina en fibroblasto humano in vitro.
- Lanzado por Sederma en el año 2000; uno de los péptidos cosméticos más estudiados y con más historial de uso.
- Toda la evidencia es tópica. No hay datos de administración sistémica.

④ DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

⑤ RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C. En formulación: según el vehículo.
- Reconstitución: Poco soluble en agua por la cadena palmítica. Requiere codisolvente (propilenglicol, etanol) o formulación en emulsión.
- Estabilidad: Buena. Las dos treoninas y la serina pueden hidrolizar en medio muy alcalino.
- Manejo: Ingrediente cosmético de bajo riesgo.
- Vida media: No aplica en uso tópico.

⑥ EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Ingrediente cosmético. NO existe evidencia ni indicación para uso inyectable.
- La solubilidad acuosa limitada es un dato de formulación, no un defecto del lote.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

GLOW BLEND

Glow 70, GHK-Cu + BPC-157 + TB-500

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA BEAUTY · ELEVATE AESTHETICS

① DESCRIPCIÓN GENERAL

Formulación combinada de estética y reparación. La presentación de 70 MG corresponde a la proporción de mercado habitual: 50 mg de GHK-Cu, 10 mg de BPC-157 y 10 mg de TB-500.

Ver las tres fichas individuales. No hay literatura sobre la mezcla; la combinación es de formulación, no de hallazgo.

② COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Mezcla liofilizada de tres péptidos
Fórmula molecular (referencia)	Sin registro público
Peso molecular aprox.	Sin registro público
CAS	Sin registro público
Secuencia	GHK-Cu + GEPPPGKPADDAGLV + Ac-LKKTETQ-OH
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 70MG
Contenido del vial	Tres péptidos coliofilizados. La proporción declarada debe leerse en la etiqueta del lote — 50/10/10 es lo convencional pero no es un estándar. El polvo debe presentar el azul del complejo de cobre; su ausencia indica que el GHK no lleva cobre.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

③ APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- No existe literatura sobre la mezcla. Toda la evidencia corresponde a cada componente por separado, y en el caso de GHK-Cu es evidencia tópica.

④ DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

⑤ RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C protegido de la luz. Reconstituido: 2-8 °C, 20-30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Los tres son solubles. La solución debe quedar azul.
- Estabilidad: Limitada por el complejo de cobre, que es el componente más frágil químicamente.
- Manejo: Contiene cobre. Evitar quelantes y ácido ascórbico.
- Vida media: Ver fichas individuales.

⑥ EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Sin aprobación regulatoria.
- Dos de los tres componentes están prohibidos por la AMA/WADA.
- El CoA debe reportar pureza y proporción de CADA componente.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA
KLOW BLEND

Klow 80, KPV + GHK-Cu + BPC-157 + TB-500

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA BEAUTY · ELEVATE AESTHETICS

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

GLOW con el componente antiinflamatorio añadido. La presentación de 80 MG corresponde a 50 mg de GHK-Cu más 10 mg de cada uno de los otros tres. Ver las cuatro fichas individuales. KPV aporta la vía antiinflamatoria melanocortínica, que es mecanísticamente independiente de las otras tres.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Mezcla liofilizada de cuatro péptidos
Fórmula molecular (referencia)	Sin registro público
Peso molecular aprox.	Sin registro público
CAS	Sin registro público
Secuencia	KPV + GHK-Cu + GEPPPGKPADDAGLV + Ac-LKKTETQ-OH
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 80MG
Contenido del vial	Cuatro péptidos coliofilizados. Proporción declarada por lote. Mismo criterio de color azul que GLOW.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- No existe literatura sobre la mezcla. Toda la evidencia corresponde a los componentes por separado.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C protegido de la luz. Reconstituido: 2-8 °C, 20-30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Solución azul.
- Estabilidad: Limitada por el complejo de cobre.
- Manejo: Contiene cobre. Evitar quelantes y ácido ascórbico.
- Vida media: Ver fichas individuales.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Sin aprobación regulatoria.
- Componentes prohibidos por la AMA/WADA.
- El CoA debe reportar pureza y proporción de CADA uno de los cuatro componentes.
- Una mezcla de cuatro péptidos es analíticamente exigente: exigir HPLC con resolución de los cuatro picos.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

MELANOTAN I

Afamelanotida, Scenesse, NDP- α -MSH, Melanotan-1

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA BEAUTY · ELEVATE AESTHETICS

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación de fotoprotección por melanogénesis. Es el único de los dos melanotanos que llegó a aprobación.

Agonista del receptor de melanocortina 1 (MC1R) en el melanocito, con selectividad razonable. Estimula la síntesis de eumelanina, el pigmento fotoprotector. Las dos sustituciones respecto al α -MSH nativo lo hacen ~1000 veces más potente y mucho más resistente a proteasas.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Análogo lineal de α -MSH
Fórmula molecular (referencia)	C78H111N21O19
Peso molecular aprox.	1646.85 Da
CAS	75921-69-6
Secuencia	Ac-Ser-Tyr-Ser-Nle-Glu-His-D-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-NH2
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 10MG
Contenido del vial	Tridecapéptido sintético con norleucina en posición 4 y D-fenilalanina en 7, liofilizado, sal de acetato.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Aprobado por la EMA (2014) y la FDA (2019) como Scenesse, implante subcutáneo, para prevención de fototoxicidad en protoporfiria eritropoyética.
- Aumento de densidad de melanina y de tolerancia a exposición lumínica (humano, fase 3).
- Perfil de seguridad razonablemente caracterizado en la población de la indicación.
- El producto aprobado es un implante de liberación lenta, no una inyección diaria.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C protegido de la luz. Reconstituido: 2-8 °C, 20-30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Soluble.
- Estabilidad: Contiene Trp (fotosensible) y His. La norleucina sustituye a la metionina precisamente para eliminar el sitio oxidable — es un diseño más estable que el α -MSH nativo.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: ~1 h como péptido libre; el implante aprobado libera durante ~2 meses.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Existe versión aprobada (Scenesse, implante); el material de investigación NO es ese producto.
- La melanogénesis inducida no sustituye a la vigilancia dermatológica: oscurecer nevos preexistentes puede enmascarar cambios.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

MELANOTAN II

MT-II, PT-141 precursor, Melanotan-2

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA BEAUTY · ELEVATE AESTHETICS

① DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación de melanogénesis. Es el compuesto del que se derivó PT-141, y comparte con él la falta de selectividad de receptor.

Agonista NO selectivo de melanocortinas: activa MC1R (pigmento), MC3R y MC4R (apetito, función sexual, autonómico). Esa promiscuidad explica que produzca a la vez bronceado, erección espontánea, náusea y supresión de apetito — no son efectos secundarios independientes, son el mismo mecanismo actuando donde no se quería.

② COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Análogo cíclico de α -MSH, no selectivo
Fórmula molecular (referencia)	C50H69N15O9
Peso molecular aprox.	1024.18 Da
CAS	121062-08-6
Secuencia	Ac-Nle-cyclo[Asp-His-D-Phe-Arg-Trp-Lys]-NH ₂ (ciclado por lactama Asp-Lys)
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 10MG
Contenido del vial	Heptapéptido cíclico sintético, liofilizado, sal de acetato. La ciclación por puente lactama es lo que le da la rigidez conformacional y la potencia.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

③ APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Melanogénesis dependiente de dosis (humano, estudios pequeños).
- Erección espontánea documentada de forma consistente — el hallazgo que llevó al desarrollo de PT-141.
- Náusea y rubor frecuentes y dependientes de dosis.
- Informes de caso publicados de melanoma y de cambios en nevos displásicos en usuarios; la causalidad no está establecida pero la señal existe.
- Nunca completó desarrollo clínico. Sin aprobación en ninguna jurisdicción.

④ DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

⑤ RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C protegido de la luz. Reconstituido: 2-8 °C, 20-30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Soluble.
- Estabilidad: Buena: la ciclación lo protege de exopeptidasas. El Trp es fotosensible.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: ~1-2 h.

⑥ EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Sin aprobación regulatoria en ninguna jurisdicción.
- Agonista no selectivo: los efectos sobre apetito, presión arterial y función sexual son intrínsecos al mecanismo.
- Informes de caso de melanoma en usuarios. Advertencias sanitarias emitidas por agencias del Reino Unido, Australia y países nórdicos.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

PT-141

Bremelanotida, Vyleesi

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA BEAUTY · ELEVATE AESTHETICS

① DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación de función sexual por vía central. Es el metabolito activo de Melanotan II, desarrollado hasta aprobación.

Agonista de MC3R y MC4R en el sistema nervioso central. Actúa sobre las vías del deseo en hipotálamo, no sobre la vasculatura periférica — es un mecanismo completamente distinto al de los inhibidores de PDE5, y por eso funciona en casos donde aquéllos no.

② COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Agonista de melanocortina MC3R/MC4R
Fórmula molecular (referencia)	C50H68N14O10
Peso molecular aprox.	1025.16 Da
CAS	189691-06-3
Secuencia	Ac-Nle-cyclo[Asp-His-D-Phe-Arg-Trp-Lys]-OH (metabolito desamidado de Melanotan II)
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 10MG
Contenido del vial	Heptapéptido cíclico sintético, liofilizado, sal de acetato. Difiere de MT-II sólo en el extremo C: ácido libre en lugar de amida, lo que reduce la actividad sobre MC1R y por tanto el bronceado.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

③ APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Aprobado por la FDA en 2019 como Vyleesi para trastorno del deseo sexual hipoactivo en mujeres premenopáusicas.
- Ensayos fase 3 RECONNECT: mejora estadísticamente significativa pero de magnitud modesta (humano, n>1200).
- Náusea en ~40 % de las participantes, el efecto adverso limitante.
- Aumento transitorio de presión arterial y descenso de frecuencia cardiaca tras la dosis: contraindicado en hipertensión no controlada y en enfermedad cardiovascular.
- Hiperpigmentación focal con uso repetido, por actividad residual sobre MC1R.

④ DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

⑤ RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C protegido de la luz. Reconstituido: 2-8 °C, 20-30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Soluble.
- Estabilidad: Buena. Trp fotosensible.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: ~2.7 h.

⑥ EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Existe versión aprobada por FDA (Vyleesi); el material de investigación NO es ese producto.
- Contraindicado en hipertensión no controlada y enfermedad cardiovascular (etiqueta del innovador).
- Náusea muy frecuente y dependiente de dosis.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

SNAP-8

Acetil octapéptido-3, acetil octapéptido-1

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA BEAUTY · ELEVATE AESTHETICS

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación de arruga de expresión por inhibición competitiva de la liberación de neurotransmisor. Es un ingrediente cosmético tópico.

Reproduce el extremo N-terminal de SNAP-25, una de las tres proteínas del complejo SNARE que fusiona la vesícula de acetilcolina con la membrana presináptica. Al competir por su posición en el complejo, reduce la eficiencia de la exocitosis y con ella la contracción muscular. Es el mismo blanco que la toxina botulínica pero por un mecanismo competitivo y reversible, no proteolítico — y con una potencia que no admite comparación.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Péptido cosmético mimético de SNAP-25
Fórmula molecular (referencia)	C34H60N14O14
Peso molecular aprox.	889 Da
CAS	868844-74-0
Secuencia	Ac-Glu-Glu-Met-Gln-Arg-Arg-Ala-Asp-NH2
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 10MG
Contenido del vial	Octapéptido sintético acetilado y amidado, liofilizado.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Reducción de profundidad de arruga de ~25–35 % frente a basal en estudios del fabricante (humano, tópico, 28 días).
- La evidencia independiente revisada por pares es escasa; la mayor parte procede del propio proveedor de la materia prima.
- Toda la evidencia es tópica. No hay datos de administración inyectable ni justificación mecánica para ella.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C. En formulación: según vehículo.
- Reconstitución: Soluble en agua y en glicoles. Formulación al 3–10 % es lo habitual en cosmética.
- Estabilidad: Contiene metionina: oxidable. Es la vulnerabilidad principal de la molécula y conviene formularla con antioxidante.
- Manejo: Ingrediente cosmético de bajo riesgo.
- Vida media: No aplica en uso tópico.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Ingrediente cosmético TÓPICO. No existe evidencia ni indicación para uso inyectable.
- Evidencia mayoritariamente del fabricante.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

GLUTATHIONE

GSH, L-glutathión reducido, γ-Glu-Cys-Gly

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA BEAUTY · ELEVATE AESTHETICS

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

El antioxidante intracelular principal del organismo. Investigación de estrés oxidativo, detoxificación hepática y despigmentación.

El tiol de la cisteína es el grupo funcional: dona electrones para neutralizar peróxidos vía glutatión peroxidasa, y conjuga xenobióticos vía glutatión S-transferasa en la fase II hepática. En melanocito inhibe la tirosinasa y desplaza la síntesis de eumelanina a feomelanina, que es el fundamento del uso despigmentante.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Tripéptido tiol endógeno
Fórmula molecular (referencia)	C10H17N3O6S
Peso molecular aprox.	307.32 Da
CAS	70-18-8
Secuencia	γ-Glu-Cys-Gly (el enlace glutámico es gamma, no alfa: por eso las peptidasas normales no lo cortan)
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 600MG · 1500MG
Contenido del vial	Tripéptido en forma reducida (GSH), liofilizado. La distinción entre forma reducida y oxidada (GSSG) es la especificación crítica: sólo la reducida tiene el tiol libre que hace el trabajo. Un CoA que no reporte la relación GSH/GSSG es insuficiente.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Aclaramiento cutáneo medible con administración oral y tópica en ensayos pequeños (humano, población asiática).
- La biodisponibilidad oral del glutatión intacto es baja; buena parte se hidroliza a sus aminoácidos.
- El uso intravenoso para aclaramiento cutáneo carece de ensayos de seguridad adecuados. La FDA de Filipinas emitió una advertencia formal en 2011 tras casos de reacciones graves, incluidos síndrome de Stevens-Johnson y disfunción tiroidea y renal.
- Uso establecido como adyuvante en intoxicación por paracetamol (como precursor, N-acetilcisteína) y en quimioterapia con cisplatino.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C, envase sellado bajo atmósfera inerte si es posible. Reconstituido: 2-8 °C, uso a corto plazo (días, no semanas).
- Reconstitución: Agua bacteriostática o agua estéril. Muy soluble. La solución debe ser incolora; amarilleamiento indica oxidación.
- Estabilidad: Se oxida a GSSG con el oxígeno del aire, y el proceso se acelera con metales traza y con pH alcalino. Es el compuesto del catálogo con la ventana de uso más corta tras reconstituir.
- Manejo: Riesgo bajo. Olor a azufre característico.
- Vida media: Muy corta en plasma (minutos). El pool relevante es intracelular.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Uso intravenoso para aclaramiento cutáneo: sin aprobación y con advertencias sanitarias formales emitidas.
- El CoA debe reportar la relación GSH/GSSG, no sólo pureza cromatográfica.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

KPV

Lisina-prolina-valina, α-MSH(11-13)

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA BEAUTY · ELEVATE AESTHETICS

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación de inflamación intestinal y cutánea. Es el extremo C-terminal del α-MSH, que conserva la actividad antiinflamatoria sin la pigmentaria.

Actúa por vía intracelular más que por receptor de superficie: entra en la célula mediante el transportador de péptidos PepT1 —muy expresado en epitelio intestinal inflamado— e inhibe la translocación nuclear de NF-κB y la activación de NF-κB y AP-1. El resultado es descenso de TNF-α, IL-6 e IL-1β sin activar MC1R, es decir, sin pigmentar.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Tripéptido antiinflamatorio derivado de α-MSH
Fórmula molecular (referencia)	C16H30N4O4
Peso molecular aprox.	342.44 Da
CAS	67727-97-3
Secuencia	Lys-Pro-Val
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 5MG · 10MG
Contenido del vial	Tripéptido sintético liofilizado, sal de acetato. Molécula muy pequeña: 342 Da.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Reducción de gravedad histológica y de citoquinas en colitis inducida por DSS y por TNBS (ratón).
- Actividad antimicrobiana directa frente a Candida albicans y Staphylococcus aureus in vitro.
- Reducción de inflamación en modelos de dermatitis (ratón).
- Sin ensayos clínicos en humano publicados.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C. Reconstituido: 2-8 °C, 20-30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Muy soluble.
- Estabilidad: Muy buena. Sin cisteína, sin metionina, sin residuos lábiles. Es de los péptidos más robustos del catálogo.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: Corta.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Sin aprobación regulatoria. Sin datos en humano.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

OXYTOCIN

Oxitocina, Pitocin, Syntocinon

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA BEAUTY · ELEVATE AESTHETICS

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Hormona endógena del hipotálamo. Investigación de conducta social, vínculo y contracción uterina.

Agonista del receptor de oxitocina, acoplado a Gq. En periferia contrae músculo liso uterino y mioepitelio mamario; en el sistema nervioso central modula circuitos de amígdala relacionados con confianza, reconocimiento social y vínculo. La oxitocina periférica cruza mal la barrera hematoencefálica, lo que explica el uso de la vía intranasal en la investigación conductual.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Nonapéptido cíclico neurohipofisario
Fórmula molecular (referencia)	C43H66N12O12S2
Peso molecular aprox.	1007.19 Da
CAS	50-56-6
Secuencia	Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro-Leu-Gly-NH2, ciclado por puente disulfuro Cys1-Cys6
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 5MG
Contenido del vial	Nonapéptido cíclico sintético, liofilizado. Fue el primer péptido en ser secuenciado y sintetizado químicamente (du Vigneaud, Premio Nobel 1955): es el péptido con la historia analítica más larga del catálogo.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Aprobada por la FDA para inducción del parto y control de hemorragia posparto. Farmacología obstétrica exhaustivamente caracterizada.
- Efectos sobre cognición social en humano (intranasal): la literatura inicial fue optimista y la replicación posterior ha sido irregular. Es un caso de manual de crisis de replicación.
- Ensayos en autismo: resultados negativos en el estudio multicéntrico grande (fase 2, 2021).
- Riesgo real de hiponatremia por actividad antiurética cruzada sobre el receptor de vasopresina a dosis altas.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C. Reconstituido: 2-8 °C, uso a corto plazo.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Soluble.
- Estabilidad: El puente disulfuro se baraja a pH alcalino y en presencia de reductores. La oxitocina en solución es conocida por su tendencia a formar dímeros y a adsorberse a superficies de vidrio y plástico — un fenómeno documentado que hace perder título sin que aparezca ninguna impureza en el cromatograma.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: ~3-5 min intravenosa. Muy corta.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Existe versión aprobada por FDA; el material de investigación NO es ese producto.
- Actividad uterotónica potente: exposición inadvertida en embarazo es un riesgo real.
- Riesgo de hiponatremia a dosis altas o con carga hídrica.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

EPITHALON

Epitalón, Epithalamin, AEDG

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA LONGEVITY · EXTEND POSSIBILITY

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

El compuesto insignia de la línea LONGEVITY. Investigación de telomerasa, ritmo circadiano y envejecimiento.

Fragmento sintético de la epitalamina, extracto de glándula pineal. La hipótesis de Khavinson es que los péptidos cortos se unen directamente al surco menor del ADN en secuencias específicas y modulan la transcripción — un mecanismo epigenético sin receptor de membrana. Se ha descrito inducción de expresión de la subunidad catalítica de la telomerasa (hTERT).

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Tetrapéptido bioregulador (escuela de Khavinson)
Fórmula molecular (referencia)	C14H22N4O9
Peso molecular aprox.	390.35 Da
CAS	307297-39-8
Secuencia	Ala-Glu-Asp-Gly
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 10MG · 50MG
Contenido del vial	Tetrapéptido sintético liofilizado, sal de acetato. Molécula muy pequeña (390 Da): un vial de 50 MG contiene una cantidad molar enorme comparada con los péptidos grandes del catálogo.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Elongación de telómeros y superación del límite de Hayflick en fibroblastos humanos en cultivo (Khavinson et al.).
- Aumento de esperanza de vida en varias cepas de roedor y reducción de incidencia tumoral espontánea (rata, ratón).
- Normalización del ritmo de melatonina en humanos mayores (estudios rusos).
- Seguimiento observacional de 6–12 años con reducción de mortalidad reportada en cohortes rusas.
- ADVERTENCIA METODOLÓGICA: prácticamente toda la evidencia procede de un único grupo de investigación, publicada mayoritariamente en revistas rusas, y no ha sido replicada de forma independiente por terceros. Esto no la invalida, pero define su peso.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: −20 °C. Reconstituido: 2–8 °C, 20–30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Muy soluble.
- Estabilidad: Muy buena. Sin cisteína ni metionina. Los residuos Asp-Gly pueden formar succinimida lentamente a pH neutro-alcalino, la única ruta de degradación relevante.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: Muy corta en plasma (minutos). El mecanismo propuesto es transcripcional y no requiere exposición sostenida.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Sin aprobación regulatoria fuera de Rusia.
- Evidencia de un solo grupo de investigación, sin replicación independiente.
- La activación de telomerasa tiene implicaciones oncológicas teóricas que no han sido evaluadas en humano a largo plazo.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

NAD+

Nicotinamida adenina dinucleótido

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA LONGEVITY · EXTEND POSSIBILITY

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación de metabolismo energético y de longevidad. Es el sustrato obligado de las sirtuinas y de las PARP.

Acarreador central de electrones de la glucólisis, el ciclo de Krebs y la beta-oxidación. Además es sustrato consumible —no cofactor reciclado— de las sirtuinas (SIRT1-7), de las PARP de reparación de ADN y de la CD38. Los niveles tisulares descienden con la edad, en buena medida por aumento de la actividad de CD38.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Coenzima de dinucleótido (no es un péptido)
Fórmula molecular (referencia)	C21H27N7O14P2
Peso molecular aprox.	663.43 Da
CAS	53-84-9
Secuencia	No aplica. Dinucleótido de nicotinamida y adenina unidos por un puente pirofosfato.
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 100MG · 500MG · 1000MG
Contenido del vial	Coenzima en forma oxidada (NAD+), liofilizada. Higroscópica. Las presentaciones de 500 y 1000 MG reflejan que el uso investigado es de escala de cientos de miligramos.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- El descenso de NAD+ con la edad está bien documentado en múltiples tejidos y especies.
- Restauración de función mitocondrial y de capacidad de ejercicio en ratón envejecido mediante precursores (NR, NMN).
- Ensayos humanos con precursores orales elevan NAD+ sanguíneo de forma consistente, pero los resultados funcionales han sido en general modestos o nulos.
- La molécula de NAD+ intacta es demasiado grande y polar para atravesar bien la membrana celular: la mayoría de la investigación sería usa precursores (nicotinamida ribósido, NMN), no NAD+ directo. Éste es el punto técnico más importante de la ficha.
- La infusión intravenosa de NAD+ es una práctica de clínica privada sin ensayos controlados que la respalden.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C, sellado y seco. Muy higroscópico. Reconstituido: 2-8 °C, uso a corto plazo.
- Reconstitución: Agua bacteriostática o agua estéril. Muy soluble. La solución debe ser incolora o levemente amarilla.
- Estabilidad: Inestable en solución, y particularmente a pH alcalino, donde se degrada en horas. El enlace pirofosfato es el punto lábil. Amarilleamiento marcado indica degradación avanzada.
- Manejo: Riesgo bajo.
- Vida media: Corta en circulación; se degrada rápidamente a nicotinamida por NAD-glicohidrolasas.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Sin aprobación regulatoria para uso parenteral.
- Biodisponibilidad celular pobre de la molécula intacta comparada con sus precursores.
- No es un péptido: requiere métodos analíticos propios (HPLC de intercambio iónico o fase reversa con par iónico).

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

FOXO4-DRI

FOXO4 D-Retro-Inverso, péptido senolítico

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA LONGEVITY · EXTEND POSSIBILITY

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación de senolisis: eliminación selectiva de células senescentes. Es el compuesto más experimental del catálogo.

La célula senescente mantiene p53 secuestrado en el núcleo por FOXO4, lo que le impide disparar apoptosis y la deja viva pero disfuncional, secretando el fenotipo secretor asociado a senescencia. FOXO4-DRI compite por el sitio de unión, libera p53 y permite que la célula senescente ejecute la apoptosis que tenía bloqueada. La construcción retro-inversa —D-aminoácidos en orden invertido— preserva la topología de las cadenas laterales y hace la molécula prácticamente inmune a las proteasas, que sólo reconocen L-aminoácidos.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Péptido senolítico de D-aminoácidos en secuencia retro-inversa
Fórmula molecular (referencia)	Sin registro público
Peso molecular aprox.	4826.5 Da
CAS	2460055-10-9
Secuencia	Secuencia retro-inversa completa: todos los residuos son D-aminoácidos y el orden está invertido respecto al péptido nativo. Incluye un dominio de penetración celular fusionado.
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 2MG
Contenido del vial	Péptido sintético íntegramente de D-aminoácidos, liofilizado. Su masa (~4826 Da) lo sitúa entre los más grandes de la línea.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Reducción de marcadores de senescencia, restauración de densidad de pelaje, de función renal y de resistencia al ejercicio en ratón envejecido y en ratón progeroide XpdTTD (Baar et al., Cell 2017). Es el estudio fundacional.
- Eliminación selectiva de condrocitos senescentes en cultivo humano expandido in vitro.
- NO existen ensayos clínicos en humano. Ninguno.
- El mecanismo es proapoptótico: la selectividad depende por completo de que la célula sana no dependa del secuestro FOXO4-p53, lo cual es cierto en los modelos estudiados pero no ha sido verificado en humano.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C. Reconstituido: 2-8 °C, uso a corto plazo.
- Reconstitución: Agua bacteriostática o solución salina. Soluble.
- Estabilidad: Excepcional frente a degradación enzimática, por construcción.
- Manejo: Péptido proapoptótico. Manejar con guantes y evitar aerosoles. Desechar como residuo químico.
- Vida media: Prolongada respecto a un péptido L equivalente por la resistencia a proteasas; no caracterizada en humano.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Sin aprobación regulatoria. Sin ningún dato en humano.
- Mecanismo proapoptótico: la selectividad no está verificada en humano.
- Es el compuesto del catálogo con la mayor distancia entre entusiasmo de mercado y evidencia disponible.
- Un péptido de D-aminoácidos exige confirmación de configuración: la HPLC quiral o el análisis de aminoácidos tras hidrólisis son los únicos métodos que distinguen D de L. Un CoA que sólo reporte masa y pureza NO demuestra que el material sea retro-inverso.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

DIHEXA

N-hexanoil-Tyr-Ile-(6)-aminohexanoil amida, PNB-0408

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA LONGEVITY · EXTEND POSSIBILITY

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación de sinaptogénesis y de cognición. La potencia reportada es la razón de su fama y también la razón de la cautela.

Potenciador del sistema factor de crecimiento hepatocitario / c-Met. Estabiliza la interacción HGF-Met y amplifica la señalización, lo que en neurona se traduce en formación de nuevas espinas dendríticas y sinapsis funcionales.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Molécula pequeña peptidomimética — análogo de angiotensina IV
Fórmula molecular (referencia)	C27H44N4O5
Peso molecular aprox.	504.67 Da
CAS	1401708-83-5
Secuencia	Hexanoil-Tyr-Ile-Ahx-NH2 (Ahx = ácido 6-aminohexanoico). Es un peptidomimético de tres unidades, no un péptido convencional.
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 5MG · 10MG
Contenido del vial	Peptidomimético sintético liofilizado. Lipofílico por la cadena hexanoica, que es lo que le permite cruzar la barrera hematoencefálica.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Reversión de déficit cognitivo en modelo de escopolamina y en modelo de lesión colinérgica (rata). Reportado como ~7 órdenes de magnitud más potente que el BDNF en ensayos de sinaptogénesis in vitro — una cifra extraordinaria que exige el escrutinio proporcional.
- Actividad oral y penetración de barrera hematoencefálica demostradas en roedor.
- NO existen ensayos clínicos en humano.
- La amplificación de la vía HGF/c-Met tiene implicación oncológica directa: c-Met es un protooncogén y su activación aberrante impulsa varios tumores sólidos. Ningún estudio ha evaluado esta exposición a largo plazo.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C. Solución en DMSO: -20 °C alicuotada.
- Reconstitución: Poco soluble en agua por la lipofilia. Requiere DMSO u otro codisolvente, seguido de dilución.
- Estabilidad: Buena como sólido.
- Manejo: Manejar con guantes. Evitar inhalación.
- Vida media: No caracterizada en humano.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Sin aprobación regulatoria. Sin datos en humano.
- Activa una vía protooncogénica (c-Met). Riesgo oncológico teórico no evaluado.
- La solubilidad acuosa limitada es intrínseca: no es un defecto de lote.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

DSIP

Delta Sleep-Inducing Peptide, péptido inductor del sueño delta

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA LONGEVITY · EXTEND POSSIBILITY

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación de arquitectura del sueño y de respuesta al estrés.

Aislado en 1974 del plasma de conejo sometido a estimulación de sueño delta. Pese a cincuenta años de estudio, NO se ha identificado un receptor propio. Se le atribuye modulación de opioides endógenos, de la liberación de somatostatina y del eje corticotropo. El mecanismo sigue siendo, con honestidad, desconocido.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Nonapéptido neuromodulador
Fórmula molecular (referencia)	C35H48N10O15
Peso molecular aprox.	848.8 Da
CAS	62568-57-4
Secuencia	Trp-Ala-Gly-Gly-Asp-Ala-Ser-Gly-Glu
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 5MG · 10MG · 12MG
Contenido del vial	Nonapéptido sintético liofilizado, sal de acetato.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Aumento de sueño de ondas lentas en conejo y rata, con resultados en humano mucho menos consistentes.
- Estudios humanos pequeños en insomnio crónico y en abstinencia de opioides y alcohol, con resultados mixtos.
- Efecto antinociceptivo y de reducción de estrés descrito en modelos animales.
- La molécula es hidrofílica y su paso de la barrera hematoencefálica es limitado, lo que hace difícil conciliar la vía de administración con el efecto central atribuido.
- Sin desarrollo clínico moderno. La literatura es en su mayoría anterior a 1995.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C protegido de la luz. Reconstituido: 2-8 °C, 20-30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Soluble.
- Estabilidad: El Trp N-terminal es fotosensible y es también el punto de ataque de las aminopeptidasas. La secuencia Asp-Ala y los Gly-Gly favorecen isomerización lenta.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: Muy corta: minutos en plasma.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Sin aprobación regulatoria.
- Mecanismo no establecido tras cinco décadas de estudio.
- Literatura mayoritariamente anterior a los estándares metodológicos actuales.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

PINEALON

EDR, tripéptido Glu-Asp-Arg

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA LONGEVITY · EXTEND POSSIBILITY

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación de neuroprotección y de regulación circadiana. Derivado de la fracción peptídica de Cortixin.

Mismo marco conceptual que Epithalon: unión directa a secuencias específicas del ADN y modulación de la expresión génica neuronal, sin receptor de membrana. Se le atribuye regulación de genes de defensa antioxidante y de supervivencia neuronal.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Tripéptido bioregulador (escuela de Khavinson)
Fórmula molecular (referencia)	C15H26N6O8
Peso molecular aprox.	418.4 Da
CAS	175175-23-2
Secuencia	Glu-Asp-Arg
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 10MG
Contenido del vial	Tripéptido sintético liofilizado, sal de acetato.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Reducción de muerte neuronal por hipoxia y por estrés oxidativo en cultivo y en rata.
- Mejora de parámetros cognitivos en rata envejecida (grupo de Khavinson).
- Descrita penetración de barrera hematoencefálica en modelo animal.
- MISMA LIMITACIÓN QUE EPITHALON: evidencia esencialmente de un solo grupo, publicada en revistas rusas, sin replicación independiente. Sin ensayos clínicos controlados.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C. Reconstituido: 2-8 °C, 20-30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Muy soluble.
- Estabilidad: Buena. El par Asp-Arg admite isomerización lenta.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: Muy corta.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Sin aprobación regulatoria fuera de Rusia.
- Evidencia de un solo grupo, sin replicación independiente.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

CARTALAX

AED, tripéptido Ala-Glu-Asp

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA LONGEVITY · EXTEND POSSIBILITY

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación de cartílago y tejido conectivo. Es el bioregulador de la serie dirigido al condrocito.

Mismo marco que Epithalon y Pinealon: interacción directa con ADN y modulación de la expresión génica, con tropismo declarado por condrocito y fibroblasto musculoesquelético.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Tripéptido bioregulador (escuela de Khavinson)
Fórmula molecular (referencia)	C12H19N3O8
Peso molecular aprox.	333.3 Da
CAS	Sin registro público
Secuencia	Ala-Glu-Asp
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 20MG
Contenido del vial	Tripéptido sintético liofilizado, sal de acetato. La presentación única de 20 MG refleja el uso investigado.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Modulación de expresión de genes de matriz cartilaginosa en cultivo de condrocitos (grupo de Khavinson).
- Descrito efecto sobre marcadores de senescencia en fibroblasto.
- La base de evidencia es la MÁS DELGADA de los tres bioreguladores del catálogo: menos publicaciones que Epithalon o Pinealon, todas del mismo grupo, ninguna réplica independiente, ningún ensayo clínico.
- No existe una entrada de registro CAS pública consolidada.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C. Reconstituido: 2-8 °C, 20-30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Muy soluble.
- Estabilidad: Buena. Los pares Glu-Asp admiten isomerización lenta.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: Muy corta.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Sin aprobación regulatoria fuera de Rusia. Sin CAS público consolidado.
- Evidencia mínima, de un solo grupo, sin replicación.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

THYMOSIN ALPHA-1

Timosina α1, Tα1, timalfasina, Zadaxin

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA LONGEVITY · EXTEND POSSIBILITY

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

El inmunomodulador mejor caracterizado del catálogo, con aprobación en más de treinta países.

Agonista de los receptores tipo Toll TLR2 y TLR9 en células dendríticas y macrófagos. Promueve la maduración de células T, aumenta la producción de IL-2 e interferón gamma, restaura la función de células NK y desplaza el balance Th1/Th2 hacia Th1. No es inmunoestimulante indiscriminado: es restaurador de función en inmunidad deprimida.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Péptido inmunomodulador tímico
Fórmula molecular (referencia)	C129H215N33O55
Peso molecular aprox.	3108.3 Da
CAS	62304-98-7
Secuencia	Ac-Ser-Asp-Ala-Ala-Val-Asp-Thr-Ser-Ser-Glu-Ile-Thr-Thr-Lys-Asp-Leu-Lys-Glu-Lys-Lys-Glu-Val-Val-Glu-Glu-Ala-Glu-Asn (N-acetilada)
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 5MG · 10MG
Contenido del vial	Péptido sintético de 28 residuos, N-acetilado, liofilizado con manitol y tampón fosfato.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Aprobado en más de 35 países (Zadaxin) para hepatitis B y C crónicas y como adyuvante de vacunación en inmunodeprimidos. NO aprobado por la FDA en EE. UU.
- Reducción de mortalidad en sepsis grave en ensayo controlado chino (fase 2, n=361).
- Estudiado durante la pandemia de COVID-19 con señal de recuperación de linfopenia en cohortes observacionales.
- Adyuvante en melanoma y en hepatocarcinoma con resultados mixtos.
- Perfil de seguridad humano de décadas: es el mejor documentado de la línea LONGEVITY.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: 2–8 °C aceptable, –20 °C preferible. Reconstituido: 2–8 °C, usar en 24 h en formato clínico; hasta 14 días en investigación.
- Reconstitución: Agua estéril o agua bacteriostática. Soluble.
- Estabilidad: La secuencia es rica en Asp, Asn, Ser y Thr: susceptible a desamidación e isomerización. La N-acetilación protege el extremo N.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: ~2 h.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Aprobado fuera de EE. UU. (Zadaxin); el material de investigación NO es ese producto.
- Inmunomodulador: la exposición en enfermedad autoinmune o en trasplante es un riesgo real.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

THYMALIN

Timalina, extracto polipeptídico tímico

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA LONGEVITY · EXTEND POSSIBILITY

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación de inmunorestauración. Es un extracto, no un péptido sintético, y esa diferencia gobierna todo su manejo.

Mezcla de péptidos tímicos que restauran la diferenciación de linfocitos T, la relación CD4/CD8 y la producción de citoquinas. No se puede atribuir la actividad a un componente único.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Complejo polipeptídico de origen bovino (no es una molécula única)
Fórmula molecular (referencia)	Sin registro público
Peso molecular aprox.	Sin registro público
CAS	Sin registro público
Secuencia	No aplica. Es una fracción polipeptídica de masa 1000–10000 Da, no una secuencia definida.
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 10MG
Contenido del vial	Fracción polipeptídica extraída de timo bovino de ternera. La composición NO es una secuencia definida sino una distribución de masas, y varía entre lotes y entre fabricantes por naturaleza del proceso. Ésta es la advertencia central de la ficha.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Uso clínico establecido en Rusia y en la antigua URSS desde los años ochenta para inmunodeficiencia secundaria.
- Estudios de Khavinson con seguimiento de 6–12 años en población geriátrica, con reducción de mortalidad reportada, especialmente en combinación con Epithalamin.
- La literatura es rusa y en su mayoría no está indexada ni replicada fuera de ese ámbito.
- Al ser extracto, ningún resultado es estrictamente transferible entre lotes ni entre fabricantes.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: 2–8 °C, –20 °C preferible. Reconstituido: usar de inmediato.
- Reconstitución: Solución salina isotónica estéril, según práctica del fabricante ruso. Soluble.
- Estabilidad: No caracterizada de forma sistemática.
- Manejo: Producto de origen animal bovino. La trazabilidad del origen y el estatus de EEB del rebaño son requisitos sanitarios reales, no formalismos.
- Vida media: No caracterizada.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Producto de ORIGEN ANIMAL BOVINO: riesgo de encefalopatía espongiforme y de carga inmunogénica. Exigir certificado de origen y de estatus EEB.
- NO es una molécula definida: no admite especificación de pureza por HPLC en el sentido usual. El control de calidad exige perfil electroforético o cromatográfico comparado con un patrón de referencia del propio fabricante.
- Sin aprobación fuera de Rusia y países de la CEI.
- Es el único artículo del catálogo cuya identidad NO puede verificarse por masa intacta.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

SELANK

Selanc, TP-7, tuftsina heptapeptídica

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA LONGEVITY · EXTEND POSSIBILITY

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación de ansiedad y de modulación inmune sin sedación.

Modula la expresión de GABA-A y aumenta la concentración de encefalinas al inhibir su degradación por enkefalinasas. Regula BDNF en hipocampo. La extensión Pro-Gly-Pro es el estabilizador: bloquea las peptidasas que degradarían la tuftsina en segundos.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Análogo sintético de tuftsina
Fórmula molecular (referencia)	C33H57N11O9
Peso molecular aprox.	751.88 Da
CAS	129954-34-3
Secuencia	Thr-Lys-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 5MG · 10MG
Contenido del vial	Heptapéptido sintético liofilizado, sal de acetato. Es la tuftsina (TKPR, un tetrapéptido inmunomodulador endógeno) extendida con Pro-Gly-Pro para estabilizarla.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Registrado en Rusia como fármaco ansiolítico desde 2009.
- Eficacia comparable a benzodiacepinas en trastorno de ansiedad generalizada en ensayos rusos, SIN sedación, sin dependencia y sin síndrome de abstinencia — que es su argumento central.
- Aumento de expresión de BDNF en hipocampo (rata).
- Efecto inmunomodulador heredado de la tuftsina.
- Los ensayos son rusos y no han sido replicados según estándares occidentales.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C. Reconstituido: 2-8 °C, 20-30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Muy soluble.
- Estabilidad: Buena. Sin cisteína ni metionina; las tres prolinas dan rigidez conformacional y resistencia a proteasas.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: Corta como péptido libre; la vía intranasal es la habitual en investigación.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Registrado únicamente en Rusia. Sin aprobación FDA/EMA.
- Evidencia sin replicación independiente occidental.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

SEMAX

Semaks, ACTH(4-10) Pro-Gly-Pro

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA LONGEVITY · EXTEND POSSIBILITY

① DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación de neuroprotección y de cognición. Es el análogo hermano de Selank, del mismo instituto ruso.

Conserva la actividad neurotrópica de la ACTH sin su actividad corticotropa: no estimula la suprarrenal. Aumenta la expresión de BDNF y de NGF en hipocampo, modula los sistemas dopaminérgico y serotoninérgico, e inhibe la degradación de encefalinas. Igual que en Selank, el Pro-Gly-Pro es lo que impide que las peptidasas lo destruyan de inmediato.

② COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Análogo sintético de ACTH(4-10)
Fórmula molecular (referencia)	C37H51N9O10S
Peso molecular aprox.	813.92 Da
CAS	80714-61-0
Secuencia	Met-Glu-His-Phe-Pro-Gly-Pro
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 5MG · 10MG
Contenido del vial	Heptapéptido sintético liofilizado, sal de acetato. Es el fragmento 4-7 de la ACTH (MEHF) extendido con Pro-Gly-Pro.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

③ APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Registrado en Rusia desde 1996 para ictus isquémico, encefalopatía y neuropatía óptica.
- Mejora de recuperación funcional tras ictus isquémico en ensayos rusos.
- Aumento sostenido de BDNF en hipocampo tras administración intranasal (rata).
- Efecto nootrópico en sujetos sanos descrito en estudios pequeños.
- Los ensayos son rusos y no han sido replicados según estándares occidentales.

④ DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

⑤ RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C protegido de la luz y del aire. Reconstituido: 2-8 °C, 20-30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Soluble.
- Estabilidad: La metionina N-terminal es oxidable: es la ruta de degradación principal y añade +16 Da visible en LC-MS. La histidina también es susceptible. Proteger de aire y de metales traza.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: Corta como péptido libre; la vía intranasal es la habitual y la que se corresponde con la literatura.

⑥ EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Registrado únicamente en Rusia. Sin aprobación FDA/EMA.
- Oxidación de metionina: exigir en el CoA que la impureza +16 Da esté cuantificada, no sólo la pureza global.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

MELATONIN

Melatonina, N-acetil-5-metoxitriptamina

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA LONGEVITY · EXTEND POSSIBILITY

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Hormona pineal del ritmo circadiano. Es el compuesto con historial de uso humano más amplio del catálogo.

Agonista de los receptores MT1 y MT2 en el núcleo supraquiasmático, el marcapasos circadiano. MT1 media la reducción del disparo neuronal que promueve el sueño; MT2 media el desplazamiento de fase. Es además un captador directo de radicales libres y ese efecto antioxidante es independiente del receptor.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Indolamina hormonal (no es un péptido)
Fórmula molecular (referencia)	C13H16N2O2
Peso molecular aprox.	232.28 Da
CAS	73-31-4
Secuencia	No aplica. Derivado indólico del triptófano.
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 10MG
Contenido del vial	Indolamina sintética en polvo. Molécula pequeña (232 Da), no un péptido.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Reducción de latencia de sueño de ~7 min y aumento de duración total de ~8 min frente a placebo en metaanálisis: efecto real, consistente y de magnitud modesta. La expectativa del público suele exceder con mucho esta cifra.
- Eficacia clara en desórdenes de fase circadiana: jet lag, trabajo por turnos, síndrome de fase retrasada. Ahí el efecto es sustancialmente mayor que en insomnio primario.
- El momento de administración importa más que la dosis: es un cronobiótico, no un hipnótico.
- Efecto antioxidante y de protección mitocondrial documentado en modelos preclínicos a dosis muy superiores a las circadianas.
- De venta libre como suplemento en EE. UU.; medicamento de prescripción en la UE, Reino Unido, Australia y Japón.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Polvo: -20 °C protegido de la luz. Marcadamente fotosensible.
- Reconstitución: Poco soluble en agua. Requiere etanol, DMSO o ciclodextrina como codisolvente.
- Estabilidad: Buena como sólido seco y oscuro. El anillo indólico se degrada con la luz y con la oxidación.
- Manejo: Riesgo bajo.
- Vida media: ~40–60 min. Corta, lo que explica el diseño de formulaciones de liberación prolongada.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Estatus regulatorio variable por país: suplemento en EE. UU., medicamento de prescripción en la UE y otros.
- No es un péptido: métodos analíticos propios.
- Solubilidad acuosa limitada: es intrínseco a la molécula.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

KISSPEPTIN-10

Kisspeptina-10, metastina 45-54, KP-10

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA LONGEVITY · EXTEND POSSIBILITY

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Investigación del eje hipotálamo-hipófisis-gónada. Es el regulador maestro de la pubertad y de la reproducción, descubierto en 2003.

Agonista del receptor KISS1R (GPR54) en las neuronas GnRH del hipotálamo. Es el disparador obligado de la secreción pulsátil de GnRH: sin señalización kisspeptina no hay pubertad, y las mutaciones de KISS1R causan hipogonadismo hipogonadotropo congénito. Aguas abajo eleva LH y FSH, y con ellas testosterona o estradiol.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Decapéptido hipotalámico regulador del eje reproductivo
Fórmula molecular (referencia)	C63H83N17O14
Peso molecular aprox.	1302.45 Da
CAS	374675-21-5
Secuencia	Tyr-Asn-Trp-Asn-Ser-Phe-Gly-Leu-Arg-Phe-NH2
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 5MG · 10MG
Contenido del vial	Decapéptido sintético amidado, liofilizado, sal de acetato. Es el fragmento activo mínimo de la kisspeptina-54.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Elevación robusta y reproducible de LH y de testosterona en varón sano (humano, fase 1, Imperial College London).
- Usada como disparador de maduración ovocitaria en FIV, con menor riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica que hCG (humano, fase 2). Es su aplicación clínica más prometedora.
- Investigada en amenorrea hipotalámica y en trastornos del deseo sexual.
- Taquifilaxia documentada: la administración continua desensibiliza el receptor y SUPRIME el eje en lugar de estimularlo — exactamente el mismo fenómeno que hace que los agonistas de GnRH se usen para castración química. La pauta pulsátil frente a la continua no es un detalle, es la diferencia entre estimular y suprimir.
- Sin aprobación en ninguna jurisdicción.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Liofilizado: -20 °C protegido de la luz. Reconstituido: 2-8 °C, 20-30 días.
- Reconstitución: Agua bacteriostática. Soluble.
- Estabilidad: Contiene Trp (fotosensible) y dos Asn (desamidables). Estabilidad media.
- Manejo: Manejar como sustancia de investigación no caracterizada.
- Vida media: ~4 min. Extremadamente corta: es un péptido de señalización pulsátil por diseño.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Sin aprobación regulatoria.
- Taquifilaxia: la exposición continua suprime el eje reproductivo en lugar de estimularlo.
- Actúa sobre el eje reproductivo completo: la exposición inadvertida tiene consecuencias endocrinas reales.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.



FICHA TÉCNICA

VITAMIN B12

Cianocobalamina, metilcobalamina, hidroxocobalamina

RUO · RESEARCH USE ONLY



LÍNEA LONGEVITY · EXTEND POSSIBILITY

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Vitamina esencial. Cofactor de la metionina sintasa y de la metilmalonil-CoA mutasa.

Cofactor de dos enzimas humanas. La metionina sintasa remetil homocisteína a metionina (interfaz con folato y con el ciclo de metilación); la metilmalonil-CoA mutasa procesa propionil-CoA en mitocondria. La deficiencia produce anemia megaloblástica y degeneración combinada subaguda de la médula espinal, que es irreversible si se retrasa el tratamiento.

2 COMPOSICIÓN / CONTENIDO QUÍMICO

Tipo	Vitamina — complejo de coordinación de cobalto (no es un péptido)
Fórmula molecular (referencia)	C63H88CoN14O14P
Peso molecular aprox.	1355.37 Da
CAS	68-19-9 (cianocobalamina)
Secuencia	No aplica. Corriñoide con cobalto central.
Presentación en investigación	Liofilizado (polvo), vial de laboratorio — 1MG
Contenido del vial	Cobalamina en una de sus formas: ciano, metil o hidrox. La forma importa: la cianocobalamina es la más estable y barata pero requiere conversión metabólica; la metilcobalamina es la forma coenzimática directa; la hidroxocobalamina tiene la retención tisular más prolongada. El CoA debe indicar cuál contiene el vial.
Pureza reportada (proveedores RUO)	≥98% (HPLC, referencia de catálogo)

3 APLICACIONES Y BENEFICIOS EN USO HUMANO

- Farmacología y clínica completamente establecidas. Aprobada por la FDA para deficiencia de B12 y anemia perniciosa.
- La corrección de la deficiencia es inequívocamente eficaz. La suplementación en sujetos con niveles normales no mejora energía, cognición ni rendimiento (metaanálisis).
- La hidroxocobalamina en dosis alta es antídoto aprobado para intoxicación por cianuro.
- Toxicidad prácticamente nula: el exceso se elimina por orina. No se ha establecido nivel superior de ingesta tolerable.

4 DOSIS Y FRECUENCIA DE USO

5 RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: 2–8 °C protegido de la luz. MARCADAMENTE fotosensible: la degradación por luz es rápida y visible como pérdida del color rojo.
- Reconstitución: Muy soluble. La solución es de un rojo intenso característico.
- Estabilidad: Buena en oscuridad y a pH neutro. Se degrada con luz, con ácido ascórbico y a pH extremo.
- Manejo: Riesgo muy bajo.
- Vida media: Depende de la forma y de la unión a transcobalamina; las reservas hepáticas duran años.

6 EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS

- Existe versión aprobada por FDA; el material de investigación NO es ese producto.
- Fotosensibilidad extrema: la pérdida de color rojo es un indicador visual directo de degradación.
- No es un péptido.

Regulatory Notice & Legal Disclaimer: All compounds provided by PeptideX are sold for laboratory research and analytical reference use only (RUO). By purchasing this material, the buyer assumes absolute, sole, and unconditional liability for any handling, storage, application, or misuse of the product. PeptideX disclaims any and all responsibility for damages, adverse effects, or consequences resulting from any use outside of strictly controlled research protocols by professionals.