EIXO 6 · ENERGIA E VELOCIDADE — AULA 6.10 (FECHAMENTO DO EIXO)

Como a indústria decide a temperatura, a pressão e o catalisador de um processo real?

> *Não existe condição ótima. Existe **acordo**. Todo reator do mundo funciona num ponto que nenhum químico considera ideal — e é exatamente por isso que ele funciona.*

Aula 6.10 — A engenharia da decisão: quando "vale a pena" briga com "quanto tempo leva"

A ÂNCORA

Você acaba de ser contratado. Sua sala tem uma janela que dá para um reator de aço de trinta metros de altura. Sua tarefa é uma só, e ela vale bilhões:

$$\mathbf{N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3}$$
$$\Delta H = -92\ \mathbf{kJ/mol}$$

Amônia. A molécula que virou fertilizante, que virou alimento, que sustenta aproximadamente **metade** das calorias consumidas pela espécie humana. Se seu reator produz mal, gente passa fome. Sem exagero retórico.

Você já sabe tudo o que precisa. Vamos aplicar.

Primeira decisão: a temperatura. Em 6.7 você aprendeu que temperatura acelera reação. Em 6.6, que ela ajuda moléculas a vencer o morro da energia de ativação. Então a resposta é óbvia: **coloque bem quente**.

Você escreve no relatório: "1000 °C". Assina. Manda.

O engenheiro-chefe devolve o papel com uma frase escrita a lápis:

> *"A 1000 °C seu rendimento de amônia é de aproximadamente **0,0%**. Você acabou de construir um forno caríssimo que produz nada, muito rapidamente. Tente de novo."*

Segunda tentativa. Ok — a reação é exotérmica, e você desconfia (corretamente, e vai confirmar no Eixo 7) que aquecer um equilíbrio exotérmico atrapalha o produto. Então: **reação fria**. Você escreve "25 °C".

O papel volta:

> *"A 25 °C seu rendimento de equilíbrio é **excelente**: cerca de 98%. Só há um problema: você vai atingi-lo em aproximadamente **duzentos anos**. A empresa fecha antes. Tente de novo."*

Sente o problema? Ele não é um problema de conta. É um problema **estrutural**, e ele é a razão de existir do Eixo 6 inteiro.

Quente = rápido, mas pouco.
Frio = muito, mas nunca.
Não existe temperatura que te dê as duas coisas.

A DESCONSTRUÇÃO

O erro que faz o aluno perder essa questão

Quase todo estudante entra nesse problema carregando uma crença silenciosa: **que existe uma "condição ideal" a ser descoberta**, e que o trabalho do químico industrial é encontrá-la.

Não existe. E a razão é conceitualmente profunda: as duas perguntas do eixo respondem a **variáveis diferentes e frequentemente opostas**.

O NÚCLEO DE TODA ESTA AULA

A temperatura tem **duas ações simultâneas e antagônicas** numa reação exotérmica:

· Sobre a **cinética** (o "quanto tempo leva?"): aquecer **sempre acelera**. Sem exceção.
· Sobre o **equilíbrio** (o "quanto rende?"): aquecer **reduz o rendimento** de uma reação exotérmica.

Ou seja: a mesma alavanca melhora uma coisa e piora a outra. Não há como ganhar nas duas. Essa é a razão pela qual "condição ótima" é um conceito que não existe na indústria — existe **condição de compromisso**.

E aqui um segundo erro, mais sutil e muito mais cobrado: você pensa que o rendimento e a velocidade são o mesmo assunto. Não são. **Rendimento é destino. Velocidade é estrada.** Você pode ter um destino paradisíaco ligado por uma estrada de terra intransitável — e é literalmente o caso da amônia a 25 °C.

E se a resposta fosse simplesmente "usar catalisador"?

Boa intuição, mas cuidado com o alcance dela. O catalisador (6.9) resolve **metade** do problema — e é crucial que você saiba **qual** metade.

O catalisador acelera.
O catalisador não aumenta o rendimento.
Ele acelera igualmente os dois sentidos — logo não desloca nada.

O catalisador é o que permite você **abaixar** a temperatura sem que o processo fique lento. Ele não te dá rendimento; ele te dá **permissão para escolher uma temperatura menor**. E é assim, e só assim, que ele salva o negócio. Guarde essa frase — ela é o resumo mais útil desta aula.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. As três alavancas, e o que cada uma realmente faz

Alavanca	Efeito na VELOCIDADE	Efeito no RENDIMENTO	Custo real
↑ **Temperatura**	**Aumenta sempre.**	**Diminui**, se exotérmica.	Combustível, energia, desgaste do reator.
↑ **Pressão**	Aumenta (aproxima as moléculas gasosas).	**Aumenta**, se o produto tem menos mol de gás.	Altíssimo: aço espesso, compressores, risco.
Catalisador	**Aumenta muito** (E_a menor).	**Nenhum.** Zero. Nada.	Baixo por unidade, mas envenena e precisa troca.
Retirar produto	—	Aumenta a conversão total.	Separação, resfriamento, reciclo.

Olhe a tabela e note o padrão: **a pressão é a única alavanca que ajuda nas duas colunas**. É por isso que a indústria aceita pagar por ela apesar do custo absurdo — e é por isso que, em prova, pressão é quase sempre a resposta "boa" quando o produto tem menor volume gasoso.

Por que a pressão ajuda o rendimento aqui? Conte os mols de gás: **4 mol** à esquerda ($1\ N_2 + 3\ H_2$) contra **2 mol** à direita. Comprimir o sistema faz ele "preferir" o lado que ocupa menos espaço. Isso é Le Chatelier, e é o Eixo 7 inteiro — você está vendo o trailer.

2. O gráfico que a prova te dá — e como lê-lo

Toda questão de segunda fase sobre processo industrial mostra alguma versão da figura abaixo. Aprender a ler isso vale mais que decorar qualquer número.




Fig. 1 — As duas curvas **nunca** têm máximo no mesmo lugar — é essa a informação que o gráfico existe para dar. A faixa escolhida não maximiza nenhuma das duas: ela é o ponto em que o produto rendimento × velocidade gera o maior **lucro por hora de reator**. E note: o catalisador não move a curva vermelha nem um milímetro; ele **empurra a curva azul para a esquerda**, permitindo que a faixa verde seja escolhida numa temperatura mais baixa — e portanto num rendimento maior.

3. Haber-Bosch: a decisão, linha por linha

1. **Temperatura: ≈ 450 °C.** Deliberadamente **medíocre**. Alta o suficiente para o ferro catalisar em tempo útil, baixa o suficiente para o equilíbrio ainda entregar produto. Ninguém está feliz com esse número. É por isso que ele está certo.

2. **Pressão: 150–250 atm.** Paga-se aço, compressor e risco porque a pressão é a **única** alavanca que melhora rendimento e velocidade ao mesmo tempo (4 mol de gás ⟶ 2 mol).
3. **Catalisador: ferro** (com promotores de K_2O e Al_2O_3), heterogêneo, poroso, com área interna gigantesca. Ele é o que torna os 450 °C viáveis — sem ele, seria necessário ir a temperaturas em que o rendimento é nulo.
4. **Retirada contínua do produto.** A amônia é **liquefeita** e removida do reator, e o N_2/H_2 que não reagiu é **reciclado** de volta. O equilíbrio nunca chega a se estabelecer: o sistema é permanentemente puxado para a direita.

> **O TRUQUE QUE QUASE NINGUÉM PERCEBE**
>
> A conversão por passagem no reator de amônia é modesta — algo entre 15% e 20%. Um estudante olharia isso e diria "processo ruim".
>
> Está errado. Porque o gás que não reagiu **não é perdido**: ele volta para o começo, e volta, e volta. A conversão **global** do processo passa de 95%.
>
> Lição industrial que a Química escolar quase nunca ensina: **o reciclo dispensa o rendimento perfeito**. Você não precisa vencer o equilíbrio — precisa apenas insistir com ele.

4. O contraexemplo obrigatório: o craqueamento do petróleo

Se você só vê amônia, vai decorar "abaixe a temperatura". Errado. Olhe o caso oposto.

O **craqueamento** — quebrar cadeias longas de petróleo em gasolina — é **endotérmico** e produz **mais** moléculas de gás do que consome. Todas as setas se invertem:

	Síntese da amônia	Craqueamento
Termoquímica	Exotérmica ($\Delta H < 0$)	Endotérmica ($\Delta H > 0$)
Mols de gás	Diminui (4 ⟶ 2)	Aumenta (1 ⟶ vários)
Temperatura ideal p/ rendimento	**Baixa**	**Alta**
Pressão ideal p/ rendimento	**Alta**	**Baixa**
Condição real usada	450 °C, 200 atm	≈ 500 °C, pressão baixa, zeólita
Há conflito T?	**Sim** — o dilema clássico	**Não** — aquecer ajuda nos dois

Repare no que a última linha diz: no craqueamento, aquecer melhora **rendimento e velocidade juntos**. Não há dilema. É por isso que ele roda em temperatura alta sem culpa alguma — e é por isso que decorar "processo industrial usa temperatura média" te derruba na prova. O que decide é o **sinal do ΔH** e a **variação do número de mols gasosos**. Sempre.

5. O procedimento, em quatro perguntas

Diante de qualquer processo industrial desconhecido, você faz **sempre** estas quatro perguntas, nesta ordem:

1. **A reação é exo ou endotérmica?** ⟶ decide se aquecer ajuda ou atrapalha o rendimento.
2. **O número de mols de gás aumenta ou diminui?** ⟶ decide se pressão ajuda o rendimento.
3. **A velocidade é aceitável na temperatura que o rendimento pede?** ⟶ se não, entra o catalisador.
4. **Quanto custa cada alavanca?** ⟶ energia, aço, matéria-prima, segurança. A resposta final é sempre econômica.

Termoquímica diz onde você gostaria de estar.
Cinética diz se você consegue chegar lá em tempo útil.
Economia decide onde você vai efetivamente ficar.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Aumentar a temperatura sempre aumenta a velocidade** — de qualquer reação, exo ou endotérmica, sem exceção.
2. **Aumentar a temperatura reduz o rendimento de uma reação exotérmica** e aumenta o de uma endotérmica. Aqui está o conflito que gera todo o problema industrial.
3. **Aumentar a pressão desloca o equilíbrio para o lado com menor número de mols de gás**, e simultaneamente acelera a reação. É a única alavanca que ajuda nos dois quesitos.
4. **O catalisador aumenta a velocidade e NÃO altera o rendimento nem o ΔH.** Sua função industrial verdadeira é **permitir operar em temperatura mais baixa** — onde o rendimento é melhor — sem perder velocidade.
5. **Não existe condição ótima; existe condição de compromisso.** A temperatura industrial é sempre intermediária quando a reação é exotérmica.
6. **Retirar o produto e reciclar o reagente não convertido** substitui rendimento alto por passagem. Conversão de 15% por ciclo pode significar 95% de conversão global.
7. **Decore o roteiro, não os números:** sinal do ΔH $\longrightarrow$ variação de mols de gás $\longrightarrow$ velocidade aceitável? $\longrightarrow$ custo.
8. **A régua do eixo:** "vale a pena?" (termoquímica) e "quanto tempo leva?" (cinética) são perguntas **independentes**, e é justamente por serem independentes que elas podem entrar em conflito.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só depois vire a página.

1. Explique por que, numa reação exotérmica, o aumento da temperatura gera efeitos **opostos** sobre a velocidade e sobre o rendimento do processo.
2. Qual é a função industrial real do catalisador na escolha das condições de um processo? Justifique por que ele não pode ser usado para aumentar o rendimento.
3. Por que a alta pressão é considerada a alavanca mais "vantajosa" na síntese da amônia, e qual a informação da equação química que permite prever isso?
4. Diferencie **conversão por passagem** de **conversão global** e explique o papel do reciclo de reagentes.
5. Enuncie as duas informações da reação que você precisa identificar, antes de qualquer outra coisa, para decidir temperatura e pressão de um processo desconhecido.

GABARITO OQPS

1. Sobre a **cinética**, aquecer aumenta a fração de colisões com energia suficiente para vencer a energia de ativação, elevando k e a velocidade — sempre. Sobre o **equilíbrio**, uma reação exotérmica libera calor; fornecer calor extra faz o sistema responder consumindo-o, ou seja, deslocando-se no sentido **inverso** (endotérmico), o que **reduz** o rendimento de produto. A mesma variável, dois efeitos antagônicos.
2. Sua função é **abaixar a energia de ativação**, oferecendo mecanismo alternativo, e assim permitir que o processo ocorra com velocidade viável em uma **temperatura mais baixa** — justamente aquela em que o rendimento de equilíbrio é maior. Ele **não** pode aumentar o rendimento porque acelera **igualmente** os sentidos direto e inverso e não altera ΔH nem ΔG (entalpia é função de estado): o equilíbrio é apenas **alcançado mais rápido**, na mesma posição.
3. Porque ela melhora **simultaneamente** rendimento e velocidade: aproxima as moléculas gasosas (mais colisões por segundo) e desloca o equilíbrio para o lado de menor volume gasoso. A informação decisiva é a **contagem de mols de gás**: $N_2 + 3\ H_2 \longrightarrow 2\ NH_3$ passa de **4 mol para 2 mol**, logo comprimir favorece os produtos.
4. **Conversão por passagem** é a fração de reagente convertida em uma única travessia do reator (na amônia, 15–20%, limitada pelo equilíbrio). **Conversão global** é a fração total convertida no processo completo. O **reciclo** devolve o reagente não convertido ao início do circuito, repetidas vezes, elevando a conversão global a mais de 95% — o que dispensa a necessidade de vencer o limite do equilíbrio em cada passagem.
5. (i) O **sinal do ΔH** — se exotérmica, temperatura baixa favorece o rendimento; se endotérmica, temperatura alta favorece. (ii) A **variação do número de mols de gás** entre reagentes e produtos — pressão alta favorece o lado com menos mols de gás. Só depois disso se avalia se a velocidade é aceitável (catalisador) e qual o custo.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A indústria decide temperatura, pressão e catalisador negociando um compromisso entre duas exigências que se contradizem — a termoquímica, que diz em que condição a reação rende, e a cinética, que diz em que condição ela acontece em tempo útil — e o número final escolhido nunca é o melhor para nenhuma das duas, mas o mais lucrativo para as duas juntas.

O GANCHO

Este eixo termina, mas ele termina com uma **dívida**.

Ao longo de toda esta aula você aceitou, sem que ninguém provasse, uma afirmação estranha: que a reação **para**. Que existe um "rendimento de equilíbrio" que você não consegue ultrapassar por mais que espere. Que sobra nitrogênio e hidrogênio no reator para sempre, lado a lado com a amônia, sem reagir.

Isso deveria te incomodar profundamente. Se a reação é favorável e você tem reagente sobrando, **por que ela simplesmente não continua até acabar?**

> *Reação não é um evento com fim. É uma **negociação permanente**. Enquanto a amônia se forma, ela também se desfaz — e chega um momento em que os dois processos correm exatamente na mesma velocidade, e o frasco fica parado por fora enquanto continua fervilhando por dentro.*

É isso que o Eixo 7 vai desmontar. Você vai aprender a **medir** o quanto uma reação "gosta" de virar produto (K), a **prever** para que lado ela corre quando você a perturba (Le Chatelier), e — com essas ferramentas — vai finalmente entender por que os 450 °C de Haber não eram um palpite, mas um cálculo.

Eixo 7 · O Jogo do Equilíbrio · Aula 7.1 — Por que algumas reações param no meio do caminho e nunca acabam?