

Folgen und Reihen

Folgen

Folgen

- $n \in \mathbb{N}^* \rightarrow a_n \in \mathbb{R}$
- $(a_k) = (a_k)_{k \geq 1} = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, a_{n-1}, \dots)$

Die Elemente einer Folge heissen Glieder der Folge  $\rightarrow a_n$ .

**Teilfolgen** Eine **Teilfolge** einer Folge  $(a_n)_{n \geq 1}$  ist eine Folge  $(b_n)_{n \geq 1}$  wobei  $b_n = a_{l(n)}$  und  $l: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$  eine Abbildung mit der Eigenschaft:  $l(n) < l(n+1) \forall n \geq 1$ .

Wichtige Folgen

- (1) Arithmetische Folge:  $(a_n)$ , sodass  $a_{n+1} - a_n = d$  konstant ist, d.h.  $a_1 = a, a_2 = a + d, a_n = a + (n-1)d$
- (2) Geometrische Folge:  $(a_n)$ , sodass  $a_{n+1} = qa_n$  mit  $q$  konstant, d.h.  $a_1 = a, a_2 = qa, a_n = q^{n-1} \cdot a$

**Satz.** Es gilt  $a + qa + \dots + q^{n-1}a = a(1 + q + \dots + q^{n-1}) = \begin{cases} na & \text{für } q = 1 \\ a \cdot \frac{1-q^n}{1-q} & \text{für } q \neq 1 \end{cases}$

- Abkürzungen
- $A$  = Anfangs-Glied
  - $d$  = Differenz
  - $q$  = Quotient

**Arithmetische Folge**  $a_k = (2, 3, 4, 5, \dots) \rightarrow d = 1, A = 2$

- N-tes Glied:  $a_n = A + (n-1) \cdot d$
- Mittelwert:  $a_k = \frac{a_{k-1} + a_{k+1}}{2}$
- Partial-Summe:

$$S_n = n \cdot \frac{a_1 + a_n}{2} = n \cdot \left( A + \frac{n-1}{2} \cdot d \right)$$

Geometrische Folge

$$a_k = \left( \frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots \right) \rightarrow q = \frac{1}{2}, A = 1$$

- N-tes Glied:  $a_n = A \cdot q^{n-1} = \frac{A}{q} \cdot q^n$
- Mittelwert:  $|a_k| = \sqrt{a_{k-1} \cdot a_{k+1}}$
- Partial-Summe:

$$S_n = A \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q} = A \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

Grenzwert und Konvergenz von Folgen

$\epsilon$ -Definition

Folge  $(a_n)_{n \geq 1}$  heisst **konvergent**, falls es  $l \in \mathbb{R}$  gibt, sodass  $\forall \epsilon > 0$  die Menge  $\{n \in \mathbb{N}^* : a_n \notin ]l - \epsilon, l + \epsilon[ \}$  endlich ist. ( $\mathbb{N}^*: \mathbb{N}/0$ )  
Einfach gesagt: das heisst, dass  $|a_n - a| < \epsilon$  ab einem gewissen n für alle  $\epsilon$  gilt.

Bem:  $l$  bezeichnet den Grenzwert  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

**Formelle Grenzwert Definition** Folgende Aussagen sind äquivalent:

1.  $(a_n)_{n \geq 1}$  konvergiert gegen  $l = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$
2.  $\forall \epsilon > 0 \exists N \geq 1$ , sodass  $|a_n - l| < \epsilon \quad \forall n \geq N$ .

**Einzigartigkeit Grenzwert** Es gibt max. ein  $l \in \mathbb{R}$  für  $a_n$  mit dieser Eigenschaft (max. 1 Grenzwert)

Rechenregeln mit Folgen

Sei  $(a_n)_{n \geq 1}, (b_n)_{n \geq 1}$  konvergente Folgen mit  $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n, b = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$

1.  $(a_n \pm b_n)_{n \geq 1}$  konvergent,  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = a \pm b$ .
2.  $(a_n \cdot b_n)_{n \geq 1}$  konvergent,  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = a \cdot b$ .
3.  $(a_n \div b_n)_{n \geq 1}$  konvergent,  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \div b_n) = a \div b$ . (solange  $b_n \neq 0 \forall n \geq 1$  und  $b \neq 0$ )
4. Falls  $\exists K \geq 1$  mit  $a_n \leq b_n \forall n \geq K$  folgt  $a \leq b$ .

Tricks und Tipps für Folgen

Konvergenz Folgen

1. Für Brüche, grösste Potenz von n ausklammern und kürzen. Alle übrigen Brüche der Form  $\frac{a}{n^s}$  streichen, da diese zu 0 konvergieren.
2. Für Wurzeln in einer Summe, multipliziere mit der Differenz der Summe (bei a + b multipliziere mit a - b)
3. Anwendung Satz von Weierstrass
4. Anwendung Sandwich-Satz
5. Vergleich mit Referenz-Folgen (Spezielle Grenzwerte)
6. Grenzwert durch simple Operationen und Umformen ermitteln
7. Binom -, Substitutions-, Log-Trick?
8. Definition der Konvergenz/Limes anwenden
9. Suchen eines konvergenten Majoranten

Divergenz Folgen

1. Suche einen divergenten Minoranten
2. Für alternierende Folgen zeige, dass  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_p 1(n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} a_p 2(n)$

Binom Trick

Gegeben die Summe von zweier (oder einer) Wurzel, kann man wie folgt vorgehen:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+5} - \sqrt{x-3}) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{(x+5) - (x-3)}{\sqrt{x+5} + \sqrt{x-3}} \right)$$

Substitutions Trick

Hier ein Beispiel:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left( 1 - \cos\left(\frac{1}{x}\right) \right)$$

Substituiere nun  $u = \frac{1}{x}$ :

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(u)}{u^2} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin(u)}{2u} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\cos(u)}{2} = \frac{1}{2}$$

Satz von Weierstrass

- $(a_n)_{n \geq 1}$  monoton wachsend und nach oben beschränkt.  $\Rightarrow (a_n)_{n \geq 1}$  konvergiert mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n : n \geq 1\}$
- $(a_n)_{n \geq 1}$  monoton fallend und nach unten beschränkt.  $\Rightarrow (a_n)_{n \geq 1}$  konvergiert mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf\{a_n : n \geq 1\}$

**Sandwich-Satz** Sei  $\lim a_n = \alpha$  und  $\lim c_n = \alpha$  und  $a_n \leq b_n \leq c_n, \forall n \geq k$  dann gilt  $\lim b_n = \alpha$   
Bmk: k steht hier für eine beliebige natürliche Zahl, ab der die Bedingung immer gilt. Also wie bei der Grenzwert-Definition mit dem «Gürtel» um den Grenzwert - das gilt ja auch erst ab einem gewissen Wert n.  
Bmk 2: Einfach gesagt heisst das, dass wenn wir den Grenzwert von zwei Folgen bereits kennen und dieser für beide gleich ist, und wir eine dritte Folge haben die «zwischen» die zwei bekannten Folgen passt (daher Sandwich-Satz), wissen wir dass auch die dritte Folge den gleichen Grenzwert wie die anderen zwei hat.

Grenzwert einer Reihe

**Reihen-Konvergenz** Die Reihe  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  ist **konvergent**, falls die Folge  $(S_n)_{n \geq 1}$  der Partialsummen konvergiert. In diesem Fall definieren wir:  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k := \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$

Rechenregeln von Reihen

Seien  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  und  $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$  konvergent, sowie  $\alpha \in \mathbb{C}$ .

1. Dann ist  $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k)$  konvergent.  
 $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k) = \left( \sum_{k=1}^{\infty} a_k \right) + \left( \sum_{j=1}^{\infty} b_j \right)$ .
2. Dann ist  $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha a_k$  konvergent.  $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha a_k = \alpha \sum_{k=1}^{\infty} a_k$

Spezielle Grenzwerte von Reihen

Geom:	$\sum_{k=0}^{\infty} a^k$	$\begin{cases} \frac{1}{1-a} &  a  < 1 \\ \text{divergiert} &  a  \geq 1 \end{cases}$
	$\sum_{k=0}^n ax^k$	$= a \left( \frac{1-x^{n+1}}{1-x} \right)$
Harm. mit $b = 1$	$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^b}$	$\begin{cases} \text{konvergiert} & b > 1 \\ \text{divergiert} & b \leq 1 \end{cases}$
Altern. Harm.	$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{k^b}$	konvergiert nach Leibniz
	$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^a}{b^k}$	abs. konv. falls $ b  > 1, k \in \mathbb{C}$
	$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^a}{k!}$	abs. konv. $\forall a \in \mathbb{C}$

**Zeta-Funktion:** Sei  $s > 1$  und  $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ .  $\zeta(s)$  konvergiert für  $s > 1$

**Teleskopsumme:** Sei  $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k - a_{k-1})$ . Konvergiert genau dann, wenn  $\lim a_n \rightarrow g$  konvergiert. Der Grenzwert der Summe ist dann  $a_1 - g$ .

Die unendliche Geometrische Reihe

$$S = \sum_{k=1}^{\infty} Aq^{k-1} = \frac{A}{1-q}$$

Bedingung  
 $|q| < 1$

Beispiel Unendliche Geometrische Reihe

$$a_k = \frac{7}{2^{k-1}} = 7 + \frac{7}{2} + \frac{7}{4} + \frac{7}{8} \dots = 14$$

- $q = \frac{1}{2} \rightarrow$  Die Reihe konvergiert
- $S = \frac{A}{1-q} = \frac{7}{1-\frac{1}{2}} = 14$

Konvergenzkriterien Reihen

Konvergenz Reihen

1. Handelt es sich um eine spezielle Reihe? (Geometrisch, Teleskopiert, Harmonisch, Zetafunktion)
2. Ist  $\lim a_n = 0$ ? (Nullfolgenkriterium)
3. Ist das Quotientenkriterium oder Wurzelkriterium anwendbar?
4. Existiert ein konvergierender Majorant / divergierender Minorant?
5. Kann man das Leibnitzkriterium anwenden?
6. Integral Test? Partialbruchzerlegung?

Logarithmus abschätzen

$\log_b(n)$  kann mit  $n^\alpha$  ( $\alpha > 0$ ) abgeschätzt werden.  
 $\ln(n) \leq \sqrt{n}$

**Nullfolgenkriterium**  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  konvergiert  $\Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$   
aber die Umkehrung stimmt nicht.

**Cauchy Kriterium** Die Reihe  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  ist genau dann konvergent, falls:  
 $\forall \varepsilon > 0 \exists N \geq 1$  mit  $\left| \sum_{k=n}^m a_k \right| < \varepsilon \quad \forall m \geq n \geq N$

**Leibniz Kriterium**  
Sei  $(a_n)_{n \geq 1}$  monoton fallend, mit  $a_n \geq 0 \quad \forall n \geq 1$  und  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .  
 $S := \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k$  und es gilt:  $a_1 - a_2 \leq S \leq a_1$ .

**Majorantenkriterium** Seien  $a_n, b_n \geq 0$  mit  $a_n \geq b_n \quad \forall n > n_0$ :  
 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  konvergiert  $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} b_n$  konvergiert

**Minorantenkriterium** Seien  $a_n, b_n \geq 0$  mit  $a_n \leq b_n \quad \forall n > n_0$ :  
 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  divergiert  $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} b_n$  divergiert

**Quotientenkriterium** Sei  $(a_n)_{n \geq 1}$  mit  $a_n \neq 0 \quad \forall n \geq 1$  und:  $q = \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$

- $q < 1$  konvergiert  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  absolut
- $q > 1$  divergiert  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

Für  $\liminf a_n = 1$  keine Aussage möglich

**!!! für die harmonische Reihe ist dieses Kriterium nicht anwendbar/gültig !!!**

**Wurzelkriterium** Es sei:  $q = \sqrt[n]{|a_n|}$

- $q < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$  konvergiert
- $q > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$  und  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  divergieren
- $q = 1 \Rightarrow$  keine Aussage möglich

### Integral Test

Sei  $f(x)$  eine stetige, positive und monoton fallende Funktion auf  $[k, \infty[$  und  $f(n) = a_n$ :

$$\int_k^{\infty} f(x) dx \text{ konvergiert} \Leftrightarrow \sum_{n=k}^{\infty} a_n \text{ konvergiert}$$

$$\int_k^{\infty} f(x) dx \text{ divergiert} \Leftrightarrow \sum_{n=k}^{\infty} a_n \text{ divergiert}$$


Der Grenzwert einer Reihe kann auch mit Partialbruchzerlegung berechnet werden.

Was ist der Grenzwert von  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(n+1)(n+3)}$ ?


$$\frac{2}{(n+1)(n+3)} = \frac{a}{n+1} + \frac{b}{n+3} \Rightarrow \begin{cases} a+b=0 \\ 3a-b=2 \end{cases} \quad \begin{matrix} b=-a=-\frac{1}{2} \\ a=\frac{1}{2} \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(n+1)(n+3)} &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+3} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{8} - \frac{1}{10} + \dots \right) \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) = \frac{5}{2 \cdot 6} = \frac{5}{12} \end{aligned}$$

## Funktionen



**Symmetrie** gerade  $f(-x) = f(x)$ , ungerade  $f(-x) = -f(x)$



## Stetigkeit

**Stetigkeit** Eine Funktion ist stetig, falls

- die Kurve keine Sprünge macht
- man den Graphen der Funktion zeichnen kann, ohne den Stift dabei abzusetzen

### Spezielle Stetige Funktionen

1.  $|f|$ ,  $\max(f, g)$  und  $\min(f, g)$  sind stetig
2. Polynomielle Funktionen sind auf ganz  $\mathbb{R}$  stetig
3. die Trigonometrischen Funktionen  $\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  und  $\cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  sind stetig
4. die Exponentialfunktion  $e^x$  ist auf ganz  $\mathbb{R}$  stetig

## Grenzwerte von Funktionen

### Konvergenz einer Funktion

Die Funktion  $y = f(x)$  hat an der Stelle  $x_0$  den Grenzwert  $y_0$  falls:  
für jede Folge  $(x_n)$  mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$  gilt  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = y_0$   
Bmk: Die Stelle  $x_0$  muss nicht im Definitionsbereich  $D$  sein.

### Links- und Rechtsseitige Grenzwerte

Sei  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  und  $x_0 \in \mathbb{R}$ . Wir nehmen an,  $x_0$  ist ein Häufungspunkt.  
Was vereinfacht heisst, dass die Funktion an dieser Stelle evtl. einen Sprung macht, da sich z.B. die Definition ändert. Beispiel:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x \geq 0 \end{cases}$$

Setze in diesem Beispiel  $x_0 = 0$ , und prüfe ob sich die Funktion von rechts und links dem selben Wert nähert bei  $x_0$ . (NEIN in diesem Bsp.)  
**Formell:** Eine Funktion ist dann gleichmässig konvergent wenn für alle Werte der Funktion gilt

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$$

(Linksseitiger Grenzwert = Rechtsseitiger Grenzwert)

### Rechnen mit Grenzwerten von Funktionen

- $\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} (f \cdot g)(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$
- Sei  $f \leq g$ , so ist  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$
- Falls  $g_1 \leq f \leq g_2$  und  $\lim_{x \rightarrow x_0} g_1(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g_2(x)$ , so existiert  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g_1(x)$

## Strategien und Rechentricks

**Erweitern mit  $\left(\frac{1}{n^k}\right)$**   
 $k$  = höchste Potenz

Beispiel:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 2n + 1}{5n^2 + 4n + 2} &\Rightarrow \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2}} \cdot \frac{3n^2 + 2n + 1}{5n^2 + 4n + 2} = \frac{\frac{3n^2}{n^2} + \frac{2n}{n^2} + \frac{1}{n^2}}{\frac{5n^2}{n^2} + \frac{4n}{n^2} + \frac{2}{n^2}} \\ &= \frac{3 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}}{5 + \frac{4}{n} + \frac{2}{n^2}} = \frac{3 + 0 + 0}{5 + 0 + 0} \end{aligned}$$

**Erweitern mit  $\left(\frac{1}{a^k}\right)$**   
 $k$  = höchste Potenz  
 $a$  = grösste Basis

Beispiel:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1} + 2^n}{3^n + 2} &\Rightarrow \frac{\frac{1}{3^n}}{\frac{1}{3^n}} \cdot \frac{3 \cdot 3^n + 2^n}{3^n + 2} = \frac{\frac{3 \cdot 3^n}{3^n} + \frac{2^n}{3^n}}{\frac{3^n}{3^n} + \frac{2}{3^n}} \\ &= \frac{3 + \frac{2^n}{3^n}}{1 + \frac{2}{3^n}} = \frac{3 + 0}{1 + 0} \end{aligned}$$

**Erweitern mit  $\sqrt{a(n)} + \sqrt{b(n)}$**

Beispiel:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n^2 - 2n} &\Rightarrow \frac{\sqrt{n^2 + n} + \sqrt{n^2 - 2n}}{\sqrt{n^2 + n} + \sqrt{n^2 - 2n}} \cdot \frac{\sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n^2 - 2n}}{1} \\ &= \frac{\left(\sqrt{n^2 + n}\right)^2 - \left(\sqrt{n^2 - 2n}\right)^2}{\sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n^2 - 2n}} = \frac{3n}{\sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n^2 - 2n}} \\ &= \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} \cdot \frac{3n}{\sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n^2 - 2n}} \frac{\frac{3n}{n}}{\sqrt{\frac{1}{n^2} \cdot (n^2 + n)} - \sqrt{\frac{1}{n^2} \cdot (n^2 - 2n)}} \\ &= \frac{3}{\sqrt{\frac{n^2 + n}{n^2}} - \sqrt{\frac{n^2 - 2n}{n^2}}} = \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - \sqrt{1 + \frac{1}{n}}} = \frac{3}{\sqrt{1} + \sqrt{1}} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

**Erweitern zu  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{5n}\right)^n$**

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \left( \left( 1 + \frac{1}{x} \right)^x \right)^a \right) = e^a$$

Beispiel:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{2}{3n} \right)^{4n} = \left( \left( 1 + \frac{1}{\frac{3n}{2}} \right)^{\frac{3n}{2}} \right)^a = e^a = e^{\frac{8}{3}}$$

Wir rechnen also:

$$4n = \frac{3n}{2} \cdot a \text{ und } a = \frac{4n}{\frac{3n}{2}} = \frac{8}{3}$$

## Differentialrechnung


### Differenzierbarkeit

#### Sekanten-Steigung und Differentialquotient

Sei  $f$  eine Funktion und  $[x_0, x_0 + h]$  ein Intervall im Definitionsbereich von  $f$ . Der Quotient

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

heisst Differentialquotient von  $f$ .



#### Differenzierbarkeit

$f$  ist in  $x_0$  **differenzierbar**, falls der Grenzwert  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$  existiert.

Ist dies der Fall, wird der Grenzwert mit  $f'(x)$  bezeichnet.

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Den Grenzwert selbst bezeichnet man als Ableitung.

Vereinfacht: Eine Funktion ist differenzierbar, falls die Kurve keine Knicke macht.

#### Tangentengleichung

$$y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)$$

**Stetige Differenzierbarkeit** Eine Funktion ist stetig differenzierbar, wenn sie differenzierbar ist und ihre Ableitungsfunktion stetig ist.

#### n-fache Differenzierbarkeit

- Für  $n \geq 2$  ist  $f$  **n-mal differenzierbar** in  $D$  falls  $f^{n-1}$  in  $D$  differenzierbar ist. Dann ist  $f^{(n)} := (f^{(n-1)})'$  und nennt sich die  $n$ -te Ableitung von  $f$ .
- Die Funktion  $f$  ist **n-mal stetig differenzierbar** in  $D$ , falls sie  $n$ -mal differenzierbar ist und falls  $f^{(n)}$  in  $D$  stetig ist.
- Die Funktion  $f$  ist in  $D$  **glatt**, falls sie  $\forall n \geq 1$ ,  $n$ -mal differenzierbar ist.

- exp, sin, cos, sinh, cosh, tanh sind glatt auf  $\mathbb{R}$
- Alle Polynome sind auf ganz  $\mathbb{R}$  glatt
- ln : ]0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R} ist glatt

#### Rechnen mit höheren Ableitungen

Sei  $D \subseteq \mathbb{R}$ ,  $n \geq 1$  und  $f, g \rightarrow \mathbb{R}$   $n$ -mal differenzierbar in  $D$ .

- $f + g$  ist  $n$ -mal differenzierbar und  $(f + g)^{(n)} = f^{(n)} + g^{(n)}$
- $f \cdot g$  ist  $n$ -mal differenzierbar und
$$(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}.$$
- $\frac{f}{g}$  ist  $n$ -mal differenzierbar falls  $g(x) \neq 0, \forall x \in D$
- $(g \circ f)$  ist  $n$ -mal differenzierbar

## Funktionen untersuchen

### Monotonie

Sei  $y = f(x)$  eine differenzierbare Funktion in  $D$  mit  $x_0 \in D$ .

- $f'(x_0) = 0 \Rightarrow f$  konstant, bzw. horizontale Tangente
- $f'(x_0) > 0 \Rightarrow f$  streng monoton wachsend.
- $f'(x_0) < 0 \Rightarrow f$  streng monoton fallend.

### Krümmung

Zusammenhang zwischen 2. Ableitung und Krümmung:

- $f''(x_0) > 0$  Konvex (Nach links/oben gekrümmt)
- $f''(x_0) < 0$  Konkav (Nach rechts/unten gekrümmt)
- $f''(x_0) = 0$  Keine eindeutige Krümmung

Bmk: Die Summe zweier konvexer Funktionen ist konvex. (konkav analog)


### Quadratische Funktionen $y = ax^2 + bx + c$

#### Nullstellen

- $y = a(x - x_1)(x - x_2)$
- $x_0 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

#### Scheitelpunkt

- $y = a(x - x_0)^2 + y_0$
- $S = \left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a}\right)$



**Berechnung Wendetangente** Lösen der Gleichung  $f''(x) = 0 \rightarrow x_0$ .

Bedingungen: Sei  $y = f(x)$  dreimal differenzierbar

- $f''(x_0) = 0$
- $f^{(3)}(x_0) \neq 0 \rightarrow$  Wendepunkt
- Falls zusätzlich  $f'(x_0) = 0 \rightarrow$  Sattelpunkt

### Allgemeines Kriterium

Sei  $f(x)$  eine genügend oft differenzierbare Funktion

- $f'(x_0) = 0$

Sei  $n$  die Ordnung der ersten nicht verschwindenden Ableitung von  $f(x)$  an der Stelle  $x_0$ :

- $f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$
- $f^{(n)}(x_0) \neq 0$

Schlussfolgerungen:


- Wenn  $n$  gerade, dann gibt es ein relatives Extremum ( $f^{(n)}(x_0) \neq 0$ )
- Wenn  $n$  ungerade, dann hat  $f(x)$  an der Stelle  $x_0$  einen Wendepunkt und damit einen Sattelpunkt

### Vorgehen Wende- und Sattelpunkte

- Erste und zweite Ableitung
- Wendepunkt bestimmen
  - $f''(x_0) = 0 \rightarrow x_0$
  - $f^{(3)}(x_0) \neq 0$
- Sattelpunkte bestimmen
  - $f'(x_0) = 0$
  - $f''(x_0) = 0$
  - ...
  - $f^{(n)}(x_0) \neq 0$
  - Gerade  $\rightarrow$  relatives Extremum
  - Ungerade  $\rightarrow$  Sattelpunkt
- $x_0$  in ursprüngliche Gleichung einsetzen

### Relative Extrema

- Relative Extremal-Stelle  $x_0 \Rightarrow$  Minimal-/Maximalstelle
- Relatives Extremum  $y_0 \Rightarrow$  Maximum/Minimum
- Relativer Extremal-Punkt  $P_0 = (x_0, y_0) \Rightarrow$  Hoch-/Tiefpunkt



**Vorgehen relative Extrema** von  $f(x) = y$ :

- Bestimme  $f'(x)$  (Erste Ableitung)
- Bestimme NST von  $f'(x)$   
 $f'(x) = 0 \Rightarrow x$  lokales Extremum
- Bestimme  $f''(x)$  (Zweite Ableitung)
  - $f''(x) = 0 \Rightarrow$  siehe Vorgehen Wende- und Sattelpunkte
  - $f''(x) < 0 \Rightarrow$  relatives Maximum
  - $f''(x) > 0 \Rightarrow$  relatives Minimum
- In Gleichung  $f(x) = y$  einsetzen
  - Hochpunkt/Tiefpunkt =  $P(x, y)$

### Transformation: Funktionen zeichnen

- $y = f(x) \rightarrow y = f(ax)$  : Streckung des Graphen um Faktor  $\frac{1}{a}$  in  $x$  Richtung
- $y = f(x) \rightarrow y = f(x + b)$  : Verschiebung des Graphen um  $|b|$  in  $x$  Richtung
- $y = f(x) \rightarrow y = cf(x)$  : Streckung des Graphen um Faktor  $c$  in  $y$  Richtung
- $y = f(x) \rightarrow y = f(x) + d$  : Verschiebung des Graphen um  $d$  Einheiten in  $y$  Richtung

### Graphen von Polynomen

- Hat so viele Nullstellen wie Grad des Polynoms (Fundamentalsatz der Algebra)
- bei Faktorisiertem angeben, noch Vorfaktor beachten  $\Rightarrow$  Falls Punkt gegeben kann dieser berechnet werden
- für jede Nullstelle:
  - Einfach: Schneidend
  - Doppelt: Berührend
  - Dreifach: Wie  $x^3$
- für Asymptoten: anlehnd