


## Deskriptive Statistik

### Begriffe

#### Grundlegende Begriffe

- $\Omega$  = Grundgesamtheit
- $n$  = Anzahl Objekte
- $X$  = Stichprobenwerte
- $a$  = Ausprägungen
- $h$  = Absolute Häufigkeit
- $f$  = Relative Häufigkeit
- $H$  = Kumulative Absolute Häufigkeit
- $F$  = Kumulative Relative Häufigkeit



#### Statistische Grundbegriffe

- **Merkmalsträger/Statistische Einheiten:** Objekte, an denen interessierende Grössen beobachtet werden
- **Grundgesamtheit:** Alle statistischen Einheiten, über die Aussagen gewonnen werden sollen
- **Vollerhebung:** Eigenschaften werden bei jedem Individuum in der Grundgesamtheit erhoben
- **Stichprobe:** Untersuchte Teilmenge der Grundgesamtheit (repräsentativ)
- **Merkmal:** Interessierende Grösse, die an den Einheiten beobachtet wird

#### Merkmalstypen

- **Qualitativ/Kategoriell:** Ausprägung und kein Ausmass (endlich viele Ausprägungen)
  - **Nominal:** Reine Kategorisierung (z.B. Parteien bei Wahlen)
  - **Ordinal:** Ordnung vorhanden (z.B. Schulnoten)
- **Quantitativ/Metrisch:** Ausmass wird mit Zahlen angegeben
  - **Diskret:** Abzählbar viele Ausprägungen (z.B. Würfelwurf)
  - **Stetig:** Alle Ausprägungen in einem reellen Intervall (z.B. Länge)

## Häufigkeiten und Verteilungsfunktionen (PMF, CDF)

### Absolute und relative Häufigkeiten

#### Absolute Häufigkeit $H$

$$H = \sum_{i=1}^n h_i$$

$h_i$ : Einzelhäufigkeit der  $i$ -ten Beobachtung  
 $n$ : Anzahl der Beobachtungen.

#### Relative Häufigkeit $F$

$$F = \sum_{i=1}^n f_i, \quad F(x) = \frac{H(x)}{n}$$

$f_i$ : Einzelrelative Häufigkeit der  $i$ -ten Beobachtung  
 $H(x)$ : Absolute Häufigkeit eines Wertes  $x$

## Kumulative Verteilungsfunktion (CDF)

### Nicht klassierte Daten (PMF und CDF)

Die absolute Häufigkeit kann als Funktion  $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  bezeichnet werden.

$$h_i$$

$h_i$ : Absolute Häufigkeit der  $i$ -ten Beobachtung.

Die relative Häufigkeit kann als Funktion  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  bezeichnet werden.

$$f_i = \frac{h_i}{n}$$

$f_i$ : Relative Häufigkeit der  $i$ -ten Beobachtung,  
 $h_i$ : Absolute Häufigkeit der  $i$ -ten Beobachtung,  
 $n$ : Anzahl der Beobachtungen.

### Erstellen einer Häufigkeitsverteilung

1. Sammle alle verschiedenen Werte
2. Zähle absolute Häufigkeiten:
  - Wie oft kommt jeder Wert vor?
3. Berechne relative Häufigkeiten:
  - Teile jede absolute Häufigkeit durch  $n$
4. Berechne kumulative Häufigkeiten:
  - Absolute: Summiere  $h_i$  von links nach rechts
  - Relative: Summiere  $f_i$  von links nach rechts

## Verteilungsfunktionen für diskrete und stetige Daten

### Unterschied zwischen PMF und PDF

- **PMF (Probability Mass Function):**
  - Für diskrete Daten
  - Wahrscheinlichkeit für exakte Werte
  - Summe aller Wahrscheinlichkeiten = 1
- **PDF (Probability Density Function):**
  - Für stetige Daten
  - Fläche unter Kurve gibt Wahrscheinlichkeit
  - Integral über gesamten Bereich = 1

### Diskrete Verteilungsfunktionen

Die absolute Häufigkeit kann als Funktion  $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  bezeichnet werden:

$$h_i$$

Die relative Häufigkeit kann als Funktion  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  bezeichnet werden:

$$f_i = \frac{h_i}{n}$$

## Diskrete Häufigkeitsverteilung

$a_i$	397	398	399	400	Total
$h_i$	1	3	7	5	16
$f_i$	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{5}{16}$	1
$H_i$	1	4	11	16	
$F_i$	$\frac{1}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{11}{16}$	$\frac{16}{16}$	

## Klassierte Stichproben

### Häufigkeiten bei nicht-klassierten Daten

- **Absolute Häufigkeit  $h_i$ :** Anzahl Vorkommen des Wertes  $a_i$
- **Relative Häufigkeit  $f_i$ :**  $f_i = \frac{h_i}{n}$
- **Kumulative absolute Häufigkeit  $H_i$ :**  $H_i = \sum_{j=1}^i h_j$
- **Kumulative relative Häufigkeit  $F_i$ :**  $F_i = \sum_{j=1}^i f_j = \frac{H_i}{n}$

**Häufigkeiten bei klassierten Daten** Bei grossen Stichproben metrisch stetiger Merkmale werden die Werte in Klassen eingeteilt:

- Klassen sind aneinandergrenzende Intervalle
- Obere Intervallgrenzen gehören zum nächsten Intervall
- Relative Häufigkeit einer Klasse = Anzahl Werte in Klasse / Stichprobengrösse
- Relative Häufigkeitsdichte = Relative Häufigkeit / Klassenbreite

### Klasseneinteilung Faustregeln:

- Klassen sollten gleich breit gewählt werden
- Anzahl Klassen zwischen 5 und 20
- Anzahl Klassen sollte  $\sqrt{n}$  nicht überschreiten
- Klassenbreite =  $\frac{\text{Max} - \text{Min}}{\text{Anzahl Klassen}}$

**Häufigkeitsverteilung** Noten einer Klasse: 3.5, 4.0, 4.0, 4.5, 4.5, 4.5, 5.0, 5.0, 5.5, 6.0

- $n = 10$  (Stichprobengrösse)
- Absolute Häufigkeiten:  $h_{3.5} = 1, h_{4.0} = 2, h_{4.5} = 3, h_{5.0} = 2, h_{5.5} = 1, h_{6.0} = 1$
- Relative Häufigkeiten:  $f_{3.5} = 0.1, f_{4.0} = 0.2, f_{4.5} = 0.3, f_{5.0} = 0.2, f_{5.5} = 0.1, f_{6.0} = 0.1$
- Kumulative absolute Häufigkeiten:  $H_{3.5} = 1, H_{4.0} = 3, H_{4.5} = 6, H_{5.0} = 8, H_{5.5} = 9, H_{6.0} = 10$

### Klassenbildung für stetige Daten

1. Bestimme Spannweite (Max - Min)
2. Wähle Anzahl Klassen  $k$ :
  - $5 \leq k \leq 20$
  - $k \leq \sqrt{n}$
3. Berechne Klassenbreite:
  - $d = \frac{\text{Spannweite}}{k}$
  - Runde auf praktische Zahl
4. Bestimme Klassengrenzen:
  - Start bei Min oder praktischem Wert darunter
  - Ende bei Max oder praktischem Wert darüber
5. Zähle Häufigkeiten in jeder Klasse

Klassenbildung (Faustregeln)

- Die Klassen sollten gleich breit gewählt werden
- Die Anzahl der Klassen sollte zwischen 5 und 20 liegen, jedoch  $\sqrt{n}$  nicht überschreiben
- Klassengrenzen sollten 'runde' Zahlen sein
- Werte auf Klassengrenzen kommen in die obere Klasse

Stetige Verteilungsfunktionen

Die absolute Häufigkeitsdichtefunktion erhält man, indem der Wert der absoluten Häufigkeit  $h_i$  durch die Klassenbreite (Säulenbreite)  $d_i$  geteilt wird:

$$h(x) = \frac{h_i}{d_i}$$

Die relative Häufigkeitsdichtefunktion (PDF)  $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$  erhält man aus der absoluten Häufigkeitsdichtefunktion, indem man den Wert durch die Stichprobengrösse  $n$  teilt:

$$\text{PDF} = f(x) = \frac{h(x)}{n}$$

Stetige Häufigkeitsverteilung

Klassen	[100,200)	[200,500)	[500,800)	[800,1000)	Total
$h_i$	35	182	317	84	618
$f_i$	$\frac{35}{618}$	$\frac{182}{618}$	$\frac{317}{618}$	$\frac{84}{618}$	Area = 1
$d_i$	100	300	300	200	
$h(x)$	$\frac{35}{100}$	$\frac{182}{300}$	$\frac{317}{300}$	$\frac{84}{200}$	
$f(x)$	$\frac{35}{100 \cdot 618}$	$\frac{182}{300 \cdot 618}$	$\frac{317}{300 \cdot 618}$	$\frac{84}{200 \cdot 618}$	

Berechnung von PDF und CDF für klassierte Daten

- PDF Berechnung:
  - Bestimme für jede Klasse:
    - Absolute Häufigkeit  $h_i$
    - Klassenbreite  $d_i$
  - Berechne Häufigkeitsdichte:
    - $h(x) = \frac{h_i}{d_i}$
  - Berechne relative Häufigkeitsdichte:
    - $f(x) = \frac{h(x)}{n}$
- CDF Berechnung:
  - Bestimme kumulative Häufigkeiten  $H_i$
  - Teile durch Stichprobengrösse:
    - $F(x) = \frac{H(x)}{n}$

Kenngrössen

Quantile

Quantil

$$i = \lceil n \cdot q \rceil, \quad Q = x_i = x_{\lceil n \cdot q \rceil}$$

$i$ : Position des Quantils,  
 $n$ : Anzahl der Beobachtungen,  
 $q$ : Quantilswert (z. B. 0.25 für das erste Quartil),  
 $x_i$ : Beobachtung an Position  $i$ .

Interquartilsabstand

$$IQR = Q_3 - Q_1$$

$IQR$ : Interquartilsabstand,  
 $Q_3$ : Oberes Quartil (75. Perzentil),  
 $Q_1$ : Unteres Quartil (25. Perzentil).

Berechnung von Lagekennwerten

- Sortiere die Daten aufsteigend
- Berechne den Mittelwert:
  - Summe aller Werte / Anzahl Werte
- Bestimme den Median:
  - Bei ungerader Anzahl: mittlerer Wert
  - Bei gerader Anzahl: Mittelwert der beiden mittleren Werte
- Finde den Modus (häufigster Wert)
- Berechne die Quartile:
  - Q1: 25%-Quantil
  - Q2: Median (50%-Quantil)
  - Q3: 75%-Quantil

**Berechnung von Quantilen** Gegeben sei die Datenreihe: 2, 4, 4, 5, 7, 8, 9, 10  
 $n = 8$  Beobachtungen

Berechnung Q1 (25%-Quantil):

- $i = \lceil 8 \cdot 0.25 \rceil = \lceil 2 \rceil = 2$
- $Q1 = x_2 = 4$

Berechnung Q2 (Median):

- $n$  gerade  $\rightarrow$  Mittelwert von Position 4 und 5
- $Q2 = (5 + 7) / 2 = 6$

Berechnung Q3 (75%-Quantil):

- $i = \lceil 8 \cdot 0.75 \rceil = \lceil 6 \rceil = 6$
- $Q3 = x_6 = 8$


Interquartilsabstand:

- $IQR = Q3 - Q1 = 8 - 4 = 4$

Boxplot

Boxplot

- $Q_1, Q_2 = x_{\text{med}}, Q_3$  (Quartile)
- $IQR = Q_3 - Q_1$  (Interquartilsabstand)
- Untere Antenne  $x_u$  :  
 $u = \min[Q_1 - 1.5 \cdot IQR, Q_1]$
- Obere Antenne  $x_o$  :  
 $o = \max[Q_3 + 1.5 \cdot IQR, Q_3]$
- Ausreisser:  $x_i < x_u \vee x_i > x_o$



Erstellen eines Boxplots

- Berechne die Quartile  $Q_1$ ,  $Q_2$  (Median) und  $Q_3$
- Bestimme den Interquartilsabstand  $IQR = Q_3 - Q_1$
- Berechne die Grenzen für Ausreisser:
  - Untere Grenze:  $Q_1 - 1.5 \cdot IQR$
  - Obere Grenze:  $Q_3 + 1.5 \cdot IQR$
- Zeichne Box mit:
  - Unterer Rand bei  $Q_1$
  - Mittellinie bei  $Q_2$
  - Oberer Rand bei  $Q_3$
- Zeichne Antennen bis zum:
  - Kleinsten Wert  $\geq$  untere Grenze
  - Grössten Wert  $\leq$  obere Grenze
- Markiere alle Werte ausserhalb als Ausreisser

**Boxplot - Praktisches Beispiel** Gegeben sind folgende Messwerte: 2,

- 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 50
- Sortiere Werte: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 50
  - Bestimme Quartile:
    - $Q_1 = 4$  (25%-Quantil)
    - $Q_2 = 7$  (Median)
    - $Q_3 = 12$  (75%-Quantil)
  - $IQR = 12 - 4 = 8$
  - Ausreisser-Grenzen:
    - Untere:  $4 - 1.5 \cdot 8 = -8$
    - Obere:  $12 + 1.5 \cdot 8 = 24$
  - 50 ist ein Ausreisser ( $> 24$ )

Lagekennwerte

Lageparameter

Modus

$x_{\text{mod}} =$  Häufigste Wert

Arithmetisches Mittel

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^m a_i \cdot f_i$$

$\bar{x}$ : Arithmetisches Mittel,  
 $n$ : Anzahl der Beobachtungen,  
 $x_i$ : Einzelbeobachtung,  
 $a_i$ : Klassenmitte,  
 $f_i$ : Relative Häufigkeit der Klasse  $i$ .

Median

$$\begin{cases} x_{\lceil \frac{n+1}{2} \rceil} & n \text{ ungerade} \\ 0.5 \cdot \left( x_{\lceil \frac{n}{2} \rceil} + x_{\lceil \frac{n}{2} + 1 \rceil} \right) & n \text{ gerade} \end{cases}$$

$n$ : Anzahl der Beobachtungen,  
 $x_{[k]}$ : Beobachtung an der  $k$ -ten Position.

**Vergleich der Lageparameter** Gegeben seien folgende Datensätze:

- A: 2, 2, 3, 4, 5, 8, 12
- B: 2, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 8

**Datensatz A:**

- Mittelwert:  $\bar{x}_A = 5$
- Median:  $x_{med_A} = 4$
- Modus:  $x_{mod_A} = 2, 4$  (bimodal)

**Datensatz B:**

- Mittelwert:  $\bar{x}_B = 4.5$
- Median:  $x_{med_B} = 4$
- Modus:  $x_{mod_B} = 4$

Vergleich zeigt:

- Mittelwert reagiert empfindlich auf Ausreißer (A)
- Median ist robuster gegen Ausreißer
- Modus zeigt Häufungen, kann mehrfach auftreten

## Streuungskennwerte

### Streuungskennwerte

#### Stichprobenvarianz $s^2$ (Streumasse)

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2, \quad (s_{\text{kor}})^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

$$(s_{\text{kor}})^2 = \frac{n}{n-1} \cdot s^2$$

$s^2$ : Stichprobenvarianz,

$s_{\text{kor}}^2$ : Korrigierte Stichprobenvarianz,

$x_i$ : Einzelbeobachtung,

$\bar{x}$ : Arithmetisches Mittel,

$n$ : Anzahl der Beobachtungen.

#### Berechnung der Stichprobenvarianz

1. Berechne den Mittelwert  $\bar{x}$
2. Für jeden Wert  $x_i$ :
  - 2.1 Berechne Abweichung vom Mittelwert  $(x_i - \bar{x})$
  - 2.2 Quadriere die Abweichung  $(x_i - \bar{x})^2$
3. Summiere alle quadrierten Abweichungen
4. Teile durch  $(n-1)$  für korrigierte Varianz
5. Alternative Berechnung:
  - 5.1 Berechne  $\overline{x^2}$  (Mittelwert der quadrierten Werte)
  - 5.2 Berechne  $(\bar{x})^2$  (Quadrat des Mittelwerts)
  - 5.3 Varianz  $= \overline{x^2} - (\bar{x})^2$

#### Standardabweichung $s$ (Streumasse)

$$s = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{\overline{x^2} - \bar{x}^2}, \quad s_{\text{kor}} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$s$ : Standardabweichung,

$s_{\text{kor}}$ : Korrigierte Standardabweichung,

$x_i$ : Einzelbeobachtung,

$\bar{x}$ : Arithmetisches Mittel,

$n$ : Anzahl der Beobachtungen.

## Berechnung der Standardabweichung

**Berechnung von Varianz und Standardabweichung** Gegeben sei die

Datenreihe: 2, 4, 4, 6, 9

**Schritt 1:** Mittelwert berechnen

$$\bar{x} = \frac{2 + 4 + 4 + 6 + 9}{5} = 5$$

**Schritt 2:** Abweichungen quadrieren

$x_i$	$(x_i - \bar{x})$	$(x_i - \bar{x})^2$
2	-3	9
4	-1	1
4	-1	1
6	1	1
9	4	16

**Schritt 3:** Varianz berechnen

$$s_{\text{kor}}^2 = \frac{9 + 1 + 1 + 1 + 16}{5 - 1} = \frac{28}{4} = 7$$

**Schritt 4:** Standardabweichung berechnen

$$s_{\text{kor}} = \sqrt{7} \approx 2.65$$

**Alternative Berechnung:**

- $\overline{x^2} = \frac{4+16+16+36+81}{5} = 30.6$
- $(\bar{x})^2 = 5^2 = 25$
- $s^2 = 30.6 - 25 = 5.6$
- $s_{\text{kor}}^2 = \frac{5}{4} \cdot 5.6 = 7$

## Form der Verteilung

### Deskriptive Statistik Multivarianz

## Bivariate Daten

### Bivariate Daten (Merkmale)

Bivariate Daten beschreiben zwei Merkmale desselben Merkmalsträgers.

Die Darstellung hängt von den Merkmalstypen ab:

- 2x kategoriell → Kontingenztabelle + Mosaikplot
- 1x kategoriell + 1x metrisch → Boxplot oder Stripchart
- 2x metrisch → Streudiagramm

## Grafische Darstellung

### Erstellen einer Kontingenztabelle

1. Identifiziere die Ausprägungen beider kategorieller Merkmale
2. Erstelle eine Tabelle mit:
  - Zeilen für Ausprägungen des ersten Merkmals
  - Spalten für Ausprägungen des zweiten Merkmals
3. Zähle die Häufigkeiten für jede Kombination
4. Füge Randsummen für Zeilen und Spalten hinzu
5. Optional: Berechne relative Häufigkeiten

**Kontingenztabelle** Studierende nach Studiengang und Geschlecht:

	Männlich	Weiblich	Total
Informatik	120	30	150
Wirtschaft	80	70	150
Total	200	100	300

### Graphische Darstellung

- **Form** linear / gekrümmt
  - Linear: Punkte streuen um Gerade
  - Gekrümmt: Systematische Abweichung von Gerade
- **Richtung** positiver / negativer Zusammenhang
  - Positiv:  $y$  steigt mit  $x$
  - Negativ:  $y$  fällt mit steigendem  $x$
- **Stärke** starke / schwache Streuung
  - Stark: Punkte nahe an Linie/Kurve
  - Schwach: Große Streuung um Trend

## Korrelation

### Varianz und Kovarianz

#### Abkürzungen

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{Mittelwert der x-Werte})$$

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \quad (\text{Mittelwert der y-Werte})$$

$$\overline{xy} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i \quad (\text{Mittelwert der Produkte})$$

### Varianz und Kovarianz

**Varianz**  $s_x^2, s_y^2$ :

$$(s_x)^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2, \quad (s_y)^2 = \overline{y^2} - \bar{y}^2$$

**Kovarianz**  $s_{xy}$ :

$$s_{xy} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}), \quad s_{xy} = \overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}$$

### Berechnung der Kovarianz

1. Methode 1 (direkte Formel):
  - 1.1 Berechne Mittelwerte  $\bar{x}$  und  $\bar{y}$
  - 1.2 Für jedes Paar  $(x_i, y_i)$ :
    - Berechne  $(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$
  - 1.3 Summiere alle Produkte
  - 1.4 Teile durch  $n$
2. Methode 2 (schnellere Berechnung):
  - 2.1 Berechne  $\overline{xy}$  (Mittelwert der Produkte)
  - 2.2 Berechne  $\bar{x} \cdot \bar{y}$
  - 2.3 Kovarianz  $= \overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}$

Berechnung von Kovarianz und Korrelation Gegeben seien die Wertepaare:

(1, 2), (2, 4), (3, 5), (4, 8)

Schritt 1: Mittelwerte berechnen

$\bar{x} = \frac{1+2+3+4}{4} = 2.5, \quad \bar{y} = \frac{2+4+5+8}{4} = 4.75$

Schritt 2: Kovarianz berechnen

- $\overline{xy} = \frac{2+8+15+32}{4} = 14.25$
- $\bar{x} \cdot \bar{y} = 2.5 \cdot 4.75 = 11.875$
- $s_{xy} = 14.25 - 11.875 = 2.375$

Schritt 3: Korrelationskoeffizient berechnen

- $s_x^2 = \frac{1+4+9+16}{4} - 2.5^2 = 1.25$
- $s_y^2 = \frac{4+16+25+64}{4} - 4.75^2 = 5.6875$
- $r_{xy} = \frac{2.375}{\sqrt{1.25 \cdot 5.6875}} = 0.894$

Rang-Varianz und Kovarianz

Varianz (Ränge)  $(s_{rg(x)})^2, (s_{rg(y)})^2$ :

$(s_{rg(x)})^2 = \overline{rg(x)^2} - (\overline{rg(x)})^2, \quad (s_{rg(y)})^2 = \overline{rg(y)^2} - (\overline{rg(y)})^2$

Kovarianz (Ränge)  $s_{rg(xy)}$ :

$s_{rg(xy)} = \overline{rg(xy)} - \overline{rg(x)} \cdot \overline{rg(y)} = \overline{rg(xy)} - \frac{(n+1)^2}{4}$

Rangberechnung und Bindungen

- Sortiere die Werte aufsteigend
- Weise Ränge zu:
  - Kleinster Wert: Rang 1
  - Zweitkleinster: Rang 2
  - usw.
- Bei Bindungen (gleiche Werte):
  - Identifiziere gleiche Werte
  - Berechne Durchschnittsrang:
    - Durchschnittsrang =  $\frac{\text{Summe der Rangplätze}}{\text{Anzahl gebundener Werte}}$
  - Weise allen gleichen Werten diesen Rang zu

Rangberechnung mit Bindungen Gegeben sei die Datenreihe: 3, 7, 7, 4, 9, 7, 2

Schritt 1: Sortieren

2, 3, 4, 7, 7, 9

Schritt 2: Ränge zuweisen

- 2: Rang 1
- 3: Rang 2
- 4: Rang 3
- 7: Durchschnittsrang  $\frac{4+5+6}{3} = 5$
- 9: Rang 7

Schritt 3: Finale Rangzuordnung

Wert	3	7	7	4	9	7	2
Rang	2	5	5	3	7	5	1

Korrelationskoeffizienten

Der Korrelationskoeffizient (Pearson)  $r_{xy}$

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sqrt{\overline{x^2} - \bar{x}^2} \cdot \sqrt{\overline{y^2} - \bar{y}^2}}$$

Ist der Korrelationskoeffizient  $r_{xy}$ :

- $r_{xy} \approx 1 \rightarrow$  starker positiver linearer Zusammenhang
- $r_{xy} \approx -1 \rightarrow$  starker negativer linearer Zusammenhang
- $r_{xy} \approx 0 \rightarrow$  keine lineare Korrelation

Interpretation des Korrelationskoeffizienten Verschiedene Datensätze mit jeweils 20  $(x, y)$ -Paaren:

Fall A:  $r_{xy} = 0.95$

- Starker positiver linearer Zusammenhang
- $y$  steigt fast proportional mit  $x$
- Nur geringe Streuung um die Regressionsgerade

Fall B:  $r_{xy} = -0.82$

- Starker negativer linearer Zusammenhang
- $y$  sinkt mit steigendem  $x$
- Moderate Streuung vorhanden

Fall C:  $r_{xy} = 0.12$

- Kaum linearer Zusammenhang
- Starke Streuung der Punkte
- Möglicherweise nichtlinearer Zusammenhang

Korrelationskoeffizient (Spearman)  $r_{sp}$

$$r_{sp} = \frac{s_{rg(xy)}}{s_{rg(x)} \cdot s_{rg(y)}} = \frac{\overline{rg(xy)} - \overline{rg(x)} \cdot \overline{rg(y)}}{\sqrt{\overline{rg(x)^2} - (\overline{rg(x)})^2} \cdot \sqrt{\overline{rg(y)^2} - (\overline{rg(y)})^2}}$$

Vereinfachte Formel, sofern alle Ränge unterschiedlich sind:

$$r_{sp} = 1 - \frac{6 \cdot \sum_{i=1}^n d_i^2}{n \cdot (n^2 - 1)}, \quad \text{mit } d_i = rg(x_i) - rg(y_i)$$

Ränge

Der Rang  $rg(x_i)$  des Stichprobenwertes  $x_i$  ist definiert als der Index von  $x_i$  in der nach der Grösse geordneten Stichprobe.

$i$	1	2	3	4	5	6
$x_i$	23	27	35	35	42	59
$rg(x_i)$	1	2	3.5	3.5	5	6

Berechnung des Spearman-Korrelationskoeffizienten

- Weise beiden Merkmalen Ränge zu:
  - Sortiere x-Werte, vergebe Ränge
  - Sortiere y-Werte, vergebe Ränge
  - Bei Bindungen: Durchschnittsränge
- Falls keine Bindungen vorhanden:
  - Berechne Rangdifferenzen  $d_i$
  - Quadriere Differenzen  $d_i^2$
  - Summiere quadrierte Differenzen
  - Verwende Formel:  $r_{sp} = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$
- Bei Bindungen:
  - Berechne Rangmittelwerte
  - Berechne Rangvarianzen und -kovarianz
  - Verwende allgemeine Formel

Vergleich Pearson und Spearman Gegeben seien die Wertepaare:

(1, 1), (2, 4), (3, 9), (4, 16), (5, 25)

Pearson-Korrelation:

- Zeigt starken linearen Zusammenhang
- $r_{xy} = 0.975$

Spearman-Korrelation:

- Perfekter monotoner Zusammenhang
- $r_{sp} = 1.000$

Vergleich:

- Pearson erfasst nur linearen Zusammenhang
- Spearman erfasst jeden monotonen Zusammenhang
- Hier: Quadratischer Zusammenhang
- Spearman robuster gegen Ausreißer

Wahl des Korrelationskoeffizienten

- Pearson verwenden wenn:**
  - Linearer Zusammenhang vermutet
  - Keine/wenige Ausreißer
  - Metrische Daten
- Spearman verwenden wenn:**
  - Nichtlinearer monotoner Zusammenhang
  - Ausreißer vorhanden
  - Ordinale Daten
  - Robustheit wichtig

Grenzen der Korrelation

Prüfung auf Scheinkorrelation

- Betrachte die Datenpunkte im Streudiagramm:
  - Gibt es Ausreißer?
  - Ist der Zusammenhang wirklich linear?
- Überlege fachlich:
  - Gibt es plausible Kausalität?
  - Könnte ein drittes Merkmal beide beeinflussen?
- Prüfe Teilstichproben:
  - Bleibt Korrelation in Untergruppen bestehen?
  - Ändert sich die Stärke deutlich?
- Bei Zweifeln:
  - Spearman-Korrelation prüfen
  - Weitere Merkmale einbeziehen
  - Fachexperten konsultieren

Bemerkungen

Auch wenn zwischen zwei Grössen eine Korrelation besteht, so muss das noch lange nicht einen **kausalen Zusammenhang** bedeuten. Man spricht von **Schein-korrelation** wenn:

- Ein drittes Merkmal beide beeinflusst
- Der Zusammenhang zufällig ist
- Ausreißer das Ergebnis verzerren
- Ein nichtlinearer Zusammenhang vorliegt

Kombinatorik

Grundlegende Methoden des Abzählens

Entscheidungsweg für kombinatorische Probleme

- 1. Bestimme die relevanten Parameter
  - n: Wie viele Objekte gibt es insgesamt?
  - k: Wie viele Objekte sollen ausgewählt werden?
- 2. Prüfe die Reihenfolge
  - Spielt die Reihenfolge eine Rolle? → Variation
  - Ist nur die Auswahl wichtig? → Kombination
- 3. Prüfe Wiederholungen
  - Können Objekte mehrfach gewählt werden? → Mit Wiederholung
  - Darf jedes Objekt nur einmal vorkommen? → Ohne Wiederholung
- 4. Wähle die passende Formel
  - Variation mit Wiederholung:  $n^k$
  - Variation ohne Wiederholung:  $\frac{n!}{(n-k)!}$
  - Kombination mit Wiederholung:  $\binom{n+k-1}{k}$
  - Kombination ohne Wiederholung:  $\binom{n}{k}$

Systematik

Grundbegriffe der Kombinatorik

Variation (mit Reihenfolge)		Kombination (ohne Reihenfolge)	
Mit Wiederholung	Ohne Wiederholung	Mit Wiederholung	Ohne Wiederholung
$n^k$	$\frac{n!}{(n-k)!}$	$\binom{n+k-1}{k}$	$\binom{n}{k}$
Zahlenschloss	Schwimmwettkampf	Zahnarzt	Lotto

Systematik der Kombinatorik

- Variation mit Wiederholung:  $n^k$
- Variation ohne Wiederholung:  $\frac{n!}{(n-k)!}$
- Kombination mit Wiederholung:  $\binom{n+k-1}{k}$
- Kombination ohne Wiederholung:  $\binom{n}{k}$

Binomialkoeffizienten

**Fakultät** Die Fakultät einer natürlichen Zahl n ist definiert als das Produkt aller positiven ganzen Zahlen bis zu dieser Zahl:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n = \prod_{k=1}^n k$$

mit 0! = 1 als Definitionsvereinbarung

- Parameter:**
- n = Die positive ganze Zahl, für die die Fakultät berechnet wird
  - k = Laufvariable in der Produktnotation
  - $\prod$  = Produkt aller Terme von k = 1 bis n

Berechnung von Fakultäten 1. Prüfe Spezialfälle:

- 0! = 1 (Definition)
- 1! = 1
- 2. Für n > 1:
  - Schreibe alle Zahlen von 1 bis n auf
  - Multipliziere der Reihe nach
  - Alternative: Nutze rekursive Definition  $n! = n \cdot (n - 1)!$

**Binomialkoeffizient** Der Binomialkoeffizient  $\binom{n}{k}$  gibt an, wie viele Möglichkeiten es gibt, k Objekte aus einer Gesamtheit von n Objekten auszuwählen:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$$

Parameter:

- n = Gesamtanzahl der Objekte in der Menge
- k = Anzahl der auszuwählenden Objekte (0 ≤ k ≤ n)
- n! = Fakultät von n
- (n - k)! = Fakultät von (n - k)
- k! = Fakultät von k

Wichtige Eigenschaften:

- $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$
- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$  (Symmetrie)
- $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$  (Pascal'sche Rekursion)

Schritte zur Berechnung von Binomialkoeffizienten

- 1. Prüfe Grundfälle -  $\binom{n}{0} = 1 - \binom{n}{n} = 1 - \binom{n}{1} = n$
- 2. Nutze Symmetrie -  $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
- 3. Pascal'sches Dreieck -  $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$
- 4. Direkte Berechnung -  $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

**Variation mit Wiederholung (Zahlenschloss) Aufgabe:** Wie viele Möglichkeiten gibt es bei einem Zahlenschloss (0 - 9) mit 6 Zahlenkränzen?

Lösung:

- n = 10 (Ziffern 0-9)
- k = 6 (Stellen)
- Reihenfolge wichtig: Ja (123456 ≠ 654321)
- Wiederholungen erlaubt: Ja (11111 ist möglich)
- Formel:  $n^k = 10^6 = 1\,000\,000$  mögliche Kombinationen

**Variation ohne Wiederholung (Schwimmwettkampf) Aufgabe:** Bei einem Schwimmwettkampf starten 10 Teilnehmer. Wie viele mögliche Platzierungen der ersten drei Plätze (Podest) gibt es?

Lösung:

- n = 10 (Teilnehmer)
- k = 3 (Podestplätze)
- Reihenfolge wichtig: Ja (1., 2., 3. Platz unterschiedlich)
- Wiederholungen erlaubt: Nein (niemand kann mehrere Plätze belegen)
- Formel:  $\frac{n!}{(n-k)!} = \frac{10!}{7!} = 720$  mögliche Platzierungen

**Kombination mit Wiederholung (Zahnarzt) Aufgabe:** 3 Spielzeuge werden aus 5 Töpfen gezogen. Jeder Topf ist mit einer (unterschiedlichen) Art von Spielzeug befüllt. Wie viele Möglichkeiten hat das Kind?

Lösung:

- n = 5 (Arten von Spielzeug)
- k = 3 (zu wählende Spielzeuge)
- Reihenfolge wichtig: Nein (nur Anzahl pro Art relevant)
- Wiederholungen erlaubt: Ja (mehrere Spielzeuge gleicher Art möglich)
- Formel:  $\binom{n+k-1}{k} = \binom{7}{3} = 35$  Möglichkeiten

**Kombination ohne Wiederholung (Lotto) Aufgabe:** Wie gross sind die Chancen beim Lotto 6 aus 49 Zahlen richtig zu ziehen?

Lösung:

- n = 49 (Zahlen insgesamt)
- k = 6 (zu wählende Zahlen)
- Reihenfolge wichtig: Nein (nur Auswahl relevant)
- Wiederholungen erlaubt: Nein (jede Zahl nur einmal)
- Formel:  $\binom{49}{6} = 13\,983\,816$  Möglichkeiten
- Gewinnwahrscheinlichkeit:  $\frac{1}{13\,983\,816} \approx 0.0000000715$

Variation mit Wiederholung (Zahlenschloss)

Wie viele Möglichkeiten gibt es bei einem Zahlenschloss (0 - 9) mit 6 Zahlenkränzen?

$$n = 10, \quad k = 6$$

$$n^k = 10^6$$

Variation ohne Wiederholung (Schimmwettkampf)

Bei einem Schwimmwettkampf starten 10 Teilnehmer. Wie viele mögliche Platzierungen der ersten drei Plätze (Podest) gibt es?

$$n = 10, \quad k = 3$$

$$\frac{n!}{(n-k)!} = \frac{10!}{(10-3)!} = \frac{10!}{7!}$$

Kombination mit Wiederholung (Zahnarzt)

3 Spielzeuge werden aus 5 Töpfen gezogen. Jeder Topf ist mit einer (unterschiedlichen) Art von Spielzeug befüllt. Wie viele Möglichkeiten hat das Kind?

$$n = 5, \quad k = 3$$

$$\binom{n+k-1}{k} = \binom{5+3-1}{3} = \binom{7}{3}$$

Kombination ohne Wiederholung (Lotto)

Wie gross sind die Chancen beim Lotto 6 aus 49 Zahlen richtig zu ziehen? Jede Zahl ist nur einmal vorhanden und die Zahlen werden nicht zurückgelegt. Die Reihenfolge in der gezogen wird spielt keine Rolle.

$$n = 49, \quad k = 6$$

$$\binom{n}{k} = \binom{49}{6}$$



## Lösen komplexer kombinatorischer Probleme 1. Problem zerlegen

- Teile das Problem in unabhängige Teilprobleme
  - Identifiziere abhängige Entscheidungen
- ### 2. Für jedes Teilproblem
- Bestimme  $n$  und  $k$
  - Prüfe Reihenfolge und Wiederholung
  - Wähle passende Formel
- ### 3. Kombiniere Teillösungen
- Unabhängige Ereignisse: Multipliziere
  - Sich ausschließende Ereignisse: Addiere
  - Prüfe Überlappungen (Inklusions-Exclusions)

**Komplexeres Beispiel: Passwörter** Aufgabe: Ein Passwort muss bestehen aus:

- Genau 8 Zeichen
- Mindestens ein Großbuchstabe (26 mögliche)
- Mindestens eine Ziffer (10 mögliche)
- Kleine Buchstaben erlaubt (26 mögliche)

**Lösung:** 1. Gesamtzahl aller möglichen 8-stelligen Passwörter mit den Zeichen:

- $n = 26 + 26 + 10 = 62$  Zeichen
  - Variation mit Wiederholung:  $62^8$
2. Abziehen der ungültigen Kombinationen:
- Ohne Großbuchstaben:  $(36)^8$
  - Ohne Ziffern:  $(52)^8$
  - Ohne beide:  $(26)^8$
3. Nach dem Inklusions-Exclusions-Prinzip:

$$\text{Gültige Passwörter} = 62^8 - 36^8 - 52^8 + 26^8$$

## Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung

### Diskrete Wahrscheinlichkeitsräume

**Ergebnisraum und Laplace-Raum** Der **Ergebnisraum**  $\Omega$  ist die Menge aller möglichen Ergebnisse des Zufallsexperiments. Die **Zähldichte**  $p: \Omega \rightarrow [0, 1]$  ordnet jedem Ereignis seine Wahrscheinlichkeit zu. Für einen **Laplace-Raum**  $(\Omega, P)$  gilt:

$$P(M) = \frac{|M|}{|\Omega|}$$

**Parameter:**

- $\Omega$  = Ergebnisraum (Menge aller möglichen Ergebnisse)
- $P(M)$  = Wahrscheinlichkeit des Ereignisses  $M$
- $|M|$  = Anzahl der für  $M$  günstigen Ergebnisse
- $|\Omega|$  = Anzahl aller möglichen Ergebnisse

### Begriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung

### Eigenschaften von diskreten Wahrscheinlichkeitsräumen

## Wahrscheinlichkeits Ausdrücke

- $P(A)$  = Wahrscheinlichkeit von Ereignis  $A$
- $P(B)$  = Wahrscheinlichkeit von Ereignis  $B$
- $P(\bar{A})$  = Wahrscheinlichkeit des Gegenereignisses von  $A$
- $P(B|A)$  = Wahrscheinlichkeit von  $B$  unter der Bedingung dass  $A$  eingetreten ist
- $P(B|\bar{A})$  = Wahrscheinlichkeit von  $B$  unter der Bedingung dass  $A$  nicht eingetreten ist
- $P(A \cap B)$  = Wahrscheinlichkeit dass beide Ereignisse eintreten
- $P(A \cup B)$  = Wahrscheinlichkeit dass mindestens eines der Ereignisse eintritt

## Wahrscheinlichkeitsregeln

- **Additionssatz:**  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- **Komplementärregel:**  $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- **Multiplikationssatz:**  $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = P(B) \cdot P(A|B)$
- **Totale Wahrscheinlichkeit:**  $P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})$
- **Satz von Bayes:**  $P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)}$
- **Bedingte Wahrscheinlichkeit:**  $P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$
- **Stochastische Unabhängigkeit:**  $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
- **Stochastische Unabhängigkeit (Zufallsvariablen):**  $P(X = x, Y = y) = P(X = x) \cdot P(Y = y)$

## Strategien zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten

### Grundlegende Strategien

- **Aufteilung in Kombinationen:** Komplexe Probleme in einfachere Teilprobleme zerlegen
- **Berechnung über Inverse:** Manchmal ist es einfacher, die Gegenwahrscheinlichkeit zu berechnen
- **Prozentrechnung:** Wahrscheinlichkeit / Gesamt-Wahrscheinlichkeit  $\cdot 100\%$
- **Vierfeldertafel:** Zur Übersicht bei zwei binären Merkmalen

## Grundschrte der Wahrscheinlichkeitsberechnung

- ### 1. Ergebnisraum identifizieren
- Alle möglichen Ergebnisse auflisten
  - Prüfen, ob es sich um einen Laplace-Raum handelt
- ### 2. Ereignis präzisieren
- Exakte mathematische Beschreibung des gesuchten Ereignisses
  - Zerlegung in Teilmengen falls nötig
- ### 3. Berechnungsstrategie wählen
- Direkte Berechnung:  $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$
  - Über Gegenereignis:  $P(A) = 1 - P(\bar{A})$
  - Über bedingte Wahrscheinlichkeit falls abhängig
- ### 4. Berechnung durchführen
- Kombinatorische Formeln anwenden
  - Zwischenergebnisse notieren
  - Probe durch Plausibilitätskontrolle

## Problemlösung mit Gegenereignis

### 1. Prüfe, ob Gegenereignis einfacher ist

- Original: "Mindestens eine...öder "Mehr als..."
- Gegenereignis: "Keine...öder "Höchstens..."

### 2. Berechne Wahrscheinlichkeit des Gegenereignis

- Oft einfacher zu zählen
- Weniger Fälle zu berücksichtigen

### 3. Wende Komplementärregel an

- $P(A) = 1 - P(\bar{A})$
- Überprüfe Plausibilität des Ergebnisses

## Zufallsvariablen und Verteilungen

### Kenngrossen

#### Erwartungswert und Varianz

### Kenngrossen von Zufallsvariablen Wichtige Eigenschaften:

- **Erwartungswert:**  $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ ,  $E(\alpha X) = \alpha E(X)$
- **Varianz:**  $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$
- **Standardabweichung:**  $S(X) = \sqrt{V(X)}$
- **Lineare Transformation:**  $V(\alpha X + \beta) = \alpha^2 \cdot V(X)$

### Kenngrossen (Varianz und Erwartungswert)

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y), \quad E(\alpha X) = \alpha E(X)$$

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \left[ \sum_{x \in \mathbb{R}} P(X = x) \cdot x^2 \right] - E(X)^2$$

$$V(\alpha X + \beta) = \alpha^2 \cdot V(X), \quad S(X) = \sqrt{V(X)}$$

$E(X)$  = Erwartungswert der Zufallsvariable  $X$

$V(X)$  = Varianz der Zufallsvariable  $X$

$S(X)$  = Standardabweichung der Zufallsvariable  $X$

$\alpha, \beta$  = Konstanten

$P(X = x)$  = Wahrscheinlichkeit, dass  $X$  den Wert  $x$  annimmt

$\sum_{x \in \mathbb{R}}$  = Summe über alle möglichen Werte von  $x$  in den reellen Zahlen

## Verteilungen und Erwartungswerte

Für diskrete Verteilungen:

$$E(X) = \sum_{x \in \mathbb{R}} f(x) \cdot x$$

$$V(X) = \sum_{x \in \mathbb{R}} f(x) \cdot (x - E(X))^2$$

$E(X)$  = Erwartungswert der Zufallsvariable  $X$

$V(X)$  = Varianz der Zufallsvariable  $X$

$f(x)$  = Wahrscheinlichkeitsfunktion

$x$  = Mögliche Werte der Zufallsvariable

Für stetige Verteilungen:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot x dx$$

$$V(X) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot (x - E(X))^2 dx$$

$E(X)$  = Erwartungswert der Zufallsvariable  $X$

$V(X)$  = Varianz der Zufallsvariable  $X$

$f(x)$  = Dichtefunktion

$x$  = Mögliche Werte der Zufallsvariable

## Berechnung von Erwartungswert und Varianz 1. Erwartungswert bestimmen

- Diskret:  $E(X) = \sum_x x \cdot P(X = x)$
- Stetig:  $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$

### 2. Varianz berechnen (2 Methoden)

- Direkte Methode:  $V(X) = \sum_x (x - E(X))^2 \cdot P(X = x)$
- Verschiebungssatz:  $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$

### 3. Bei Standardabweichung

- Wurzel aus Varianz ziehen
- Einheit beachten (gleich wie Ursprungsdaten)

**Erwartungswert bei Würfelspiel Aufgabe:** Bei einem Würfelspiel gewinnt man:

- Bei 6: 5€
- Bei 5: 2€
- Bei 1-4: verliert man 1€

**Lösung:**

#### 1. Wahrscheinlichkeiten und Werte aufstellen:

- $P(X = 5€) = 1/6$
- $P(X = 2€) = 1/6$
- $P(X = -1€) = 4/6$

#### 2. Erwartungswert berechnen:

$$E(X) = 5 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + (-1) \cdot \frac{4}{6} = \frac{5 + 2 - 4}{6} = \frac{3}{6} = 0.5$$

#### 3. Varianz berechnen:

$$E(X^2) = 25 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{4}{6} = \frac{25 + 4 + 4}{6} = \frac{33}{6}$$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{33}{6} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{33}{6} - \frac{1}{4} \approx 5.25$$

**Interpretation:**

- Positiver Erwartungswert: Spiel ist langfristig profitabel
- Hohe Varianz: Große Schwankungen möglich

**Lotterie mit bedingten Gewinnen Aufgabe:** Bei einer Lotterie gewinnt man zunächst mit  $p = 0.1$  einen Bonus-Los. Mit diesem Los kann man dann mit  $p = 0.2$  den Hauptpreis von 1000€ gewinnen. Berechne den Erwartungswert.

**Lösung:**

#### 1. Ereignisbaum erstellen:

- $P(\text{Bonus}) = 0.1$
- $P(\text{Hauptgewinn} | \text{Bonus}) = 0.2$

#### 2. Mögliche Ausgänge:

- 1000€:  $P = 0.1 \cdot 0.2 = 0.02$
- 0€:  $P = 0.98$

#### 3. Erwartungswert:

$$E(X) = 1000 \cdot 0.02 + 0 \cdot 0.98 = 20$$

**Interpretation von Erwartungswert und Varianz 1. Erwartungswert**

- Langfristiger Durchschnitt
- Schwerpunkt der Verteilung
- Nicht unbedingt ein möglicher Wert

#### 2. Varianz

- Maß für die Streuung
- Quadratische Einheit beachten
- Je größer, desto unsicherer die Vorhersage

#### 3. Standardabweichung

- Gleiche Einheit wie Daten
- Typische Abweichung vom Mittelwert
- Oft für Konfidenzintervalle verwendet

**Aktienportfolio Aufgabe:** Ein Portfolio besteht aus:

- Aktie A: 60% Anteil,  $E(A) = 8\%$ ,  $V(A) = 25$
- Aktie B: 40% Anteil,  $E(B) = 12\%$ ,  $V(B) = 36$

**Lösung:**

#### 1. Erwartungswert des Portfolios:

$$\begin{aligned} E(P) &= 0.6 \cdot E(A) + 0.4 \cdot E(B) \\ &= 0.6 \cdot 8\% + 0.4 \cdot 12\% \\ &= 4.8\% + 4.8\% = 9.6\% \end{aligned}$$

#### 2. Varianz des Portfolios (bei Unabhängigkeit):

$$\begin{aligned} V(P) &= (0.6)^2 \cdot V(A) + (0.4)^2 \cdot V(B) \\ &= 0.36 \cdot 25 + 0.16 \cdot 36 \\ &= 9 + 5.76 = 14.76 \end{aligned}$$

#### 3. Standardabweichung:

$$S(P) = \sqrt{14.76} \approx 3.84\%$$

**Kovarianz und Korrelation** Die **Kovarianz** zweier Zufallsvariablen ist:

$$\text{Cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y))) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

Der **Korrelationskoeffizient** ist:

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{V(X)V(Y)}}$$

**Eigenschaften:**

- $-1 \leq \rho_{XY} \leq 1$
- $\rho_{XY} = \pm 1$ : perfekter linearer Zusammenhang
- $\rho_{XY} = 0$ : unkorreliert

**Anwendung von Kovarianz und Korrelation 1. Kovarianz berechnen**

- Direkter Weg:  $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$
- Alternativ:  $\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$

#### 2. Korrelation bestimmen

- Kovarianz durch Produkt der Standardabweichungen
- Normierung auf  $[-1, 1]$

#### 3. Interpretation

- Vorzeichen: Richtung des Zusammenhangs
- Betrag: Stärke des Zusammenhangs
- Unabhängig von Maßeinheiten

**Portfoliorisiko mit Korrelation Aufgabe:** Zwei Aktien mit:

- A:  $E(A) = 10\%$ ,  $S(A) = 5\%$
- B:  $E(B) = 8\%$ ,  $S(B) = 4\%$
- Korrelation:  $\rho_{AB} = 0.3$

**Portfolio:** 60% A, 40% B

**Lösung:**

1. **Erwartungswert:**

$$E(P) = 0.6 \cdot 10\% + 0.4 \cdot 8\% = 9.2\%$$

2. **Varianz mit Korrelation:**

$$\begin{aligned} V(P) &= (0.6)^2 V(A) + (0.4)^2 V(B) + 2(0.6)(0.4)\rho_{AB}S(A)S(B) \\ &= 0.36 \cdot (5\%)^2 + 0.16 \cdot (4\%)^2 + 2(0.24)(0.3)(5\%)(4\%) \\ &= 0.09\% + 0.0256\% + 0.0288\% = 0.1444\% \end{aligned}$$

3. **Standardabweichung:**

$$S(P) = \sqrt{0.1444\%} \approx 3.8\%$$

## Bedingte Wahrscheinlichkeit

**Bedingte Wahrscheinlichkeit** Die bedingte Wahrscheinlichkeit von  $B$  unter der Bedingung  $A$  ist:

$$P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$$

**Parameter:**

- $P(B \cap A)$  = Wahrscheinlichkeit des Durchschnitts ??

### Multiplikationssatz

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = P(B) \cdot P(A|B)$$

**Anwendung:**

- Berechnung von Schnittwahrscheinlichkeiten
- Prüfung auf stochastische Unabhängigkeit
- Zerlegung von mehrstufigen Experimenten

**Erstellen einer Vierfeldertafel** 1. **Aufbau der Tabelle**

- Zeilen: Erstes Merkmal (A und nicht A)
- Spalten: Zweites Merkmal (B und nicht B)
- Randwahrscheinlichkeiten notieren

2. **Eintragen der Wahrscheinlichkeiten**

- Schnittwahrscheinlichkeiten in die Felder
- Zeilensummen =  $P(A)$  bzw.  $P(\text{nicht } A)$
- Spaltensummen =  $P(B)$  bzw.  $P(\text{nicht } B)$

3. **Berechnung bedingter Wahrscheinlichkeiten**

- $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$
- $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

**Medizinischer Test Aufgabe:** Ein Test auf eine Krankheit hat folgende Eigenschaften:

- 1% der Bevölkerung hat die Krankheit
- Test ist bei Kranken zu 98% positiv
- Test ist bei Gesunden zu 95% negativ

**Lösung mit Vierfeldertafel:**

	Test +	Test -	Summe
Krank	0.0098	0.0002	0.01
Gesund	0.0495	0.9405	0.99
Summe	0.0593	0.9407	1

**Berechnung:** Wahrscheinlichkeit krank bei positivem Test:

$$P(\text{krank}|\text{positiv}) = \frac{0.0098}{0.0593} \approx 0.165 = 16.5\%$$

## Spezielle Sätze

### Satz von der Totalen Wahrscheinlichkeit

$$P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})$$

**Anwendung:**

- Berechnung von  $P(B)$  durch Fallunterscheidung
- Basis für den Satz von Bayes
- Wichtig bei Entscheidungsbäumen

### Anwendung des Satzes der totalen Wahrscheinlichkeit

### Satz von Bayes

$$P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)}$$

**Anwendung:**

- Umkehrung bedingter Wahrscheinlichkeiten
- Aktualisierung von Wahrscheinlichkeiten
- Diagnostische Tests

**Anwendung des Satzes von Bayes** 1. **Identifiziere die bekannten Größen**

- A priori Wahrscheinlichkeit  $P(A)$
- Bedingte Wahrscheinlichkeit  $P(B|A)$
- Totale Wahrscheinlichkeit  $P(B)$

2. **Berechne  $P(B)$  falls nötig**

- Nutze Satz der totalen Wahrscheinlichkeit
- $P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})$

3. **Berechne  $P(A|B)$**

- Setze in Bayes-Formel ein
- Interpretiere das Ergebnis

**Qualitätskontrolle Aufgabe:** Eine Maschine produziert Teile.

- 95% der Teile sind fehlerfrei
- Ein Test erkennt fehlerhafte Teile zu 98%
- Der Test klassifiziert 3% der guten Teile falsch

**Gesucht:** Wahrscheinlichkeit für tatsächlich fehlerhaftes Teil bei positivem Test

**Lösung:**

- $P(F) = 0.05$  (fehlerhaft)
- $P(T|F) = 0.98$  (Test positiv wenn fehlerhaft)
- $P(T|\neg F) = 0.03$  (Test positiv wenn gut)
- $P(T) = 0.05 \cdot 0.98 + 0.95 \cdot 0.03 = 0.0775$
- $P(F|T) = \frac{0.05 \cdot 0.98}{0.0775} \approx 0.632 = 63.2\%$

## Stochastische Unabhängigkeit

### Stochastische Unabhängigkeit

Zwei Ereignisse  $A$  und  $B$  heißen stochastisch unabhängig, falls:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Zwei Zufallsvariablen  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  und  $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  heißen stochastisch unabhängig, falls:

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x) \cdot P(Y = y), \quad \text{für alle } x, y \in \mathbb{R}$$

$P(X = x, Y = y)$  = Wahrscheinlichkeit dass  $X$  den Wert  $x$  und  $Y$  den Wert  $y$  annimmt

$P(X = x)$  = Wahrscheinlichkeit dass  $X$  den Wert  $x$  annimmt

$P(Y = y)$  = Wahrscheinlichkeit dass  $Y$  den Wert  $y$  annimmt

**Stochastische Unabhängigkeit** Zwei Ereignisse  $A$  und  $B$  heißen stochastisch unabhängig, falls:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Zwei Zufallsvariablen  $X$  und  $Y$  heißen stochastisch unabhängig, falls für alle  $x, y \in \mathbb{R}$ :

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x) \cdot P(Y = y)$$

**Eigenschaften:**

- Für unabhängige Ereignisse:  $P(A|B) = P(A)$
- Für unabhängige Zufallsvariablen:  $E(XY) = E(X)E(Y)$
- Varianz der Summe:  $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$

**Prüfung auf stochastische Unabhängigkeit** 1. **Für Ereignisse**

- Berechne  $P(A \cap B)$
- Berechne  $P(A) \cdot P(B)$
- Vergleiche die Werte

2. **Für Zufallsvariablen**

- Stelle Verbundverteilung auf
- Prüfe für alle Wertepaare
- Alternative: Prüfe Kovarianz = 0

3. **Praktische Überlegungen**

- Physikalische/logische Abhängigkeit?
- Kausaler Zusammenhang?
- Gemeinsame Einflussfaktoren?



**Würfelwurf und Münzwurf Aufgabe:** Ein Würfel wird geworfen und eine Münze geworfen. Ereignisse:

- A: "Würfel zeigt eine 6"
- B: "Münze zeigt Kopf"

**Lösung:**

1. **Einzelwahrscheinlichkeiten:**

- $P(A) = \frac{1}{6}$
- $P(B) = \frac{1}{2}$

2. **Schnittwahrscheinlichkeit:**  $P(A \cap B) = \frac{1}{12} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} = P(A) \cdot P(B)$

3. **Schlussfolgerung:** Die Ereignisse sind stochastisch unabhängig

**Kartenziehen ohne Zurücklegen Aufgabe:** Aus einem Kartenspiel werden nacheinander zwei Karten gezogen. Ereignisse:

- A: Erste Karte ist Herz"
- B: SZweite Karte ist Herz"

**Lösung:**

1. **Wahrscheinlichkeiten:**

- $P(A) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$
- $P(B|A) = \frac{12}{51}$
- $P(B|\bar{A}) = \frac{13}{51}$

2. **Prüfung:**

$$P(B) = \frac{13}{52} \neq P(B|A)$$

3. **Schlussfolgerung:** Die Ereignisse sind stochastisch abhängig

## Spezielle Verteilungen

### Diskrete und Stetige Zufallsvariablen

**Verteilungen und Erwartungswerte Für diskrete Verteilungen:**

$$E(X) = \sum_{x \in \mathbb{R}} f(x) \cdot x$$

$$V(X) = \sum_{x \in \mathbb{R}} f(x) \cdot (x - E(X))^2$$

**Für stetige Verteilungen:**

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot x dx$$

$$V(X) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot (x - E(X))^2 dx$$

**Parameter:**

- $E(X)$  = Erwartungswert der Zufallsvariable  $X$
- $V(X)$  = Varianz der Zufallsvariable  $X$
- $f(x)$  = Wahrscheinlichkeitsfunktion (diskret) oder Dichtefunktion (stetig)
- $x$  = Mögliche Werte der Zufallsvariable

**Berechnung von Erwartungswert und Varianz 1. Diskrete Verteilung**

- Liste alle möglichen Werte  $x_i$  auf
- Bestimme zugehörige Wahrscheinlichkeiten  $P(X = x_i)$
- $E(X) = \sum x_i \cdot P(X = x_i)$
- $V(X) = \sum (x_i - E(X))^2 \cdot P(X = x_i)$

2. **Stetige Verteilung**

- Identifiziere Dichtefunktion  $f(x)$
- Berechne  $E(X) = \int x \cdot f(x) dx$
- Berechne  $V(X) = \int (x - E(X))^2 \cdot f(x) dx$

**Regeln für stetige und diskrete Zufallsvariablen**

### Diskrete Verteilungen

**Hypergeometrische Verteilung (Ohne zurücklegen)**

- $N$  = Objekte gesamthaft
- $M$  = Objekte einer bestimmten Sorte
- $n$  = Stichprobengröße
- $x$  = Merkmalsträger

$$P(X = x) = \frac{\binom{M}{x} \cdot \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

Schreibweise:  $X \sim H(N, M, n)$

1.  $\mu = E(X) = n \cdot \frac{M}{N}$  2.  $\sigma^2 = V(X) = n \cdot \frac{M}{N} \cdot (1 - \frac{M}{N}) \cdot \frac{N-n}{N-1}$  3.

$\sigma = S(X) = \sqrt{V(X)}$

**Hypergeometrische Verteilung** Ziehen ohne Zurücklegen aus einer endlichen Grundgesamtheit.

**Parameter:**

- N: Grundgesamtheit
- M: Anzahl der Merkmalsträger
- n: Stichprobenumfang

$$P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

**Kenngößen:**

- $E(X) = n \frac{M}{N}$
- $V(X) = n \frac{M}{N} (1 - \frac{M}{N}) \frac{N-n}{N-1}$

**Notation:**  $X \sim H(N, M, n)$

**Ziehung ohne Zurücklegen Aufgabe:** In einer Urne sind 20 Kugeln, davon 8 rot. Es werden 5 Kugeln ohne Zurücklegen gezogen.

**Lösung:**

1. **Parameter:**

- N = 20 (Gesamtanzahl)
- M = 8 (rote Kugeln)
- n = 5 (Ziehungen)

2. **Erwartungswert:**

$$E(X) = 5 \cdot \frac{8}{20} = 2$$

3. **Varianz:**

$$V(X) = 5 \cdot \frac{8}{20} \cdot \frac{12}{20} \cdot \frac{15}{19} \approx 1.184$$

4. **P(genau 2 rote):**

$$P(X = 2) = \frac{\binom{8}{2} \binom{12}{3}}{\binom{20}{5}} \approx 0.3682$$

**Hypergeometrische Verteilung** Ziehen ohne Zurücklegen:

$$P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \cdot \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

**Parameter:**

- N = Grundgesamtheit
- M = Anzahl Merkmalsträger
- n = Stichprobengröße
- k = Erfolge in Stichprobe

**Kenngößen:**

1.  $E(X) = n \cdot \frac{M}{N}$
2.  $V(X) = n \cdot \frac{M}{N} \cdot (1 - \frac{M}{N}) \cdot \frac{N-n}{N-1}$
3.  $\sigma = \sqrt{V(X)}$

**Notation:**  $X \sim H(N, M, n)$

**Lotterie Aufgabe:** In einer Urne sind 100 Lose, davon 10 Gewinnerlose. Ein Spieler zieht 5 Lose.

**Parameter:**

- N = 100 (Gesamtlose)
- M = 10 (Gewinnerlose)
- n = 5 (gezogene Lose)

**Berechnung:**

- $E(X) = 5 \cdot \frac{10}{100} = 0.5$  Gewinne erwartet
- $V(X) = 5 \cdot \frac{10}{100} \cdot \frac{90}{100} \cdot \frac{95}{99} \approx 0.432$
- $P(X = 1) = \frac{\binom{10}{1} \cdot \binom{90}{4}}{\binom{100}{5}} \approx 0.3726$

**Bernoulli-Verteilung** Experiment mit genau zwei möglichen Ausgängen (Erfolg/Misserfolg).

$$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p = q$$

**Kenngößen:**

- $E(X) = p$
- $V(X) = p(1 - p)$

### Anwendung der Bernoulli-Verteilung 1. Prüfe Voraussetzungen

- Genau zwei mögliche Ausgänge
- Unabhängige Wiederholungen
- Konstante Erfolgswahrscheinlichkeit

#### 2. Parameter identifizieren

- $p$  = Erfolgswahrscheinlichkeit
- $q = 1 - p$  = Misserfolgswahrscheinlichkeit

#### 3. Berechnung

- $E(X) = p$
- $V(X) = pq$

**Bernoulli-Verteilung** Bernoulli-Experimente sind Zufallsexperimente mit nur zwei möglichen Ergebnissen (1 und 0):

$$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p = q$$

Es gilt:

1.  $E(X) = E(X^2) = p$
2.  $V(X) = p \cdot (1 - p)$

$E(X)$  = Erwartungswert

$V(X)$  = Varianz

$P(X = 1)$  = Wahrscheinlichkeit für Erfolg

$p$  = Erfolgswahrscheinlichkeit

$q$  = Gegenwahrscheinlichkeit ( $1 - p$ )

**Bernoulli-Verteilung** Experiment mit genau zwei möglichen Ausgängen:

$$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p = q$$

#### Parameter:

- $p$  = Erfolgswahrscheinlichkeit
- $q = 1 - p$  = Gegenwahrscheinlichkeit

#### Kenngrößen:

1.  $E(X) = E(X^2) = p$
2.  $V(X) = p \cdot (1 - p) = pq$

**Münzwurf** **Aufgabe:** Faire Münze wird geworfen.  $X = 1$  bei Kopf,  $X = 0$  bei Zahl.

#### Lösung:

- $p = 0.5$  (faire Münze)
- $E(X) = 0.5$
- $V(X) = 0.5 \cdot 0.5 = 0.25$
- $P(X = 1) = 0.5$
- $P(X = 0) = 0.5$

**Binomialverteilung** n-malige unabhängige Wiederholung eines Bernoulli-Experiments.

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

#### Kenngrößen:

- $E(X) = np$
- $V(X) = np(1 - p)$

**Notation:**  $X \sim B(n, p)$

**Qualitätskontrolle mit Binomialverteilung** **Aufgabe:** Eine Maschine produziert Teile mit Ausschussquote 5%. In einer Stichprobe von 100 Teilen:

- a) Wie viele defekte Teile sind zu erwarten?
- b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für genau 3 defekte Teile?
- c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für höchstens 2 defekte Teile?

#### Lösung:

##### 1. Parameter:

- $n = 100$  (Stichprobenumfang)
- $p = 0.05$  (Ausschusswahrscheinlichkeit)
- $X \sim B(100, 0.05)$

##### 2. Erwartungswert:

$$E(X) = np = 100 \cdot 0.05 = 5$$

##### 3. Genau 3 defekte:

$$P(X = 3) = \binom{100}{3} (0.05)^3 (0.95)^{97} \approx 0.1404$$

##### 4. Höchstens 2 defekte:

$$P(X \leq 2) = \sum_{k=0}^2 \binom{100}{k} (0.05)^k (0.95)^{100-k} \approx 0.0861$$

#### Binomialverteilung (Mit zurücklegen)

- $n$  = Anzahl Wiederholungen
- $p$  = Wahrscheinlichkeit für ein Ergebnis 1
- $q = 1 - p$

$$P(X = x) = \binom{n}{x} \cdot p^x \cdot q^{n-x}$$

Schreibweise:  $X \sim B(n; p)$

$$1. \mu = E(X) = np \quad 2. \sigma^2 = V(X) = npq \quad 3. \sigma = S(X) = \sqrt{npq}$$

**Binomialverteilung** n-malige unabhängige Wiederholung eines Bernoulli-Experiments:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

#### Parameter:

- $n$  = Anzahl Wiederholungen
- $p$  = Wahrscheinlichkeit für Erfolg
- $q = 1 - p$  = Gegenwahrscheinlichkeit

#### Kenngrößen:

1.  $E(X) = np$
2.  $V(X) = npq$
3.  $\sigma = \sqrt{npq}$

**Notation:**  $X \sim B(n, p)$

**Binomialverteilung in der Qualitätskontrolle** **Aufgabe:** Ein Produktionsprozess hat eine Fehlerquote von 5%. In einer Stichprobe von 100 Teilen:

#### Parameter:

- $n = 100$  (Stichprobenumfang)
- $p = 0.05$  (Fehlerwahrscheinlichkeit)
- $X \sim B(100, 0.05)$

#### Berechnung:

- $E(X) = 100 \cdot 0.05 = 5$  defekte Teile erwartet
- $V(X) = 100 \cdot 0.05 \cdot 0.95 = 4.75$
- $P(X = 3) = \binom{100}{3} \cdot 0.05^3 \cdot 0.95^{97} \approx 0.1754$
- $P(X \leq 2) = \sum_{k=0}^2 \binom{100}{k} \cdot 0.05^k \cdot 0.95^{100-k} \approx 0.1247$

#### Poisson Verteilung

- $\lambda$  = Rate

$$P(X = x) = \frac{\lambda^x}{x!} \cdot e^{-\lambda}, \quad \lambda > 0$$

Schreibweise:  $X \sim Poi(\lambda)$

$$1. \mu = E(X) = \lambda \quad 2. \sigma^2 = V(X) = \lambda \quad 3. \sigma = S(X) = \sqrt{\lambda}$$

**Poisson-Verteilung** Modelliert seltene Ereignisse in festem Zeit- oder Raumintervall.

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

#### Parameter:

- $\lambda$ : Erwartungswert pro Intervall

#### Kenngrößen:

- $E(X) = \lambda$
- $V(X) = \lambda$

**Notation:**  $X \sim Poi(\lambda)$

**Poisson-Verteilung** Modelliert seltene Ereignisse:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda}, \quad \lambda > 0$$

#### Parameter:

- $\lambda$  = Erwartungswert/Rate

#### Kenngrößen:

1.  $E(X) = \lambda$
2.  $V(X) = \lambda$
3.  $\sigma = \sqrt{\lambda}$

**Notation:**  $X \sim Poi(\lambda)$

**Anrufe in Call-Center** **Aufgabe:** Ein Call-Center erhält durchschnittlich 4 Anrufe pro Stunde.

#### Parameter:

- $\lambda = 4$  (Anrufe pro Stunde)
- $X \sim Poi(4)$

#### Berechnung:

- $E(X) = 4$  Anrufe erwartet
- $V(X) = 4$
- $P(X = 3) = \frac{4^3}{3!} \cdot e^{-4} \approx 0.1954$
- $P(X \leq 2) = e^{-4} \cdot (1 + 4 + \frac{16}{2}) \approx 0.2381$

**Poisson-Verteilung in der Praxis Aufgabe:** Ein Callcenter erhält durchschnittlich 3 Anrufe pro 10 Minuten.

- a) Wahrscheinlichkeit für genau 2 Anrufe in 10 Minuten?
- b) Wahrscheinlichkeit für mehr als 4 Anrufe?

**Lösung:**

1. **Parameter:**

- $\lambda = 3$  (Erwartungswert)
- $X \sim \text{Poi}(3)$

2. **Genau 2 Anrufe:**

$$P(X = 2) = \frac{3^2}{2!} e^{-3} \approx 0.2240$$

3. **Mehr als 4 Anrufe:**

$$P(X > 4) = 1 - \sum_{k=0}^4 \frac{3^k}{k!} e^{-3} \approx 0.1847$$

**Wahl der richtigen Verteilung 1. Prüfe Ziehungsart**

- Mit Zurücklegen  $\rightarrow$  Binomialverteilung
- Ohne Zurücklegen  $\rightarrow$  Hypergeometrische Verteilung
- Seltene Ereignisse  $\rightarrow$  Poisson-Verteilung

2. **Prüfe Grundgesamtheit**

- Endlich, klein  $\rightarrow$  Hypergeometrische Verteilung
- Sehr groß/unendlich  $\rightarrow$  Binomialverteilung
- Zeitlich/räumlich kontinuierlich  $\rightarrow$  Poisson-Verteilung

3. **Beachte Approximationen**

- Binomial  $\rightarrow$  Poisson für  $n \rightarrow \infty, p \rightarrow 0, np = \lambda$
- Hypergeometrisch  $\rightarrow$  Binomial für  $\frac{n}{N} \leq 0.05$

**Wahl der richtigen diskreten Verteilung 1. Bernoulli-Verteilung**

- Genau zwei mögliche Ausgänge
- Ein einzelner Versuch
- Konstante Erfolgswahrscheinlichkeit

2. **Binomial-Verteilung**

- Feste Anzahl unabhängiger Versuche
- Mit Zurücklegen/große Grundgesamtheit
- Konstante Erfolgswahrscheinlichkeit

3. **Hypergeometrische Verteilung**

- Ziehen ohne Zurücklegen
- Endliche Grundgesamtheit
- Veränderliche Wahrscheinlichkeiten

4. **Poisson-Verteilung**

- Seltene Ereignisse
- Festes Zeitintervall/Raumbereich
- Rate  $\lambda$  bekannt

## Stetige Verteilungen

### Normalverteilung

**Gauss-Verteilung** Die Dichtefunktion der Normalverteilung ist:

$$\varphi_{\mu,\sigma}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} \cdot e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

**Standardnormalverteilung** ( $\mu = 0, \sigma = 1$ ):

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}x^2}$$

**Parameter:**

- $\mu$  = Erwartungswert
- $\sigma$  = Standardabweichung
- $\varphi_{\mu,\sigma}(x)$  = Dichtefunktion
- $\phi_{\mu,\sigma}(x)$  = Verteilungsfunktion

**Notation:**  $X \sim N(\mu; \sigma)$

**Gauss-Verteilung** Die stetige Zufallsvariable  $X$  folgt der Normalverteilung mit den Parametern  $\mu, \sigma \in \mathbb{R}, \sigma > 0$ :

$$\varphi_{\mu,\sigma}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} \cdot e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

**Standardnormalverteilung** ( $\mu = 0$  und  $\sigma = 1$ ):

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}x^2}$$

$\varphi_{\mu,\sigma}(x)$  = Dichtefunktion der Normalverteilung

$\varphi(x)$  = Dichtefunktion der Standardnormalverteilung

$\mu$  = Erwartungswert

$\sigma$  = Standardabweichung

$e$  = Eulersche Zahl

$\pi$  = Kreiszahl Pi

**Die Verteilungsfunktion der Normalverteilung**

Die kumulative Verteilungsfunktion (CDF) von  $\varphi_{\mu,\sigma}(x)$  wird mit  $\phi_{\mu,\sigma}(x)$  bezeichnet. Sie ist definiert durch:

$$\phi_{\mu,\sigma}(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x \varphi_{\mu,\sigma}(t) dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} \cdot \int_{-\infty}^x e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)^2} dt$$

$\phi_{\mu,\sigma}(x)$  = Verteilungsfunktion der Normalverteilung

$\varphi_{\mu,\sigma}(x)$  = Dichtefunktion der Normalverteilung

$P(X \leq x)$  = Wahrscheinlichkeit dass  $X$  kleiner oder gleich  $x$  ist

$\mu$  = Erwartungswert

$\sigma$  = Standardabweichung

$\pi$  = Kreiszahl Pi

$e$  = Eulersche Zahl

**Approximation durch die Normalverteilung**

- Binomialverteilung:  $\mu = np, \sigma^2 = npq$
- Poissonverteilung:  $\mu = \lambda, \sigma^2 = \lambda$

$$P(a \leq X \leq b) = \sum_{x=a}^b P(X = x) \approx \phi_{\mu,\sigma}\left(b + \frac{1}{2}\right) - \phi_{\mu,\sigma}\left(a - \frac{1}{2}\right)$$

$P(a \leq X \leq b)$  = Wahrscheinlichkeit dass  $X$  zwischen  $a$  und  $b$  liegt

$\phi_{\mu,\sigma}$  = Verteilungsfunktion der Normalverteilung

$a, b$  = Untere und obere Grenze

**Standardisierung der Normalverteilung**

Bei einer stetigen Zufallsvariable  $X$  lässt sich die Verteilungsfunktion als Integral einer Funktion  $f$  darstellen:

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(u) \cdot du$$

Liegt eine beliebige Normalverteilung  $N(\mu, \sigma)$  vor, muss standardisiert werden. Statt ursprünglichen Zufallsvariablen  $X$  betrachtet man die Zufallsvariable:

$$U = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$F(x)$  = Verteilungsfunktion

$P(X \leq x)$  = Wahrscheinlichkeit dass  $X$  kleiner oder gleich  $x$  ist

$f(u)$  = Dichtefunktion

$U$  = Standardisierte Zufallsvariable

$X$  = Ursprüngliche Zufallsvariable

$\mu$  = Erwartungswert

$\sigma$  = Standardabweichung

**Erwartungswert und Varianz der Normalverteilung**

Für eine Zufallsvariable  $X \sim N(\mu; \sigma)$  gilt:

$$E(X) = \mu, \quad V(X) = \sigma^2$$

$E(X)$  = Erwartungswert der Zufallsvariable  $X$

$V(X)$  = Varianz der Zufallsvariable  $X$

$\mu$  = Erwartungsparameter

$\sigma^2$  = Varianzparameter

**Arbeiten mit der Normalverteilung**

1. **Standardisierung**

- $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$  transformiert zu  $N(0,1)$
- Benutze Tabelle der Standardnormalverteilung
- Beachte:  $\phi(z) = 1 - \phi(-z)$

2. **Stetigkeitskorrektur**

- Bei Approximation diskreter Verteilungen
- Untere Grenze:  $a - 0.5$
- Obere Grenze:  $b + 0.5$

3. **Faustregel für Intervalle**

- $\mu \pm \sigma$ : ca. 68
- $\mu \pm 2\sigma$ : ca. 95
- $\mu \pm 3\sigma$ : ca. 99.7

**Körpergrößen Aufgabe:** Körpergrößen in einer Population sind normalverteilt mit  $\mu = 175$  cm und  $\sigma = 10$  cm.

- Berechnung:**
- $P(X \leq 185) = \phi(\frac{185-175}{10}) = \phi(1) \approx 0.8413$
  - $P(165 \leq X \leq 185) = \phi(1) - \phi(-1) \approx 0.6826$
  - $P(X > 195) = 1 - \phi(2) \approx 0.0228$

### Zentraler Grenzwertsatz und Approximationen

**Zentraler Grenzwertsatz** Für eine Folge von Zufallsvariablen  $X_1, X_2, \dots, X_n$  mit gleichem Erwartungswert  $\mu$  und gleicher Varianz  $\sigma^2$  gilt für die Summe  $S_n$  und das arithmetische Mittel  $\bar{X}_n$ :

$$E(S_n) = n \cdot \mu, \quad V(S_n) = n \cdot \sigma^2$$

$$E(\bar{X}_n) = \mu, \quad V(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{1}{n^2} \cdot V(S_n)$$

Die standardisierte Zufallsvariable ist:

$$U_n = \frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_n) - n\mu}{\sqrt{n} \cdot \sigma} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Für  $n \rightarrow \infty$  konvergiert die Verteilungsfunktion  $F_n(u)$  gegen die Standardnormalverteilung:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(u) = \phi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \int_{-\infty}^u e^{-\frac{1}{2}t^2} dt$$

**Anwendung des Zentralen Grenzwertsatzes** 1. Prüfe Voraussetzun-gen

- Unabhängige Zufallsvariablen
- Identische Verteilung
- Endliche Varianz
- Genügend große Stichprobe ( $n \geq 30$ )

2. Berechne Parameter

- $\mu_{S_n} = n\mu$
- $\sigma_{S_n} = \sqrt{n}\sigma$
- $\mu_{\bar{X}} = \mu$
- $\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

3. Standardisiere

- Transformiere zu  $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$
- Verwende Tabelle der Standardnormalverteilung

**Zentraler Grenzwertsatz**

Für eine Folge von Zufallsvariablen  $X_1, X_2, \dots, X_n$  mit gleichem Er-wartungswert  $\mu$  und gleicher Varianz  $\sigma^2$  gilt:

$$E(S_n) = n \cdot \mu, \quad V(S_n) = n \cdot \sigma^2, \quad E(\bar{X}_n) = \mu, \quad V(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{1}{n^2} \cdot V(S_n)$$

$S_n$  = Summe der Zufallsvariablen

$\bar{X}_n$  = Arithmetisches Mittel der Zufallsvariablen

$n$  = Anzahl der Zufallsvariablen

$\mu$  = Erwartungswert der einzelnen Zufallsvariablen

$\sigma^2$  = Varianz der einzelnen Zufallsvariablen

Die standardisierte Zufallsvariable:

$$U_n = \frac{((X_1 + X_2 + \dots + X_n) - n\mu)}{\sqrt{n} \cdot \sigma} = \frac{(\bar{X} - \mu)}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Sind die Zufallsvariablen alle identisch  $N(\mu, \sigma)$  verteilt, so sind die Sum-me  $S_n$  und das arithmetische Mittel  $\bar{X}_n$  wieder normalverteilt mit:

- $S_n$  :  $N(n \cdot \mu, \sqrt{n} \cdot \sigma)$
- $\bar{X}_n$  :  $N(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$

Verteilungsfunktion  $F_n(u)$  konvergiert für  $n \rightarrow \infty$  gegen die Vertei-lungsfunktion  $\phi(u)$  der Standardnormalverteilung:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(u) = \phi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \int_{-\infty}^u e^{-\frac{1}{2}t^2} dt$$

**Faustregeln für Approximationen**

- Die Approximation (Binomialverteilung) kann verwendet werden, wenn  $npq > 9$
- Für grosses  $n(n \geq 50)$  und kleines  $p(p \leq 0.1)$  kann die Binomial-durch die Poisson-Verteilung approximiert werden:

$$B(n, p) \approx \text{Poi}(n \cdot p)$$

$B(n, p)$  = Binomialverteilung

$\text{Poi}(\lambda)$  = Poissonverteilung mit Parameter  $\lambda = n \cdot p$

- Eine Hypergeometrische Verteilung kann durch eine Binomialvertei-lung angenähert werden, wenn  $n \leq \frac{N}{20}$ :

$$H(N, M, n) \approx B(n, \frac{M}{N})$$

$H(N, M, n)$  = Hypergeometrische Verteilung

$B(n, p)$  = Binomialverteilung

$N$  = Grundgesamtheit

$M$  = Anzahl der Erfolge in der Grundgesamtheit

$n$  = Stichprobengröße

**Faustregeln für Approximationen** Binomialverteilung durch Normal-verteilung:

- Bedingung:  $npq > 9$
- Parameter:  $\mu = np, \sigma^2 = npq$
- Stetigkeitskorrektur beachten!

**Binomialverteilung durch Poissonverteilung:**

- Bedingung:  $n \geq 50$  und  $p \leq 0.1$
- $B(n, p) \approx \text{Poi}(n \cdot p)$

**Hypergeometrische durch Binomialverteilung:**

- Bedingung:  $n \leq \frac{N}{20}$
- $H(N, M, n) \approx B(n, \frac{M}{N})$

**Approximation der Binomialverteilung Aufgabe:** Eine Produktions-anlage produziert mit Ausschusswahrscheinlichkeit 5%. In einer Charge von 200 Teilen:

- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für 15 oder mehr defekte Teile?
- Lösung:**

1. **Prüfung Approximationsbedingung:**

- $npq = 200 \cdot 0.05 \cdot 0.95 = 9.5 > 9$
- Normalapproximation ist zulässig

2. **Parameter der Normalverteilung:**

- $\mu = np = 200 \cdot 0.05 = 10$
- $\sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{9.5} \approx 3.08$

3. **Berechnung mit Stetigkeitskorrektur:**

$$\begin{aligned} P(X \geq 15) &= 1 - P(X \leq 14) \\ &= 1 - P(X \leq 14.5) \\ &= 1 - \phi(\frac{14.5 - 10}{3.08}) \\ &= 1 - \phi(1.46) \\ &\approx 0.0721 \end{aligned}$$

**Approximation durch Poissonverteilung Aufgabe:** Ein seltener Gen-defekt tritt mit Wahrscheinlichkeit  $p = 0.001$  auf. In einer Gruppe von 2000 Menschen:

- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für genau 3 Betroffene?

**Lösung:**

1. **Prüfung Approximationsbedingung:**

- $n = 2000 \geq 50$  und  $p = 0.001 \leq 0.1$
- Poissonapproximation ist zulässig

2. **Parameter:**

- $\lambda = np = 2000 \cdot 0.001 = 2$

3. **Berechnung:**

$$P(X = 3) = \frac{2^3}{3!} \cdot e^{-2} \approx 0.180$$

4. **Vergleich mit Binomialverteilung:**

$$P_{Bin}(X = 3) = \binom{2000}{3} \cdot 0.001^3 \cdot 0.999^{1997} \approx 0.180$$

Entscheidung über Approximationen

- 1. **Prüfe Stichprobenumfang**
  - Klein ( $n < 30$ ): Exakte Verteilung
  - Mittel ( $30 \leq n < 50$ ): Je nach p
  - Groß ( $n \geq 50$ ): Approximation möglich
- 2. **Prüfe Wahrscheinlichkeit**
  - $p \leq 0.1$ : Poisson möglich
  - $0.1 < p < 0.9$ : Normal möglich
  - $npq > 9$ : Normal empfohlen
- 3. **Wähle Approximation**
  - Binomial  $\rightarrow$  Normal: Große Stichproben, mittleres p
  - Binomial  $\rightarrow$  Poisson: Große n, kleines p
  - Hypergeometrisch  $\rightarrow$  Binomial: Kleine Stichprobe relativ zur Grundgesamtheit
- 4. **Beachte**
  - Stetigkeitskorrektur bei Normal
  - Rundungsregeln bei Grenzen
  - Vergleich mit exakter Lösung wenn möglich

Methode der kleinsten Quadrate

Lineare Regression

Lineare Regression

Gegeben sind Datenpunkte  $(x_i; y_i)$  mit  $1 \leq i \leq n$ . Die Residuen / Fehler  $\epsilon_i = g(x_i) - y_i$  dieser Datenpunkte sind Abstände in  $y$ -Richtung zwischen  $y_i$  und der Geraden  $g$ . Die Ausgleichs- oder Regressionsgerade ist diejenige Gerade, für die die Summe der quadrierten Residuen  $\sum_{i=1}^n \epsilon_i^2$  am kleinsten ist.  
 $(x_i, y_i)$  = Datenpunkte  
 $\epsilon_i$  = Residuum (Abweichung) des  $i$ -ten Datenpunkts  
 $g(x_i)$  = Wert der Regressionsgerade an der Stelle  $x_i$   
 $n$  = Anzahl der Datenpunkte

Lineare Regression berechnen

- 1. Berechne arithmetische Mittel  $\bar{x}$  und  $\bar{y}$
- 2. Berechne Kovarianzen und Varianzen:
  - $s_{xy} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$
  - $s_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$
  - $s_y^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$
- 3. Berechne Steigung  $m$  und y-Achsenabschnitt  $d$ :
  - $m = \frac{s_{xy}}{s_x^2}$
  - $d = \bar{y} - m\bar{x}$
- 4. Regressionsgerade:  $g(x) = mx + d$

Lineare Regression Gegeben sind die Datenpunkte:

$x_i$	1	2	3	4	5
$y_i$	2.1	4.0	6.3	7.8	9.9

- 1.  $\bar{x} = 3, \bar{y} = 6.02$
- 2. Kovarianzen und Varianzen:
  - $s_{xy} = 3.945$
  - $s_x^2 = 2$
  - $s_y^2 = 8.4916$
- 3. Parameter:
  - $m = \frac{3.945}{2} = 1.9725$
  - $d = 6.02 - 1.9725 \cdot 3 = 0.1025$
- 4. Regressionsgerade:  $g(x) = 1.9725x + 0.1025$

Regressionsgerade

Die Regressionsgerade  $g(x) = mx + d$  mit den Parametern  $m$  und  $d$  ist die Gerade, für welche die Residualvarianz  $s_\epsilon^2$  minimal ist.

Steigung:  $m = \frac{s_{xy}}{s_x^2}$ , y-Achsenabschnitt:  $d = \bar{y} - m\bar{x}$ ,  $s_\epsilon^2 = s_y^2 - \frac{s_{xy}^2}{s_x^2}$

- $m$  = Steigung der Regressionsgerade
- $d$  = y-Achsenabschnitt
- $s_{xy}$  = Kovarianz von  $x$  und  $y$
- $s_x^2$  = Varianz der  $x$ -Werte
- $s_y^2$  = Varianz der  $y$ -Werte
- $\bar{x}$  = Arithmetisches Mittel der  $x$ -Werte
- $\bar{y}$  = Arithmetisches Mittel der  $y$ -Werte
- $s_\epsilon^2$  = Residualvarianz

Varianzzerlegung und Bestimmtheitsmass

Varianzaufspaltung

Die Totale Varianz setzt sich zusammen aus der Residualvarianz und der Varianz der prognostizierten Werte:

- $s_y^2$  Totale Varianz
- $s_{\hat{y}}^2$  prognostizierte (erklärte) Varianz
- $s_\epsilon^2$  Residualvarianz

$s_y^2 = s_\epsilon^2 + s_{\hat{y}}^2$

- $s_y^2$  = Totale Varianz der beobachteten  $y$ -Werte
- $s_\epsilon^2$  = Varianz der Residuen
- $s_{\hat{y}}^2$  = Varianz der durch die Regression geschätzten Werte

Bestimmtheitsmass berechnen

- 1. Berechne die totale Varianz  $s_y^2$
- 2. Berechne die Residualvarianz  $s_\epsilon^2$
- 3. Berechne die erklärte Varianz  $s_{\hat{y}}^2$
- 4. Berechne das Bestimmtheitsmass:

$R^2 = \frac{s_{\hat{y}}^2}{s_y^2} = 1 - \frac{s_\epsilon^2}{s_y^2}$

- 5. Interpretation:
  - $R^2 \approx 1$ : Sehr gute Anpassung
  - $R^2 \approx 0$ : Schlechte Anpassung

Bestimmtheitsmass

Das Bestimmtheitsmass  $R^2$  beurteilt die globale Anpassungsgüte einer Regression über den Anteil der prognostizierten Varianz  $s_{\hat{y}}^2$  an der totalen Varianz  $s_y^2$ :

$R^2 = \frac{s_{\hat{y}}^2}{s_y^2}$

- $R^2$  = Bestimmtheitsmass (zwischen 0 und 1)
- $s_{\hat{y}}^2$  = Varianz der prognostizierten Werte
- $s_y^2$  = Totale Varianz

Das Bestimmtheitsmass  $R^2$  entspricht dem Quadrat des Korrelationskoeffizienten:

$R^2 = \frac{s_{xy}^2}{s_x^2 \cdot s_y^2} = (r_{xy})^2$

- $s_{xy}$  = Kovarianz von  $x$  und  $y$
- $s_x^2$  = Varianz der  $x$ -Werte
- $s_y^2$  = Varianz der  $y$ -Werte
- $r_{xy}$  = Korrelationskoeffizient

Residuenbetrachtung

Residuen und Residuenplot analysieren

- 1. Berechne die Residuen für jeden Datenpunkt:
  - $\epsilon_i = y_i - (mx_i + d)$
- 2. Erstelle Residuenplot:
  - x-Achse: Prognostizierte Werte  $\hat{y}_i = mx_i + d$
  - y-Achse: Residuen  $\epsilon_i$
- 3. Prüfe Eigenschaften:
  - Residuen sollten zufällig um Null streuen
  - Keine systematischen Muster erkennbar
  - Gleiche Streubreite über alle  $\hat{y}_i$

Nichtlineares Verhalten

Linearisierungsfunktionen

Transformationen

Ausgangsfunktion	Transformation
$y = q \cdot x^m$	$\log(y) = \log(q) + m \cdot \log(x)$
$y = q \cdot m^x$	$\log(y) = \log(q) + \log(m) \cdot x$
$y = q \cdot e^{m \cdot x}$	$\ln(y) = \ln(q) + m \cdot x$
$y = \frac{1}{q + m \cdot x}$	$V = q + m \cdot x; V = \frac{1}{y}$
$y = q + m \cdot \ln(x)$	$y = q + m \cdot U; u = \ln(x)$
$y = \frac{1}{q \cdot m^x}$	$\log(\frac{1}{y}) = \log(q) + \log(m) \cdot x$

- $y$  = Abhängige Variable
- $x$  = Unabhängige Variable
- $q, m$  = Parameter der Funktion
- $e$  = Eulersche Zahl
- $\ln$  = Natürlicher Logarithmus
- $\log$  = Logarithmus zur Basis 10



### Nichtlineare Regression durch Linearisierung

- Bestimme passende Transformation aus Tabelle 2. Führe Transformation durch 3. Wende lineare Regression auf transformierte Daten an
  - Transformiere Parameter zurück
- Beispiel für exponentielles Wachstum  $y = q \cdot e^{mx}$ :
- Transformation:  $\ln(y) = \ln(q) + mx$
  - Setze  $Y = \ln(y)$ ,  $b = \ln(q)$
  - Lineare Regression für  $Y = mx + b$
  - Rücktransformation:  $q = e^b$

**Exponentielles Wachstum** Gegeben sind die Messwerte:

$x$	1	2	3	4
$y$	2.1	4.2	8.1	15.9

- Transformation  $Y = \ln(y)$ :

$x$	1	2	3	4
$Y$	0.742	1.435	2.092	2.766

- Lineare Regression ergibt:  $Y = 0.674x + 0.071$
- Rücktransformation:
  - $m = 0.674$
  - $q = e^{0.071} = 1.074$
- Ergebnis:  $y = 1.074 \cdot e^{0.674x}$

## Allgemeines Vorgehen: Methode der kleinsten Quadrate –

### Matrix-Darstellung

Die Parameter  $m$  und  $q$  der Regressionsgeraden werden mit der Matrix  $A$  berechnet:

$$A = \begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & 1 \end{pmatrix}, \quad A^T \cdot A \cdot \begin{pmatrix} m \\ q \end{pmatrix} = A^T \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

### Matrix-Methode für lineare Regression

- Erstelle Design-Matrix  $A$ :

$$A = \begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & 1 \end{pmatrix}$$

- Berechne  $A^T \cdot A$
- Berechne  $(A^T \cdot A)^{-1}$
- Berechne Parameter:

$$\begin{pmatrix} m \\ q \end{pmatrix} = (A^T \cdot A)^{-1} \cdot A^T \cdot \vec{y}$$

### Residuenberechnung

Die Residuen  $\epsilon_i$  ergeben sich als:

$$\epsilon_i = y_i - \hat{y}_i = y_i - (mx_i + q)$$

Die Summe der quadrierten Residuen wird minimiert:

$$\sum_{i=1}^n \epsilon_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - (mx_i + q))^2 \rightarrow \min$$

### Mehrfachregression

- Aufstellen der Designmatrix:

$$A = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1(k-1)} & 1 \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2(k-1)} & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{n(k-1)} & 1 \end{pmatrix}$$

- Berechnung der Parameter:

$$\vec{p} = (A^T A)^{-1} A^T \vec{y}$$

- Residuen berechnen:

$$\vec{\epsilon} = \vec{y} - A\vec{p}$$

- Bestimmtheitsmass:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum \epsilon_i^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$$

**Mehrfachregression** Ein Gebrauchtwagenhändler möchte den Preis (P) seiner Autos basierend auf Alter (A) und Kilometerstand (K) berechnen. Gegeben sind folgende Daten:

Auto	Alter (Jahre)	km (10000)	Preis (1000 CHF)
1	2	3	25
2	3	4	20
3	4	6	15
4	5	7	12

- Designmatrix aufstellen:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \\ 4 & 6 & 1 \\ 5 & 7 & 1 \end{pmatrix}$$

- Parameter berechnen:

$$\vec{p} = \begin{pmatrix} -3 \\ -1.5 \\ 35 \end{pmatrix}$$

- Resultierende Funktion:

$$P = -3A - 1.5K + 35$$

### Polynomiale Regression

Für Regression mit Polynomen höheren Grades:

- Erweitere Designmatrix:

$$A = \begin{pmatrix} x_1^n & x_1^{n-1} & \cdots & x_1 & 1 \\ x_2^n & x_2^{n-1} & \cdots & x_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x_m^n & x_m^{n-1} & \cdots & x_m & 1 \end{pmatrix}$$

- Löse wie bei linearer Regression:

$$\vec{p} = (A^T A)^{-1} A^T \vec{y}$$

- Polynom aufstellen:

$$y = p_1 x^n + p_2 x^{n-1} + \cdots + p_n x + p_{n+1}$$

**Quadratische Regression** Gegeben sind Messwerte:

$x$	0	1	2	3	4
$y$	1	2.1	5.2	10.1	17.2

- Designmatrix für quadratisches Polynom:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 9 & 3 & 1 \\ 16 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

- Parameter berechnen:

$$\vec{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0.1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Quadratische Funktion:

$$y = x^2 + 0.1x + 1$$

### Gütekriterien für Regression

- Bestimmtheitsmass  $R^2$ :

- $R^2 > 0.9$ : Sehr gute Anpassung
- $0.7 < R^2 < 0.9$ : Gute Anpassung
- $0.5 < R^2 < 0.7$ : Mittelmässige Anpassung
- $R^2 < 0.5$ : Schlechte Anpassung

- Residuenanalyse:

- Residuen sollten zufällig um 0 schwanken
- Keine systematischen Muster erkennbar
- Residuen sollten normalverteilt sein

- Prognosegüte:

- Mittlerer quadratischer Fehler (MSE)
- Wurzel des mittleren quadratischen Fehlers (RMSE)
- Mittlerer absoluter Fehler (MAE)

Modellwahl durch Residuenanalyse Für einen Datensatz wurden drei Modelle getestet:

- Linear:  $y = 2x + 1$
- Quadratisch:  $y = x^2 + x + 1$
- Exponentiell:  $y = 2e^{0.5x}$

Bestimmtheitsmasse:

- Linear:  $R^2 = 0.85$
- Quadratisch:  $R^2 = 0.98$
- Exponentiell:  $R^2 = 0.92$

Residuenanalyse zeigt:

- Linear: Systematische Krümmung in Residuen
- Quadratisch: Zufällige Verteilung der Residuen
- Exponentiell: Leichte Systematik in Residuen

Schlussfolgerung: Das quadratische Modell ist am besten geeignet.

Prüfungsaufgaben lösen

1. Aufgabentyp identifizieren:
  - Einfache lineare Regression
  - Mehrfachregression
  - Nichtlineare Regression mit Transformation
  - Polynomiale Regression
2. Vorgehen wählen:
  - Linear: Direkte Berechnung mit Formeln
  - Nichtlinear: Transformation und lineare Regression
  - Polynomial: Erweiterte Designmatrix
  - Mehrfach: Matrix-Methode
3. Berechnungen durchführen:
  - Parameter bestimmen
  - Bestimmtheitsmass berechnen
  - Residuen analysieren
4. Ergebnisse interpretieren:
  - Modellgüte bewerten
  - Residuen beurteilen
  - Prognosen erstellen

Klausuraufgabe - Linearisierung Gegeben sind Messwerte für ein exponentielles Wachstum:

$t \text{ (h)}$	0	1	2	3
$N$	100	150	225	340

Finden Sie eine Funktion der Form  $N(t) = N_0 e^{kt}$

1. Transformation:

$$\ln(N) = \ln(N_0) + kt$$

2. Neue Wertetabelle:

$t$	0	1	2	3
$\ln(N)$	4.61	5.01	5.42	5.83

3. Lineare Regression:

$$\ln(N) = 0.405t + 4.61$$

4. Rücktransformation:

$$N(t) = 100.4e^{0.405t}$$

5. Bestimmtheitsmass:  $R^2 = 0.999$

Schliessende Statistik: Parameter- und Intervallschätzung

Zufallsstichproben

Parameterschätzungen

Grundlagen der Schätztheorie

Die Schätztheorie befasst sich mit zwei Hauptproblemen:

- Punktschätzung: Bestimmung eines einzelnen Schätzwerts
- Intervallschätzung: Bestimmung eines Vertrauensbereichs

Wichtige Begriffe:

- $\theta$ : Unbekannter Parameter der Grundgesamtheit
- $\Theta$ : Schätzfunktion (Zufallsvariable)
- $\hat{\theta}$ : Schätzwert (konkreter Wert)
- $n$ : Stichprobenumfang

Schätzfunktionen

Kriterien für eine optimale Schätzfunktion

Erwartungstreue Schätzfunktion

Eine Schätzfunktion  $\Theta$  eines Parameters  $\theta$  heisst erwartungstreu, wenn:

$$E(\Theta) = \theta$$

$E(\Theta)$ : Erwartungswert der Schätzfunktion  
 $\theta$ : Wahrer Parameter der Grundgesamtheit

Effizienz einer Schätzfunktion

Gegeben sind zwei erwartungstreue Schätzfunktionen  $\Theta_1$  und  $\Theta_2$  desselben Parameters  $\theta$ . Man nennt  $\Theta_1$  effizienter als  $\Theta_2$ , falls:

$$V(\Theta_1) < V(\Theta_2)$$

$V(\Theta_1), V(\Theta_2)$ : Varianzen der Schätzfunktionen

Konsistenz einer Schätzfunktion

Eine Schätzfunktion  $\Theta$  heisst konsistent, wenn:

$$E(\Theta) \rightarrow \theta \text{ und } V(\Theta) \rightarrow 0 \text{ für } n \rightarrow \infty$$

$n$ : Stichprobenumfang

Prüfen von Schätzfunktionen

1. Erwartungstreue:
  - Erwartungswert  $E(\Theta)$  berechnen
  - Mit Parameter  $\theta$  vergleichen
  - Erwartungstreu, wenn  $E(\Theta) = \theta$
2. Effizienz:
  - Varianzen  $V(\Theta_1)$  und  $V(\Theta_2)$  berechnen
  - Varianzen vergleichen
  - Kleinere Varianz = effizienter
3. Konsistenz:
  - Grenzwert für  $n \rightarrow \infty$  betrachten
  - $E(\Theta) \rightarrow \theta?$
  - $V(\Theta) \rightarrow 0?$

Prüfung auf Erwartungstreue

Gegeben sei die Schätzfunktion  $\Theta_1 = \frac{1}{3}(2X_1 + X_2)$  für den Erwartungswert  $\mu$ .

1. Erwartungswert berechnen:

$$E(\Theta_1) = E\left(\frac{1}{3}(2X_1 + X_2)\right) = \frac{1}{3}(2E(X_1) + E(X_2))$$

2. Einsetzen der Erwartungswerte:

$$E(\Theta_1) = \frac{1}{3}(2\mu + \mu) = \frac{3\mu}{3} = \mu$$

3. Da  $E(\Theta_1) = \mu$ , ist die Schätzfunktion erwartungstreu.  
Effizienzberechnung:

$$\begin{aligned} V(\Theta_1) &= V\left(\frac{1}{3}(2X_1 + X_2)\right) \\ &= \frac{1}{9}V(2X_1 + X_2) \\ &= \frac{1}{9}(4V(X_1) + V(X_2)) \\ &= \frac{1}{9}(4\sigma^2 + \sigma^2) \\ &= \frac{5\sigma^2}{9} \end{aligned}$$

Erwartungstreue Schätzfunktion

Grundgesamtheit mit Erwartungswert  $\mu$ , Varianz  $\sigma^2$  und Zufallsstichprobe  $X_1, X_2, X_3$ . Die folgende Schätzfunktion ist gegeben:

$$\Theta_1 = \frac{1}{3} \cdot (2X_1 + X_2)$$

$\Theta_1$  = Schätzfunktion  
 $X_1, X_2$  = Zufallsvariablen aus der Stichprobe

Ist diese Schätzfunktion erwartungstreu (Parameter:  $\mu$ )?

$$\begin{aligned} E(\Theta_1) &= E\left(\frac{1}{3} \cdot (2X_1 + X_2)\right) = \frac{1}{3} \cdot (2E(X_1) + E(X_2)) \\ E(\Theta_1) &= \frac{1}{3} \cdot (2\mu + \mu) = \frac{3\mu}{3} = \mu \end{aligned}$$

$E(\Theta_1)$  = Erwartungswert der Schätzfunktion  
 $E(X_1), E(X_2)$  = Erwartungswerte der einzelnen Zufallsvariablen  
 $\mu$  = Wahrer Parameterwert

Da  $E(\Theta_1) = \mu$  ist die Funktion erwartungstreu.

### Effizienz einer Schätzfunktion

Grundgesamtheit mit Erwartungswert  $\mu$ , Varianz  $\sigma^2$  und Zufallsstichprobe  $X_1, X_2, X_3$ . Gegeben ist die Schätzfunktion:

$$\Theta_1 = \frac{1}{3} \cdot (2X_1 + X_2)$$

Berechnung der Effizienz:

$$\begin{aligned} V(\Theta_1) &= V\left(\frac{1}{3} \cdot (2X_1 + X_2)\right) \\ &= \frac{1}{9} \cdot V(2X_1 + X_2) \\ &= \frac{1}{9} \cdot (V(2X_1) + V(X_2)) \\ &= \frac{1}{9} \cdot (4V(X_1) + V(X_2)) \\ &= \frac{1}{9} \cdot (4\sigma^2 + \sigma^2) \\ &= \frac{5\sigma^2}{9} \end{aligned}$$

$V(\Theta_1)$  = Varianz der Schätzfunktion

$V(X_1), V(X_2)$  = Varianzen der einzelnen Zufallsvariablen

$\sigma^2$  = Varianz der Grundgesamtheit

Die Effizienz der Schätzfunktion ist also  $\frac{5\sigma^2}{9}$ .

### Schätzfunktionen für die wichtigsten statistischen Parameter

#### Erwartungswert und Varianz (Funktion und Wert)

Erwartungswert:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n X_i, \quad \hat{\mu} = \bar{x} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n x_i$$

$\bar{X}$  = Arithmetischer Mittelwert (Zufallsvariable)

$\hat{\mu} = \bar{x}$  = Arithmetischer Mittelwert (Stichprobenwert)

$n$  = Stichprobenumfang

$X_i$  =  $i$ -te Zufallsvariable

$x_i$  =  $i$ -ter Stichprobenwert

Varianz:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad \hat{\sigma}^2 = s^2 = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

$S^2$  = Stichprobenvarianz (Zufallsvariable)

$\hat{\sigma}^2 = s^2$  = Stichprobenvarianz (Stichprobenwert)

$\bar{X}$  = Arithmetischer Mittelwert (Zufallsvariable)

$\bar{x}$  = Arithmetischer Mittelwert (Stichprobenwert)

### Maximum-Likelihood-Schätzung

#### Likelihood-Funktion

Wir betrachten eine Zufallsvariable  $X$  und ihre Dichte (PDF)  $f_X(x|\theta)$ , welche von  $x$  und einem oder mehreren Parametern  $\theta$  abhängig sind. Für eine Stichprobe vom Umfang  $n$  mit  $x_1, \dots, x_n$  nennen wir die vom Parameter  $\theta$  abhängige Funktion die Likelihood-Funktion der Stichprobe:

$$L(\theta) = f_X(x_1|\theta) \cdot f_X(x_2|\theta) \cdot \dots \cdot f_X(x_n|\theta)$$

#### Vorgehen bei Maximum-Likelihood-Schätzung

1. Likelihood-Funktion bestimmen
2. Maximalstelle der Funktion bestimmen:
  - (Partielle) Ableitung  $L'(\theta) = 0$

#### Maximum-Likelihood-Schätzung

Die Likelihood-Funktion für eine Stichprobe  $x_1, \dots, x_n$  ist:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f_X(x_i|\theta)$$

$f_X(x|\theta)$ : Wahrscheinlichkeitsdichte

$\theta$ : zu schätzender Parameter

$n$ : Stichprobenumfang

Der Maximum-Likelihood-Schätzer maximiert  $L(\theta)$  bzw.  $\ln(L(\theta))$ .

#### Maximum-Likelihood-Schätzung

1. Likelihood-Funktion aufstellen:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f_X(x_i|\theta)$$

2. Logarithmieren:

$$\ln(L(\theta)) = \sum_{i=1}^n \ln(f_X(x_i|\theta))$$

3. Ableitung Null setzen:

$$\frac{d}{d\theta} \ln(L(\theta)) = 0$$

4. Nach  $\theta$  auflösen:

$$\hat{\theta}_{ML} = \text{Lösung}$$

5. Maximum prüfen:

$$\frac{d^2}{d\theta^2} \ln(L(\theta)) < 0$$

### Maximum-Likelihood Normalverteilung

Gegeben sei eine Stichprobe aus einer Normalverteilung  $N(\mu, \sigma^2)$ .

1. Likelihood-Funktion:

$$L(\mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

2. Log-Likelihood:

$$\ln(L) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

3. Ableitungen:

$$\frac{\partial \ln(L)}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0$$

$$\frac{\partial \ln(L)}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = 0$$

4. ML-Schätzer:

$$\hat{\mu}_{ML} = \bar{x}$$

$$\hat{\sigma}_{ML}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

#### Maximum-Likelihood-Schätzung

1. Likelihood-Funktion aufstellen:

- Dichte der Verteilung identifizieren
- Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten bilden
- $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f_X(x_i|\theta)$

2. Logarithmierte Likelihood-Funktion bilden:

- $\ln(L(\theta))$  berechnen
- Produkte werden zu Summen

3. Ableitung Null setzen:

- $\frac{d}{d\theta} \ln(L(\theta)) = 0$
- Nach  $\theta$  auflösen

4. Maximum prüfen:

- Zweite Ableitung muss negativ sein
- $\frac{d^2}{d\theta^2} \ln(L(\theta)) < 0$

Maximum-Likelihood Exponentialverteilung  
Gegeben sei eine Stichprobe  $x_1, \dots, x_n$  aus einer Exponentialverteilung mit Parameter  $\lambda$ :

$f(x|\lambda) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$

1. Likelihood-Funktion:

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda x_i} = \lambda^n e^{-\lambda \sum x_i}$$

2. Log-Likelihood:

$$\ln(L(\lambda)) = n \ln(\lambda) - \lambda \sum x_i$$

3. Ableitung Null setzen:

$$\frac{d}{d\lambda} \ln(L(\lambda)) = \frac{n}{\lambda} - \sum x_i = 0$$

4. ML-Schätzer:

$$\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum x_i} = \frac{1}{\bar{x}}$$

Vertrauensintervalle

Vertrauensintervall

Ein Vertrauensintervall zum Niveau  $\gamma$  ist ein zufälliges Intervall  $[\Theta_u, \Theta_o]$  mit:

$$P(\Theta_u \leq \theta \leq \Theta_o) = \gamma$$

$\gamma$ : Vertrauensniveau (stat. Sicherheit)  
 $\alpha = 1 - \gamma$ : Irrtumswahrscheinlichkeit  
 $\Theta_u, \Theta_o$ : Unter- und Obergrenze

Intervallschätzung

Verteilungstypen und zugehörige Quantile:

Verteilung	Parameter	Quantile
Normalverteilung ( $\sigma^2$ bekannt)	$\mu$	$c = u_p, p = \frac{1+\gamma}{2}$
t-Verteilung ( $\sigma^2$ unbekannt)	$\mu$	$c = t_{(p; f=n-1)}, p = \frac{1+\gamma}{2}$
Chi-Quadrat-Verteilung	$\sigma^2$	$c_1 = \chi^2_{(\frac{1-\gamma}{2}; n-1)}, c_2 = \chi^2_{(\frac{1+\gamma}{2}; n-1)}$

Übersicht statistische Schätzverfahren

- 1. Punktschätzung:
  - Maximum-Likelihood
  - Momentenmethode
  - Kleinste-Quadrate
- 2. Intervallschätzung:
  - Vertrauensintervalle für Mittelwert
  - Vertrauensintervalle für Varianz
  - Vertrauensintervalle für Anteilswerte
- 3. Gütekriterien:
  - Erwartungstreue
  - Effizienz
  - Konsistenz
  - Minimale Varianz

Berechnung eines Vertrauensintervalls  
Geben Sie das Vertrauensintervall für  $\mu$  an ( $\sigma^2$  unbekannt). Gegeben sind:

$n = 10, \quad \bar{x} = 102, \quad s^2 = 16, \quad \gamma = 0.99$

- 1. Verteilungstyp mit Param  $\mu$  und  $\sigma^2$  unbekannt  $\rightarrow$  T-Verteilung
- 2.  $f = n - 1 = 9, p = \frac{1+\gamma}{2} = 0.995, c = t_{(p; f)} = t_{(0.995; 9)} = 3.25$
- 3.  $e = c \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 4.111, \Theta_u = \bar{X} - e = 97.89, \Theta_o = \bar{X} + e = 106.11$

Vertrauensintervalle berechnen

- 1. Verteilungstyp bestimmen:
  - Normalverteilung ( $\sigma^2$  bekannt)
  - t-Verteilung ( $\sigma^2$  unbekannt)
  - Chi-Quadrat (für Varianz)
- 2. Quantile bestimmen:
  - Normalverteilung:  $c = u_p$  mit  $p = \frac{1+\gamma}{2}$
  - t-Verteilung:  $c = t_{(p; f)}$  mit  $f = n - 1$
  - Chi-Quadrat:  $c_1 = \chi^2_{(p_1; f)}, c_2 = \chi^2_{(p_2; f)}$
- 3. Intervallgrenzen berechnen:
  - Mittelwert:  $[\bar{x} \pm c \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}]$
  - Varianz:  $[\frac{(n-1)s^2}{c_2}, \frac{(n-1)s^2}{c_1}]$

Vertrauensintervall für Mittelwert

Gegeben:  $n = 25, \bar{x} = 102, s = 4, \gamma = 0.95$   
1. Verteilung: t-Verteilung mit  $f = 24$  ( $\sigma^2$  unbekannt)

- 2. Quantil:
  - $p = \frac{1+0.95}{2} = 0.975$
  - $c = t_{(0.975; 24)} = 2.064$
- 3. Intervallgrenzen:
  - $e = 2.064 \cdot \frac{4}{\sqrt{25}} = 1.652$
  - $[102 - 1.652; 102 + 1.652] = [100.348; 103.652]$

Konstruktion von Vertrauensintervallen

Vertrauensintervalle berechnen

- 1. Verteilungstyp und Parameter bestimmen:
  - Normalverteilung mit  $\sigma^2$  bekannt
  - Normalverteilung mit  $\sigma^2$  unbekannt
  - Chi-Quadrat für Varianz
- 2. Vertrauensniveau  $\gamma$  und Freiheitsgrade:
  - $\gamma$  aus Aufgabe entnehmen
  - $f = n - 1$  bei t- und  $\chi^2$ -Verteilung
- 3. Kritische Werte bestimmen:
  - Normalverteilung:  $c = u_p$  mit  $p = \frac{1+\gamma}{2}$
  - t-Verteilung:  $c = t_{(p; f)}$  mit  $p = \frac{1+\gamma}{2}$
  - Chi-Quadrat:  $c_1 = \chi^2_{(p_1; f)}$  und  $c_2 = \chi^2_{(p_2; f)}$
- 4. Intervallgrenzen berechnen:
  - Mittelwert:  $[\bar{x} - e; \bar{x} + e]$  mit  $e = c \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$
  - Varianz:  $[\frac{(n-1)s^2}{c_2}, \frac{(n-1)s^2}{c_1}]$

Vertrauensintervall für Mittelwert

Eine Maschine produziert Schrauben. Bei einer Stichprobe von  $n = 16$  Schrauben wurde der Durchmesser gemessen:

- Mittelwert:  $\bar{x} = 5.2$  mm
- Standardabweichung:  $s = 0.15$  mm
- Vertrauensniveau:  $\gamma = 95\%$

- 1. Verteilungstyp:
  - $\sigma^2$  unbekannt  $\rightarrow$  t-Verteilung
  - $f = n - 1 = 15$  Freiheitsgrade
- 2. Kritischer Wert:
  - $p = \frac{1+0.95}{2} = 0.975$
  - $c = t_{(0.975; 15)} = 2.131$
- 3. Intervallgrenzen:
  - $e = 2.131 \cdot \frac{0.15}{\sqrt{16}} = 0.080$
  - $[\bar{x} - e; \bar{x} + e] = [5.12; 5.28]$

Vertrauensintervall für Varianz

Für die obigen Schrauben soll ein 95%-Vertrauensintervall für die Varianz berechnet werden.

- 1. Verteilungstyp:
  - Chi-Quadrat-Verteilung
  - $f = n - 1 = 15$  Freiheitsgrade
- 2. Kritische Werte:
  - $p_1 = \frac{1-0.95}{2} = 0.025$
  - $p_2 = \frac{1+0.95}{2} = 0.975$
  - $c_1 = \chi^2_{(0.025; 15)} = 6.262$
  - $c_2 = \chi^2_{(0.975; 15)} = 27.488$
- 3. Intervallgrenzen:
  - $s^2 = 0.15^2 = 0.0225$
  - $\theta_u = \frac{15 \cdot 0.0225}{27.488} = 0.0123$
  - $\theta_o = \frac{15 \cdot 0.0225}{6.262} = 0.0539$
- 4. Vertrauensintervall für  $\sigma^2$ :  $[0.0123; 0.0539]$

Bestimmung des Stichprobenumfangs

- 1. Gegebene Verteilung und Parameter:
  - Normalverteilung mit  $\sigma^2$  bekannt
  - Vertrauensniveau  $\gamma$
  - Maximal zulässige Intervallbreite  $d$
- 2. Kritischen Wert bestimmen:
  - $p = \frac{1+\gamma}{2}$
  - $c = u_p$  für Normalverteilung
- 3. Stichprobenumfang berechnen:
  - $n \geq (\frac{2c\sigma}{d})^2$
  - Auf nächste ganze Zahl aufrunden
- 4. Bei unbekannter Varianz:
  - Vorerhebung durchführen
  - Varianz schätzen
  - t-Verteilung statt Normalverteilung

Stichprobenumfang bestimmen

Ein Prozess produziert Teile mit bekannter Standardabweichung  $\sigma = 0.5$  mm. Der Mittelwert soll mit einer Genauigkeit von  $\pm 0.2$  mm bei einem Vertrauensniveau von 99% geschätzt werden.

- 1. Gesucht:
- Intervallbreite  $d = 0.4$  mm
- $\gamma = 0.99$
- 2. Kritischer Wert:
- $p = \frac{1+0.99}{2} = 0.995$
- $c = u_{0.995} = 2.576$
- 3. Stichprobenumfang:
- $n \geq (\frac{2 \cdot 2.576 \cdot 0.5}{0.4})^2 = 41.47$
- $n = 42$  (aufgerundet)

Minimum Stichprobenumfang bestimmen

- 1. Voraussetzungen:
- Gewünschte Genauigkeit  $d$
- Vertrauensniveau  $\gamma$
- Standardabweichung  $\sigma$  (wenn bekannt)
- 2. Kritischen Wert bestimmen:
- $c = u_p$  oder  $t_{(p;f)}$
- $p = \frac{1+\gamma}{2}$
- 3. Stichprobenumfang berechnen:
- $n \geq (\frac{2c\sigma}{d})^2$  für Mittelwert
- Auf nächste ganze Zahl aufrunden

Stichprobenumfang

Ein Parameter soll mit einer Genauigkeit von  $d = 0.2$  bei  $\gamma = 0.99$  geschätzt werden. Die Standardabweichung ist  $\sigma = 0.5$  bekannt.

- 1. Kritischer Wert:
- $p = \frac{1+0.99}{2} = 0.995$
- $c = u_{0.995} = 2.576$
- 2. Mindestumfang:
- $n \geq (\frac{2 \cdot 2.576 \cdot 0.5}{0.2})^2 = 41.47$
- $n = 42$  (aufgerundet)

Übersicht Vertrauensintervalle

Parameter	Verteilung	Test-Statistik	Intervall
$\mu$ ( $\sigma^2$ bekannt)	Normal	$U = \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$	$[\bar{x} \pm u_p \frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$
$\mu$ ( $\sigma^2$ unbek.)	t	$T = \frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$	$[\bar{x} \pm t_p \frac{s}{\sqrt{n}}]$
$\sigma^2$	$\chi^2$	$Z = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$	$[\frac{(n-1)s^2}{c_2}, \frac{(n-1)s^2}{c_1}]$

Detaillierte Vertrauensintervalle

Verteilungstypen und Quantile

Verteilung	Parameter	Standardisierung	Quantile
Normalverteilung ( $\sigma^2$ bekannt)	$\mu$	$U = \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$	$c = u_p, p = \frac{1+\gamma}{2}$
t-Verteilung ( $\sigma^2$ unbekannt)	$\mu$	$T = \frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$	$c = t_{(p;f=n-1)}, p = \frac{1+\gamma}{2}$
Chi-Quadrat	$\sigma^2$	$Z = (n-1) \frac{s^2}{\sigma^2}$	$c_1 = \chi^2_{(\frac{1-\gamma}{2};n)}$ $c_2 = \chi^2_{(\frac{1+\gamma}{2};n)}$

Konfidenzintervalle

Für verschiedene Verteilungen ergeben sich folgende Intervallgrenzen:

- 1. Normalverteilung ( $\sigma^2$  bekannt):

$$\Theta_u = \bar{X} - c \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad \Theta_o = \bar{X} + c \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- 2. t-Verteilung ( $\sigma^2$  unbekannt):

$$\Theta_u = \bar{X} - c \frac{S}{\sqrt{n}}, \quad \Theta_o = \bar{X} + c \frac{S}{\sqrt{n}}$$

- 3. Chi-Quadrat-Verteilung:

$$\Theta_u = \frac{(n-1)s^2}{c_2}, \quad \Theta_o = \frac{(n-1)s^2}{c_1}$$

Typische Prüfungsaufgaben

Typische Prüfungsaufgaben

- 1. Maximum-Likelihood:
- Likelihood-Funktion aufstellen
- Logarithmieren und ableiten
- ML-Schätzer bestimmen
- 2. Vertrauensintervalle:
- Verteilungstyp bestimmen
- Quantile nachschlagen
- Intervall berechnen
- 3. Schätzer prüfen:
- Erwartungstreue nachweisen
- Effizienz vergleichen
- Konsistenz zeigen
- 4. Stichprobenumfang:
- Genauigkeit berücksichtigen
- Vertrauensniveau einbeziehen
- Mindestumfang bestimmen

Typische Prüfungsaufgaben

- 1. Maximum-Likelihood-Schätzung:
- Likelihood-Funktion aufstellen
- Logarithmieren
- Ableitung Null setzen
- ML-Schätzer bestimmen
- Maximum prüfen
- 2. Vertrauensintervalle:
- Verteilungstyp bestimmen
- Kritische Werte nachschlagen
- Intervallgrenzen berechnen
- Interpretation der Ergebnisse
- 3. Stichprobenumfang:
- Genauigkeitsanforderungen
- Vertrauensniveau
- Minimal notwendigen Umfang bestimmen

Hypothesentests

Hypothesentest

Ein statistischer Test zur Überprüfung einer Behauptung bzw. Hypothese über einen oder mehrere Parameter einer Grundgesamtheit.

- $H_0$ : Nullhypothese (zu überprüfende Behauptung)
- $H_A$ : Alternativhypothese (Gegenhypothese)
- $\alpha$ : Signifikanzniveau (Irrtumswahrscheinlichkeit)

Vorgehen bei Hypothesentests

Ablauf eines Hypothesentests

- 1. Hypothesen formulieren:
- $H_0$  aufstellen (punktförmig)
- $H_A$  aufstellen (ein- oder zweiseitig)
- 2. Signifikanzniveau  $\alpha$  festlegen:
- Meist  $\alpha = 0.05$  oder  $\alpha = 0.01$
- 3. Testvariable und Verteilung bestimmen:
- Passende Zeile aus Tabelle 8.2.1 wählen
- Standardisierte Testvariable notieren
- 4. Kritische Werte bestimmen:
- Einseitig: ein Wert  $c$
- Zweiseitig: zwei Werte  $c_u$  und  $c_o$
- 5. Testwert berechnen:
- Stichprobenwerte einsetzen
- Standardisierung durchführen
- 6. Entscheidung treffen:
- $H_0$  annehmen oder ablehnen
- Ergebnis interpretieren



Mittelwerttest (bekannte Varianz)

Ein Automobilhersteller gibt den mittleren Verbrauch mit  $\mu_0 = 8.2$  l/100km an. In einer Stichprobe von  $n = 25$  Fahrzeugen wurde ein Mittelwert von  $\bar{x} = 9.1$  l/100km bei bekannter Standardabweichung  $\sigma = 2.1$  l/100km gemessen.

- 1. Hypothesen:
  - $H_0 : \mu = 8.2$
  - $H_A : \mu \neq 8.2$  (zweiseitig)
- 2. Signifikanzniveau:  $\alpha = 0.05$
- 3. Testvariable:  $U = \frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$  (standardnormalverteilt)
- 4. Kritische Werte:
  - $c_u = -1.96$
  - $c_o = 1.96$
- 5. Testwert:

$$\hat{u} = \frac{9.1 - 8.2}{2.1/\sqrt{25}} = 2.14$$

6. Entscheidung:  $\hat{u} > c_o$ , also  $H_0$  ablehnen

Unterscheidung abhängiger/unabhängiger Stichproben

- 1. Abhängige Stichproben:
  - Gleicher Stichprobenumfang
  - Messungen am gleichen Objekt
  - Paarweise Zuordnung möglich
- 2. Unabhängige Stichproben:
  - Unterschiedliche Objekte
  - Keine Zuordnung möglich
  - Stichprobenumfänge können verschieden sein
- 3. Auswirkung auf Test:
  - Abhängig: Test der Differenzen
  - Unabhängig: Test der einzelnen Stichproben

Abhängige Stichproben (t-Test)

Vergleich zweier Messgeräte an denselben 5 Widerständen:

i	1	2	3	4	5
Gerät 1	100.5	102.4	104.3	101.5	98.4
Gerät 2	98.2	99.1	102.4	101.1	96.2

- 1. Hypothesen:
  - $H_0 : \mu_d = 0$
  - $H_A : \mu_d \neq 0$
- 2.  $\alpha = 0.01$
- 3. Differenzen bilden:
  - $\bar{d} = 2.02$
  - $s_d = 1.047$
- 4. Testvariable:  $T = \frac{\bar{D}}{s_d/\sqrt{n}}$  (t-verteilt mit  $f = 4$ )
- 5. Testwert:
$$\hat{t} = \frac{2.02}{1.047/\sqrt{5}} = 4.313$$
- 6. Kritische Werte:  $c_u = -4.604$ ,  $c_o = 4.604$
- 7. Entscheidung:  $|\hat{t}| < c_o$ , also  $H_0$  annehmen

Verteilungen der Testvariablen

- Normalverteilung ( $\sigma^2$  bekannt):

$$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

- t-Verteilung ( $\sigma^2$  unbekannt):

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

- Chi-Quadrat (Varianztest):

$$Z = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2_{n-1}$$

- Anteilstest (für großes n):

$$U = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim N(0, 1)$$

Varianztest

Die Varianz eines Produktionsprozesses soll  $\sigma_0^2 = 25$  nicht überschreiten. Eine Stichprobe von  $n = 12$  Teilen ergab eine empirische Varianz von  $s^2 = 40$ .

- 1. Hypothesen:
  - $H_0 : \sigma^2 = 25$
  - $H_A : \sigma^2 > 25$
- 2.  $\alpha = 0.05$
- 3. Testvariable:  $Z = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$  ( $\chi^2$ -verteilt mit  $f = 11$ )
- 4. Testwert:
$$\hat{z} = \frac{11 \cdot 40}{25} = 17.6$$

- 5. Kritischer Wert:  $c = \chi^2_{(0.95;11)} = 19.675$
- 6. Entscheidung:  $\hat{z} < c$ , also  $H_0$  annehmen

Einseitige vs. zweiseitige Tests

- 1. Zweiseitiger Test ( $H_A : \theta \neq \theta_0$ ):
  - Kritische Werte:  $c_u$  und  $c_o$
  - Ablehnbereich:  $(-\infty, c_u) \cup (c_o, \infty)$
  - p-Wert:  $2 \cdot P(T \geq |\hat{t}|)$
- 2. Rechtsseitiger Test ( $H_A : \theta > \theta_0$ ):
  - Kritischer Wert:  $c_o$
  - Ablehnbereich:  $(c_o, \infty)$
  - p-Wert:  $P(T \geq \hat{t})$
- 3. Linksseitiger Test ( $H_A : \theta < \theta_0$ ):
  - Kritischer Wert:  $c_u$
  - Ablehnbereich:  $(-\infty, c_u)$
  - p-Wert:  $P(T \leq \hat{t})$

p-Wert berechnen

- 1. Testvariable und Verteilung bestimmen:
  - Aus Tabelle 8.2.1 auswählen
  - Testwert berechnen
- 2. p-Wert ermitteln:
  - Einseitig:  $P(T \geq |\hat{t}|)$  oder  $P(T \leq |\hat{t}|)$
  - Zweiseitig:  $2 \cdot P(T \geq |\hat{t}|)$
- 3. Vergleich mit  $\alpha$ :
  - $p \leq \alpha$ :  $H_0$  ablehnen
  - $p > \alpha$ :  $H_0$  annehmen

p-Wert berechnen

Bei einer Qualitätskontrolle wurden in einer Stichprobe von  $n = 400$  Teilen 20 Defekte gefunden. Die Nullhypothese lautet  $H_0 : p = 0.03$  gegen  $H_A : p > 0.03$ .

- 1. Testvariable:

$$U = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$$

- 2. Testwert:

$$\hat{u} = \frac{0.05 - 0.03}{\sqrt{\frac{0.03 \cdot 0.97}{400}}} = 2.345$$

- 3. p-Wert (einseitig):

$$p = P(U \geq 2.345) = 1 - \Phi(2.345) = 0.0095$$

- 4. Entscheidung:  $p < \alpha = 0.05$ , also  $H_0$  ablehnen

Typische Prüfungsaufgaben

- 1. Parametertests:
  - Mittelwerttest ( $\sigma^2$  bekannt/unbekannt)
  - Varianztest
  - Anteilstest
- 2. Vergleich zweier Stichproben:
  - Abhängige Stichproben
  - Unabhängige Stichproben
  - Gleiche/verschiedene Varianzen
- 3. p-Wert Berechnung:
  - Ein-/zweiseitige Tests
  - Verschiedene Verteilungen

Hypothesentests für die Gleichheit der unbekannten Mittelwerte u1 und u2 zweier Normalverteilungen

Mögliche Fehlerquellen bei Hypothesentests

Fehlerarten bei Hypothesentests

	$H_0$ annehmen	$H_0$ ablehnen
$H_0$ wahr	Richtige Entscheidung	Fehler 1. Art ( $\alpha$ )
$H_0$ falsch	Fehler 2. Art ( $\beta$ )	Richtige Entscheidung

- Fehler 1. Art:  $\alpha$  (Signifikanzniveau)
- Fehler 2. Art:  $\beta$  (abhängig vom wahren Wert)
- Teststärke:  $1 - \beta$  (Wahrscheinlichkeit für richtige Ablehnung)

Allgemeine Bemerkungen zu Hypothesentests

Weitere Beispiele

Deskriptive Statistik

- Merkmalstypen - Praktische Beispiele
- **Nominal:** Geschlecht, Automarke, Blutgruppe
  - **Ordinal:** Bildungsabschluss, Zufriedenheit (1-5), Kaufkraft (tief/mit-tel/hoch)
  - **Diskret metrisch:** Anzahl Kinder, Würfelaugen, Stockwerke
  - **Stetig metrisch:** Temperatur, Gewicht, Länge

Kombinatorik

- Zahlenschloss** Ein Zahlenschloss hat 6 Stellen, jede mit Ziffern 0-9.
- Reihenfolge wichtig? Ja (Variation)
  - Wiederholungen erlaubt? Ja
  - Formel:  $n^k = 10^6$  mögliche Kombinationen

- Lotto** 6 aus 49 ziehen:
- Reihenfolge wichtig? Nein (Kombination)
  - Wiederholungen erlaubt? Nein
  - Formel:  $\binom{49}{6} = \frac{49!}{6!(49-6)!}$  mögliche Kombinationen

- Zahnarztproblem** 3 Spielzeuge aus 5 Töpfen ziehen:
- Reihenfolge wichtig? Nein (Kombination)
  - Wiederholungen erlaubt? Ja
  - Formel:  $\binom{5+3-1}{3} = \binom{7}{3}$  mögliche Kombinationen

- Komplexeres Beispiel: Mannschaftsauswahl** In einer Klasse von 20 Studierenden sollen:
- Eine 11er Fußballmannschaft gebildet werden
  - Mit genau 6 Frauen und 5 Männern
  - Es gibt 8 Frauen und 12 Männer in der Klasse

**Lösung:** 1. Wähle 6 aus 8 Frauen:  $\binom{8}{6}$  2. Wähle 5 aus 12 Männern:  $\binom{12}{5}$  3. Multipliziere:  $\binom{8}{6} \cdot \binom{12}{5} = 22,176$  Möglichkeiten

Wahrscheinlichkeitsrechnung

**Wahrscheinlichkeit bei Rommé**  
Beim Rommé spielt man mit **110 Karten:** sechs davon sind **Joker**. Zu Beginn eines Spiels erhält jeder Spieler genau **12 Karten**.  
In wieviel Prozent aller möglichen Fälle sind darunter **genau zwei Joker**?

$$\frac{\binom{6}{2} \cdot \binom{104}{10}}{\binom{110}{12}}$$

In wieviel Prozent aller möglichen Fälle ist darunter **mindestens ein Joker**?

$$1 - \frac{\binom{104}{12}}{\binom{110}{12}}$$

**Geschwister und Geburtsmonat**  
Sind in mehr als 60% aller Fälle von vier (nicht gleichaltrigen) Geschwis-tern mindestens zwei im gleichen Monat geboren?

$$1 - \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{12^4}$$

**Anordnung von Büchern**  
Auf wie viele Arten lassen sich 10 Bücher in ein Regal reihen?

$$n = 10, \quad k = 10$$
$$\frac{n!}{(n-k)!} = 10!$$

**Glühbirnen auswählen**  
Von **100 Glühbirnen** sind genau **drei defekt**. Es werden nun **6 Glühbir-nen** zufällig ausgewählt.  
Wie viele Möglichkeiten gibt es, wenn sich **mindestens eine defekte** Glühbirne in der Auswahl befinden soll?

$$\binom{100}{6} - \binom{97}{6} = 203'880'032$$

Mit wie viel Prozent Chancen ist bei einer Auswahl von 6 Glühbirnen **keine defekt**?

$$\frac{\binom{97}{6}}{\binom{100}{6}}$$

**Buchstabenkombinationen**  
Wie viele Worte lassen sich aus den Buchstaben des Wortes ABRA-KADABRA bilden? (Nur Worte in denen alle Buchstaben vorkommen!)  
 $A = 5x, \quad B = 2x, \quad R = 2x, \quad D = 1x, \quad K = 1x$

$$\binom{11}{5} \cdot \binom{6}{2} \cdot \binom{4}{2} \cdot \binom{2}{1} \cdot \binom{1}{1} = 83160$$

- Kartenspiel: Rommé Aufgabe:** Beim Rommé spielt man mit 110 Kar-ten, davon sind 6 Joker. Jeder Spieler erhält 12 Karten.  
**Teil 1:** Berechne die Wahrscheinlichkeit für genau zwei Joker.
- **Ergebnisraum:** Alle möglichen 12-Karten-Hände:  $|\Omega| = \binom{110}{12}$
  - **Günstige Ereignisse:**
    - 2 Joker aus 6:  $\binom{6}{2}$
    - 10 Nicht-Joker aus 104:  $\binom{104}{10}$

- **Berechnung:**  $P(2 \text{ Joker}) = \frac{\binom{6}{2} \cdot \binom{104}{10}}{\binom{110}{12}}$
- Teil 2:** Berechne die Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Joker.
- **Strategie:** Berechnung über Gegenereignis (kein Joker)

- **Berechnung:**  $P(\text{mind. 1 Joker}) = 1 - \frac{\binom{104}{12}}{\binom{110}{12}}$

**Glühbirnen-Problem Aufgabe:** Von 100 Glühbirnen sind 3 defekt. Es werden 6 zufällig ausgewählt.

**Teil 1:** Anzahl Möglichkeiten mit mindestens einer defekten Glühbirne.

- **Gesamtmöglichkeiten:**  $\binom{100}{6}$
- **Gegenereignis:** Keine defekte =  $\binom{97}{6}$
- **Lösung:**  $\binom{100}{6} - \binom{97}{6} = 203'880'032$

**Teil 2:** Wahrscheinlichkeit für keine defekte Glühbirne.

$$P(\text{keine defekt}) = \frac{\binom{97}{6}}{\binom{100}{6}}$$

Beispiele

Erwartungstreue Schätzfunktion Grundgesamtheit mit Erwartungswert  $\mu$ , Varianz  $\sigma^2$  und Zufallsstichprobe  $X_1, X_2, X_3$ . Die folgende Schätzfunktion ist gegeben:

$$\Theta_1 = \frac{1}{3} \cdot (2X_1 + X_2)$$

$\Theta_1$  = Schätzfunktion  
 $X_1, X_2$  = Zufallsvariablen aus der Stichprobe

Ist diese Schätzfunktion erwartungstreu (Parameter:  $\mu$ )?

$$E(\Theta_1) = E\left(\frac{1}{3} \cdot (2X_1 + X_2)\right) = \frac{1}{3} \cdot (2E(X_1) + E(X_2))$$

$$E(\Theta_1) = \frac{1}{3} \cdot (2\mu + \mu) = \frac{3\mu}{3} = \mu$$

$E(\Theta_1)$  = Erwartungswert der Schätzfunktion  
 $E(X_1), E(X_2)$  = Erwartungswerte der einzelnen Zufallsvariablen  
 $\mu$  = Wahrer Parameterwert

Da  $E(\Theta_1) = \mu$  ist die Funktion erwartungstreu.

**Intervallschätzung für die Varianz** Für die Varianz  $\sigma^2$  einer Normalverteilung mit Stichprobenumfang  $n = 10$  und Stichprobenvarianz  $s^2 = 16$  soll ein 99%-Vertrauensintervall berechnet werden.

1. Verteilungstyp: Chi-Quadrat-Verteilung
2. Freiheitsgrade:  $f = n - 1 = 9$
3. Quantile:  $c_1 = \chi^2_{(0.005;9)} = 1.735, \quad c_2 = \chi^2_{(0.995;9)} = 23.589$
4. Vertrauensintervall:

$$\frac{(n-1)s^2}{c_2} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{c_1}$$

$n$  = Stichprobenumfang  
 $s^2$  = Stichprobenvarianz  
 $c_1, c_2$  = Chi-Quadrat-Quantile  
 $\sigma^2$  = Wahre Varianz der Grundgesamtheit

$$\frac{9 \cdot 16}{23.589} \leq \sigma^2 \leq \frac{9 \cdot 16}{1.735}$$
$$6.10 \leq \sigma^2 \leq 82.99$$

**Bernoulli-Anteilsschätzung** Ein Vertrauensintervall für den Parameter  $p$  einer Bernoulli-Verteilung soll aus einer Stichprobe mit  $n = 100$  und  $\bar{x} = 0.42$  bei einem Vertrauensniveau von 95% berechnet werden.

1. Prüfen der Voraussetzung:  $n\hat{p}(1-\hat{p}) = 100 \cdot 0.42 \cdot 0.58 = 24.36 > 9$
2. Quantil:  $c = u_{0.975} = 1.96$
3. Standardfehler:  $\sqrt{\frac{\bar{x}(1-\bar{x})}{n}} = \sqrt{\frac{0.42 \cdot 0.58}{100}} = 0.0494$
4. Vertrauensintervall:

$$0.42 \pm 1.96 \cdot 0.0494 = [0.323; 0.517]$$

$n$  = Stichprobenumfang  
 $\bar{x}$  = Stichprobenmittelwert (Anteil der Erfolge)  
 $\hat{p}$  = Geschätzter Parameter der Bernoulli-Verteilung  
 $u_{0.975} = 97.5$