Nordlys™ （ノーリス）治療に関する説明・同意書

ノーリス（IPL 光治療）は、レーザーとは異なる光エネルギーを使用した治療法です。波長域を広く照射する I2PL(アイ・ツー・ピー・エル)と呼ばれる次世代型 IPL(=IntensePulsedLight)の光を肌に照射することで、安全かつ効果的に治療でき、シミや赤ら顔に効果を発揮します。
肌トラブルの原因となる物質に対してピンポイントに作用することができる点が特徴です。そのため、従来の IPL よりも肌への負担や痛み、リスクを抑制することができます。
シミやそばかすの原因となるメラニン色素に照射することで、肌のターンオーバーが促進され、損傷を受けた細胞が角質として排除されるので、肌にかさぶたのような変化が見られ徐々に薄くなっていきます。
また、赤ら顔の原因である毛細血管の開きに対しては、ヘモグロビンに IPL の光を吸収させることで、拡張している毛細血管が熱作用により収縮し、肌の赤みが軽減されます。
さらに、IPL を照射することによって発生する熱により線維芽細胞が活性化されコラーゲンが産生されます。
その結果、肌の弾力が増し、肌質改善に繋がります。

◆効果

シミ、そばかす、くすみ、ニキビ跡の色素沈着、毛細血管拡張症、赤ら顔、赤色細胞腫、肌のハリ・ツヤ

◆施術が受けられない方

- 妊娠、授乳中の方
- 肝斑のある方
- 心臓にペースメーカーや植え込み式除細動器を使用中、重篤な心疾患に罹患している方
- 光線過敏症のある方や日光過敏を高める薬を服用中の方
- リウマチなどで金製剤を用いて治療中または使用歴がある方
- 強い日焼けをされている方
- 色黒のスキンタイプの方（熱傷を生じる可能性があります。）
- シリコンや金属プレート等の人工物を埋め込んでいる部位
- 感染性の皮膚疾患、または強い皮膚炎、切開創、開放創、炎症のある部位
- 刺青、アートメイクが入っている部位
- 医療やエステでの顔脱毛やフェイシャル治療後、 4 週間以内の方
- 悪性腫瘍直上、単純ヘルペス 1 型、2 型の活動性病変部位

◆施術に注意が必要な方

・　ケロイド体質の方
・　糖尿病などの内分泌疾患に罹患しており、創傷治癒に障害がある方
・　免疫抑制を引き起こす疾患、免疫抑制剤使用中の方
・　出血性疾患に罹患または抗血小板薬/抗凝固剤（血をさらさらにする薬）を使用中の方

◆施術間隔

１か月に１回を５回程度

その後、効果を維持させるためには定期的(3〜6 ヶ月に１回程度)に施術することをお勧めしています。継続的な治療によって、シミや赤ら顔、赤みを伴うニキビ跡などの改善が段階的に実感できるようになります。

◆副作用・リスク

・　赤み、腫れ、熱感
・　一時的な皮膚のひりつきや乾燥感、皮むけ
・　肝斑の悪化
・　やけどや感染症、瘢痕形成など
・　色素沈着
・　内出血

◆治療後のケア、注意

・　施術後の皮膚は敏感となっていますので、アルコール成分入りのスキンケア、スクラブ剤などのご使用は　　お控えください。
・　お肌に異常がなければ直後からスキンケアやメイク可能です。摩擦に注意し、しっかり保湿してください。
・　治療部位は掻いたり、擦ったりしないでください。皮膚を傷つけることで色素沈着になる可能性があります。
・　日焼けしやすい状態なので治療後は日焼け止めを塗り、紫外線予防対策を行ってください。
・　飲酒、運動、サウナ、温泉は翌日から可能です。

＊経過を観察する目的で施術部位の写真を撮らせて頂くことがあります。
撮影させて頂いた写真は厳重に保管し、　患者様との経過観察以外で無断使用することはありませんので
ご安心ください。
＊治療には副作用が発症する可能性があることをご理解頂いた上で治療をお受けください。
＊上記に関しましては、一般的な内容であり、症状等により個人差があること、何卒ご理解ください。

Nordlys^{TM} （ノーリス）治療に関する同意書

みらい内科クリニック　院長殿

私は、上記のノーリス治療の作用、副作用および安全性について充分に理解し、
ノーリス治療を受けること、写真撮影に同意します。

年　　月　　日

氏　名