

サーマニードル EVO(RF 治療)に関する説明・同意書

極細の針(マイクロニードル)を皮膚に挿入し、RF(ラジオ波)を照射するニードル RF 治療です。

マイクロニードルを皮膚に刺し、針を通して真皮層へ直接 RF のエネルギーを届けます。

ニードルでわざと肌を傷つけることで、創傷治癒効果(傷を治そうとする力)によりターンオーバーが促進され、くすみ・毛穴・ニキビ跡などのあらゆる肌悩みを改善します。

さらに RF によって、真皮のコラーゲンやエラスチンの産生が促され、肌のハリ感向上や引き締め効果も得られます。

◆効果

ニキビ、ニキビ跡のクレーター、シワ、たるみ、毛穴、赤み、肝斑、くすみ

◆施術間隔

効果を維持、継続させるためには定期的(2～3ヶ月に1回程度)に施術を行うことをお勧めしています。

◆施術が受けられない方

- ・妊娠中/授乳中の方
- ・体内にプレートや金の糸などの金属類を入れている方(吸収糸の場合は施術3ヶ月以降であれば可能)
- ・ペースメーカー、埋め込み型除細動器を留置している方
- ・麻酔アレルギーのある方
- ・単純性ヘルペスや重度のニキビなど皮膚炎の方
- ・金属アレルギーの方
- ・重度の糖尿病、膠原病などの創傷治癒が遅くなる疾患を有する方
- ・ケロイド体質の方
- ・出血傾向、出血性疾患のある方
- ・抗血小板薬(バイアスピリン)、抗凝固剤(ワーファリン)などを服用している方
- ・皮膚がんまたはがんの疑いのある方
- ・医療やエステでの顔脱毛やフェイシャル施術前後1ヶ月以内の方
- ・プロテーゼ挿入されている方
- ・注入治療(コラーゲンやヒアルロン酸、ボトックス注入、脂肪溶解注射)前後 4 週間以内の方
- ・市販のスクラブ配合商品の使用前後 2 週間以内の場合
- ・皮膚剥離系化粧品(ゼオスキンなど)の使用前後 1 ヶ月以内の場合
- ・レチノール、ハイドロキノン、ピーリング効果のある製剤(トレチノイン、サリチル酸、グリコール酸など)、
ニキビ治療薬(ディフェリンゲル、ベピオゲルなど)を使用している方
(施術 2 週間前から使用を中止し、再開する場合は、施術後 1 週間経過してから使用してください)

◆副作用

- ・まれに施術部位の火傷、発赤、腫脹、熱感などが起こることがあります。
- ・1～2週間程度は肌が生まれ変わる過程で肌のざらつき、皮むけ、かさぶたなどが生じる可能性があります。
- ・まれに赤みが残ることもありますが数日～1週間程度でほぼ消失します。

◆注意事項

- ・紫外線対策を徹底してください。
- ・シャワー、洗顔、スキンケアは施術の6時間後から可能です。日焼け止め、メイクは施術翌日から可能です。
- ・施術当日は激しい運動、入浴、サウナ、飲酒は避けてください。
- ・治療部位は掻いたり、擦ったりしないでください。皮膚を傷つけることで色素沈着になる可能性があります。

※経過観察をする目的で施術部位の写真を撮らせていただくことがございます。撮影させていただいた写真に関しては、厳重に保管し患者様との経過観察以外で無断使用することはありませんのでご安心ください。

治療には副作用が発症する可能性があることをご理解いただいた上で治療をお受けください。
上記に関しましては一般的な内容であり、症状等により個人差がある旨、何卒ご理解下さい。

サーマニードル EVO の治療に関する同意書

みらい内科クリニック院長 殿

私は、上記のサーマニードル EVO 治療の作用、副作用および安全性について十分に理解し、
治療を受けることに同意します。

年 月 日

氏名
