

## 高濃度ビタミン C 点滴療法(アンチエイジング)

高濃度ビタミン C 点滴療法は、がんの先進治療としてアメリカを始め世界中で研究・実践されている最先端の治療法です。この点滴療法に美肌や疲労回復、健康維持などの効果があることから、アンチエイジング分野でも広く使用されるようになりました。

### 〈目的・適応疾患〉

#### 【生活習慣が気になっている】

- ・タバコをたくさん吸う
- ・お酒をよく飲む
- ・ストレスを溜めやすい
- ・外にいることが多い
- ・疲れ・倦怠感を感じるが多い
- ・寝起きが悪い

#### 【お肌などの悩みがある】

- ・最近シミが気になる
- ・お肌に透明感が欲しい
- ・日焼けをしてしまった
- ・毛穴の開きが悩み
- ・ニキビや肌荒れに悩んでいる
- ・お肌の弾力がなくなった
- ・髪にコシ・ツヤがなくなった

#### 【病気を予防・改善したい】

- ・風邪・インフルエンザの予防
- ・ガン予防を考えている
- ・老化を遅らせたい
- ・歯周病が心配
- ・アトピーを改善したい

■以下のような方は、高濃度ビタミン C 点滴が受けられません。

当院では、G6PD 欠損症の有無を確認するため、事前に血液検査を実施します。

- ・ G6PD 欠損(低下)症の方(欠損していると、点滴により溶血を起こすことがあります)
- ・ 高度の腎不全の方
- ・ 人工透析を受けている方
- ・ 高度な心不全の方
- ・ インスリン持続自動注射を使用されている方
- ・

#### ■注意の必要な方

- ・ 糖尿病の方
- ・ 尿管結石・腎結石のある方
- ・ 妊娠・授乳中の方

#### ■注意事項

##### \*G6PD 活性検査について

超高濃度ビタミン C 点滴を受けられる方には G6PD 活性検査を受けていただき、安全に点滴できる体質であるか診断いたします。

G6PD 欠損症は、赤血球にある G6PD という酵素の欠損により、溶血(赤血球が破壊される)が起こる病気です。

G6PD 欠損症であると判明した場合は、高濃度ビタミン C 点滴実施をお断りする場合があります

検査結果がでるまで、1 週間程度要します。

＊他院で検査済みの方は検査不要ですので、来院当日に検査証明書・検査結果をご持参ください。

## ■ 副作用・合併症

ごくまれですが、下記の症状が起こる場合があります。

- ・出血、発熱
- ・口喝、吐き気、冷や汗、頭痛など低血糖症状
- ・注射部位および周囲の痛み、発赤、皮下出血斑
- ・血管痛、迷走神経反射
- ・低血糖
- ・穿刺による神経損傷

## ■〈料金表〉（税込）

|                              |       |          |
|------------------------------|-------|----------|
| ・G6PD 検査(高濃度ビタミン C が初診の方は必須) |       | 8,800 円  |
| ・高濃度ビタミンC点滴                  | 12.5g | 7,700 円  |
|                              | 25g   | 8,800 円  |
|                              | 50g   | 16,500 円 |

## ■点滴の所要時間

|       |        |
|-------|--------|
| 12.5g | 30 分程度 |
| 25g   | 40分程度  |
| 50g   | 60分程度  |

## ■施術間隔

美容目的の場合：初めの 1 か月は 1 週間に 1 回、それ以降は4週に 1 回程度(理想)  
月に 1～2 回程度の点滴を定期的に続けることをお勧めします。

## ■高濃度ビタミン C 点滴の流れ

### ①医師の診察

現在の身体の状態や病歴、内服歴などを確認させていただきます。

### ②検査(初回の方のみ)

高濃度ビタミン C 点滴を安全に行うため、G6PD スクリーニング検査を行います。

＊検査結果がでるまで、**1 週間程度**要します。1週間以降に診察・点滴の予約をお取りください。

＊他院で検査済みの方は検査不要ですので、来院当日に検査証明書・検査結果をご持参ください。

＊G6PD 欠損症であると判明した場合は、高濃度ビタミン C 点滴実施をお断りします。

### ③点滴

目的や症状に合わせて、ビタミン C の点滴を行います。点滴の所要時間はビタミン C の容量により異なります。

### ④会計

点滴終了後、ご会計と次回の点滴予約をお願いいたします。

## 高濃度 VC プロトコル

アンチエイジングを目的にビタミン C 点滴を行う場合は、多くの場合が 12.5g から 25g のビタミン C を使用します。

■日本における基本プロトコルでは以下の薬剤を使用します。

クリニックによって追加の薬剤を入れるなど、患者のニーズに合わせてアレンジが可能です。

- ・ 注射用蒸留水(500ml ソフトバッグ)
- ・ 高濃度ビタミン C 製剤(25g)(50%, 50ml)
- ・ 補正用硫酸マグネシウム 1mEq/L(20ml)

リオルダンIVCプロトコル変法

|   | VitC投与量 | 蒸留水   | MgSO4<br>(1mEq/ml) | 投与時間   |
|---|---------|-------|--------------------|--------|
| A | 12.5g   | 150ml | 2ml                | 30分    |
| B | 25g     | 250ml | 3ml                | 50分    |
| C | 50g     | 500ml | 4ml                | 60-75分 |

グルタチオン点滴やマイヤーズカクテルにビタミンCを追加することも可能

## ●マイヤーズ+VC25G

〈適応〉疲労回復、慢性疲労、アンチエイジングなど

【プロトコル】

- ① 蒸留水 300ml
- ② 50%ビタミン C 50ml
- ③ 補正用硫酸 Mg 10ml
- ④ ビタメジン 1V
- ⑤ シーパラ 1A
- ⑥ パンテニール 1A

\*40 分以上で点滴する。

## 〈IVC PUSH〉

10 分以内でも施術可能な、忙しい方向けの施術です。

\*2015 年開催の点滴療法研究会スペシャルセミナーで、リオルダンクリニック所長ロナルド・ハニハイキ先生はビタミン C 7.5g の急速静注法『リオルダン IVC プッシュ』(Riordan IVC-PUSH)を発表しました。

## ■ 必要な製剤・備品

- ・ 高濃度ビタミン C 製剤(25g)(50%, 50ml)

- ・ 補正用硫酸マグネシウム 1mEq/L(20ml)(大塚製薬工場)
- ・ メイロン静注 8.4%(大塚製薬工場)
- ・ 大塚蒸留水 100ml プラボトル(大塚製薬工場)
- ・ プラスチックシリンジ 20ml 1 本 50mL 2 本
- ・ 翼状針 22～23G(オリジナル動画では 21G)

※**必ず蒸留水**を使用する。生理食塩水や5%ブドウ糖液は使用しない

## ■ 施術プロトコル

- (1) 大塚蒸留水 100ml プラボトルから蒸留水 15mL を吸引して 85 mL とする
- (2) ビタミン C 15 mL(7.5g)、補正用硫酸マグネシウム 4 mL、メイロン 5 mL をプラボトルの中に混注する
- (3) プラボトルを軽く転倒混和し、内容溶液を均一する
- (4) 50 mL シリンジ 2 本に分注する(1 本あたり 55 mL)
- (5) シリンジ 2 本を、患者の状態に合わせ、10 分ほどかけて静注する

## 蒸留水を使用する理由

高浸透圧のビタミン製剤のため、溶液の浸透圧が高すぎるため、溶血や血管痛を引き起こす。溶血程度により心・腎不全を発症し、場合によっては死に至るため。

## いつから効果を実感できる？

高濃度ビタミン C 点滴は疲労感に対しては即効性があります。美容目的での施術の場合は早くて 2 週間後くらいから効果を実感することができますが、個人差があります。

## どれくらいの頻度で行うと良い？

高濃度ビタミン C 点滴の効果は長くても 1 週間程度です。そのため、効果を実感し続けたいなら定期的に施術を受けることが必要です。美容目的の場合は初めの 1 か月は 1 週間に 1 度、それ以降は 1 か月に 1 度の頻度で施術を受けると良いといわれています。

## 糖尿病の方

インスリン注射をしている人で、自己血糖測定器を使用中的の方

自己血糖測定器で血糖測定を行うと偽高血糖となる：過去に誤って過剰なインスリン投与して死亡例あり。

対策：高濃度ビタミン点滴を行って、12 時間以上経過してから自己血糖測定を行う。

## 低血糖症状

点滴後に低血糖になることがある。インスリン過剰分泌によると推測される。

冷汗、震えなど低血糖症状があらわれたときは、ブドウ糖投与

点滴前はかならず食事摂取してくること

## 腎結石・尿管結石のある方

これまでの論文報告では健康成人に腎・尿管結石が起きやすいということはない。

しかしながら、尿管結石や腎結石の既往歴のある患者に対して注意が必要

## 妊娠・授乳中の点滴

妊娠中・後期でも25g ビタミン C 点滴は特にもんだいなかったが、点滴の穿刺による感染リスクや、万が一に流産したときにあらぬ疑いをもたれないようにするため、妊娠中は経口でのビタミン C 摂取を推奨する。

がんの場合

■〈料金表〉(税込)

|                              |       |          |
|------------------------------|-------|----------|
| ・G6PD 検査(高濃度ビタミン C が初診の方は必須) |       | 8,800 円  |
| ・高濃度ビタミンC点滴                  | 12.5g | 7,700 円  |
|                              | 25g   | 8,800 円  |
|                              | 50g   | 16,500 円 |
|                              | 62.5g | 24,200   |
|                              | 75g   | 25,300 円 |
|                              | 100g  | 33,000   |

■点滴の所要時間

|       |          |
|-------|----------|
| 12.5g | 30 分程度   |
| 25g   | 40分程度    |
| 50g   | 60～75 分  |
| 62.5g | 80－90 分  |
| 75g   | 90－105 分 |

# 高濃度ビタミンC点滴に関する説明書・同意書

☐ 12.5g    ☐ 25g    ☐ 50g    ☐ 75g

この説明書は今回受けられる施術に関しての注意事項が記載されています。  
下記の内容について十分に理解と納得をされた上で施術をお受けください。

- ・高濃度ビタミンCは、12.5g・25g・50g・75gがあります。
- ・高濃度ビタミンCを点滴することにより、内服での摂取よりもかなり多くのビタミンCが摂取できます。  
体内の血中濃度を急激に高めることにより活性酸素を無毒化する効果的な抗酸化作用が得られます。  
効果には個人差がありますが、しみ、肝斑、美白、しわ、くすみ、たるみ予防、癌予防の治療としても行われています。
- ・高濃度ビタミンCを施術される場合には、G6PD欠損症の有無の確認が必要となります。  
当院では高濃度ビタミンC施術の初回治療の際に採血をさせていただいており、その結果治療をお断りすることもありますのでご了承ください。※G6PD検査は必須です。(料金8,800円税込)
- ・まれに、下痢、吐き気、胸やけ、頭痛、めまい、ほてり感、口渇などの症状が出る方もいます。心配なことがありましたらご連絡をお願い致します。
- ・点滴時に、点滴部の痛みや発赤が起きる場合がございます。点滴速度を遅くする等の対応を致しますので、医師又はスタッフにお申し出ください。

以下の項目に該当する方は高濃度ビタミンC療法を受けられません。

- ・G6PD欠損（低下）症の方
- ・高度の腎不全の方、人工透析中の方、高度な心不全の方
- ・浮腫や胸水や腹水が大量にある方
- ・インスリン持続自動注射器を使用されている方

## 高濃度ビタミンC点滴に関する同意書

みらい内科クリニック 院長 殿

私は、上記の高濃度ビタミンC点滴の作用、副作用および安全性について十分に理解し、  
高濃度ビタミンC点滴を受けることに同意します。

年      月      日

氏名 \_\_\_\_\_