

Dermapen4（ダーマペン4）治療に関する説明・同意書

ダーマペン4はEquipmed社（オーストラリア）が開発した医療機器^{※1}です。医療用の極細針（33G×16本）を用いて、針の深さと速度を電動でコントロールし、皮膚に微細な穴を無数に開けることで皮膚の創傷治癒効果（修復機能）を高め、コラーゲンやエラスチンなどの増生を促し、肌質や瘢痕を改善していく治療です。

※1 本体：オーストラリアTGA認可、米国FDA申請中/針：CEマーク取得、オーストラリアTGA申請中

◆効果

ニキビ跡、肌のハリやキメ、毛穴開き、小じわ、リフティング効果など
（肌の状態により、効果には個人差があります。）

◆治療の流れ（診察時間 90 分）

洗顔後、表面麻酔クリームを塗布します。（20分程度で効果が現れます）

その後、治療目的に応じた薬剤を用いて治療を開始します。（治療時間：30分程度）

治療直後に鎮静目的のパックをします。その後、赤みを引かせるためのクリームを塗布します。

◆使用する薬剤

治療目的に応じて使い分けます。

治療効果を得るには適切な治療回数（通常3～10回 月に1回ペース）が必要となります。

◆リスク・合併症・副作用

点状出血・内出血・赤み・ほてり・乾燥・薄皮がむける・腫れ・痛み・痒み・むくみ・感染
針穴・アレルギー・色素沈着

（ほとんどの場合は数日、長い方でも1週間程度で消失します。）

◆治療後の注意

- ・治療後12時間はメイクや洗顔をしないでください。シャワー・洗髪・入浴は可能ですが、顔を濡らさないようにしてください。飲酒・運動・サウナは翌日から可能です。
- ・レチノール、ハイドロキノン、ニキビ治療薬等のピーリング作用のある製剤は、治療後1週間は使用しないでください。
- ・日焼けに注意してください。

◆スキンケア

治療当日はスキンケアは使用しないでください。市販の日焼け止めも使用できません。（含有成分が穿刺箇所に入り込み、ダウンタイムが長引いたり、副反応を生じる可能性があるため）

◆治療が受けられない方・注意が必要な方

- ・ 妊娠・授乳中の方
- ・ 麻酔アレルギーのある方
- ・ 膿疱性酒さ、滲出を伴う重度の尋常性ざ瘡、イボ、ヘルペス、強皮症、日光性角化症、出血性疾患、
皮膚癌・鉄アレルギー・脂漏性皮膚炎の方
- ・ 重度の糖尿病・膠原病などの創傷治癒が遅くなる疾患を有する方
- ・ 出血傾向・抗血小板薬（バイアスピリン）、抗凝固剤（ワーファリン）等を服用している方
- ・ ケロイド体質の方
- ・ プロテーゼ挿入されている方
- ・ 金の糸など金属類の糸リフトを入れている方
（吸収されるタイプの糸の場合は施術後3ヶ月経過していれば可能）
- ・ 2週間以内にレチノール、ハイドロキノン、ニキビ治療薬等のピーリング作用のある製剤を使用した方
- ・ 4週間以内に医療やエステでのフェイシャル、注入治療などを受けられた方
- ・ 4週間以内に皮膚剥離系化粧品（ゼオスキンなど）を使用した方
- ・ 日焼け直後の方、または日焼けをする予定のある方

※経過観察をする目的で施術部位の写真を撮らせていただくことがございます。撮影させていただいた写真に関しては、厳重に保管し患者様との経過観察以外で無断使用することはありませんのでご安心ください。

治療には副作用が発症する可能性があることをご理解いただいた上で治療をお受けください。
上記に関しましては一般的な内容であり、症状等により個人差がある旨、何卒ご理解下さい。

Dermapen4（ダーマペン4）の治療に関する同意書

みらい内科クリニック院長 殿

私は、上記のダーマペン4治療の作用、副作用および安全性について十分に理解し、
治療を受けることに同意します。

年 月 日

氏名
