

Reverse Peel(リバースピール)治療に関する説明・同意書

リバースピールは、肝斑や色素沈着の改善に特化した新しい治療です。

3つのピーリング剤を使用し、マッサージピール(PRX-T33)に加えて、メラニンを分解・排出して生成を制御させる作用のある成分を配合したピーリング剤を使用します。

ピーリング剤を真皮層から表皮に向かって通常とは逆方向に働きかけることで、メラニンの生成を抑制しつつ、表皮のメラニンを破壊し、さらに皮膚表面のターンオーバーを整えることで、効率よく肝斑、色素沈着治療するだけでなく予防も行えます。

リバースピールは3つの段階で行われます。

ステップ1：TCA(トリクロロ酢酸)、低濃度過酸化水素、コウジ酸配合製剤による真皮層への作用

ステップ2：乳酸、フィチン酸配合製剤による表皮中層～深層への作用

ステップ3：サリチル酸、グリコール酸、マンデル酸、コウジ酸、フィチン酸配合製剤による表皮浅層～中層への作用

これらにより角質を除去し肌表面を滑らかにし、メラニンやくすみ、色素沈着を改善していきます。

◆効果

色素沈着、肝斑、シミ、くすみ、ニキビ痕、毛穴の開き、肌のハリ・ツヤ、キメなど

◆副作用

- ・ 施術中は火照り感やピリピリとした刺激を感じることがあります。
- ・ 施術後、数日程度、軽度の赤みや皮剥け、軽度の腫れ、色素沈着が起きることがあります。

◆施術できない方・注意が必要な方

- ・ 妊娠、授乳中の方
- ・ アスピリンアレルギー、コウジ酸アレルギー、アルコールアレルギーのある方
- ・ アートメイクのある方
- ・ 2週間以内にトレチノイン、ハイドロキノン、過酸化ベンゾイル(ベピオ等ニキビ治療薬)を使用されている方
- ・ 重度の敏感肌の方
- ・ 皮膚に強い炎症(アトピー性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、かぶれ等)や悪性腫瘍がある方
- ・ 日焼け後の色素沈着、炎症が強い方
- ・ ヘルペス治療中の方
- ・ 日光過敏症の方
- ・ てんかんの既往歴がある方(成分により発作を誘発する可能性があります)

◆施術間隔

2～4 週間に 1 回のペースで 5 回程度の集中治療を行い、満足が得られる結果が出るまで継続されることをお勧めします。

◆副作用・リスク

- ・ 施術時に赤み、火照り感、ピリピリとした刺激、灼熱痛が出現することがあります。中和剤使用し鎮静させますがこれらの症状が持続するようであれば我慢せずお伝え下さい。その時点で十分な効果が得られたことになるため終了となります。
- ・ 色素沈着や小さな白浮きが治療部位に見られる場合があります。
- ・ 施術後は赤み、ひりつき、乾燥、軽い皮むけが起こる可能性があります。

◆治療後のケア、注意

- ・ 古くなった角質がポロポロと剥がれてくるがありますが、無理に剥がしたり、強くこすったりしないで下さい。
- ・ 施術後の皮膚は敏感となっていますので、アルコール成分入りのスキンケア・スクラブ剤などのご使用はお控え頂き、マッサージなどの摩擦や刺激をお肌に与えないように注意してください。
- ・ お肌に異常がなければ、治療当日より洗顔やメイクが可能です。が、こすらないようにしてください。
- ・ 治療後は乾燥を伴うため、効果を高めるためにも保湿は念入りに行ってください。
- ・ トレチノイン、ハイドロキノン、過酸化ベンゾイル(ベピオ等ニキビ治療薬)を使用されている方は、治療2週間前から休止してください。再開される場合は治療後2週間ほど経過してから使用してください。

*経過を観察する目的で施術部位の写真を撮らせて頂くことがあります。施術させて頂いた写真は厳重に保管し、患者様との経過観察以外で無断使用することはありませんのでご安心下さい。

*治療には副作用が発症する可能性があることをご理解頂いた上で治療をお受け下さい。

*上記に関しましては、一般的な内容であり、症状等により個人差があること、何卒ご理解下さい。

リバースピールに関する同意書

みらい内科クリニック 院長殿

私は、上記のリバースピールの作用、副作用及び安全性について十分に理解し、治療を受けることに同意します。

年 月 日

氏名 _____

保護者氏名 _____

(※20歳未満の方は保護者の同意が必要です)