

ウルティムガン（メソセラピー）治療に関する説明・同意書

ウルティムガンは、フランス製 AAMS 社が開発した次世代のメソセラピー用の医療機器です。

極めて細い針を使用するため、凹凸のあるデリケートな部位（例：目元など）にも細かく注入することが可能です。薬剤注入の速度・深さ・注入量を精密に調整できるため、表皮・真皮の浅層までスピーディかつ均等に、確実に薬剤を注入することができます。極めて細い針を使用するため施術中の痛みが軽減し、またダウンタイムもかなり軽減されたメソセラピーとして注目される機器です。

◆効果

肌の乾燥やくすみ、小じわ、毛穴開き、肌のハリやキメ、弾力性アップなどの肌質改善（肌の状態により効果には個人差があります。）

◆治療の流れ

- 1) 洗顔後、表面麻酔クリームを塗布します。（20 分程度で効果が現れます）
- 2) その後、治療目的に応じた薬剤を用いて治療を開始します。（治療時間：30 分程度）
- 3) 治療直後に保湿クリームを塗布します。

◆使用する薬剤・治療間隔

治療目的に応じて使い分けます。

治療効果を得るには 3～4 週おきに 4 回は継続し、その後は気になったタイミングで施術を継続して頂く事をお勧めしています。

◆副作用・ダウンタイム

- ・痛み：針が刺された部位や注入する薬剤で起こることがあります。
- ・内出血や軽度の腫れ：注射による注入の為、内出血や軽度の腫れ（特に目元）が生じることがあります。内出血が起こった場合は 1～2 週間で治まります。
- ・赤み、痒み、アレルギー反応
施術後は皮膚の赤み・痒みなどが起こることがありますが、2～3 日で消失します。
薬剤アレルギーの可能性が全くないわけではありません。

◆治療後の注意

- 1) 治療後は、スクラブ入り等刺激の強いものでなければ洗顔、スキンケアは可能です。マッサージなどの摩擦や刺激を肌に与えないよう注意してください。メイクは翌日から可能です。
- 2) 施術当日は激しい運動と過度な飲酒はお控えください。
- 3) 治療後は保湿を丁寧に行ってください。また日焼け止めを使用して紫外線対策を十分に行い、日焼けは避けてください。
- 4) 治療中はほてり感やピリピリとした刺激を感じることがあります。治療後は、数時間から半日程度軽度の赤み、むくみ、数日～1 週間程度の針痕（点状出血班）が残る場合があります。
- 5) トレチノイン・ハイドロキノン・レチノールを使用されている方は、治療後の赤みやひりつきなどの反応がおさまるまで 1 週間程度使用を控えてください。

◆治療が受けられない方

- ・妊娠中/授乳中の方
- ・注入する製剤にアレルギーのある方
- ・金属アレルギー（SUS304：クロム、ニッケルなどステンレス系）のある方

◆治療に注意が必要な方

- ・ケロイド体質の方
- ・出血傾向・抗凝固薬（ワーファリン）・抗血小板薬（バイアスピリン）等を服用されている方
- ・自己免疫疾患、重度の糖尿病、膠原病等の創傷治癒が遅くなる疾患のある方
- ・皮膚に、強い日焼けや皮膚炎等の炎症を起こしている方
- ・がん、化学療法の治療中の方
- ・過去にメソセラピー治療で副作用のあった方
- ・医療やエステでの、フェイシャル施術後4週間以内の方
- ・ニキビ治療でピーリング効果のある製剤を使用中の方（グリコール酸、サリチル酸マクロゴール、トレチノインやレチノール、ハイドロキノンなどを使用されている方は刺激が出やすいことがあるので施術の1週間前より使用を控えてください。）
- ・プロテーゼ挿入されている方

※以上一般的な留意事項であり、その他医師の判断で施術できない場合があります。

※使用する消毒・麻酔や薬剤にアレルギーのある方は事前にお申し出ください。

※経過観察をする目的で施術部位の写真を撮らせていただくことがございます。撮影させていただいた写真に関しては、厳重に保管し患者様との経過観察以外で無断使用することはありませんのでご安心ください。

治療には副作用が発症する可能性があることをご理解いただいた上で治療をお受けください。

上記に関しましては一般的な内容であり、症状等により個人差がある旨、何卒ご理解下さい。

ウルティムガン（メソセラピー）の治療に関する同意書

みらい内科クリニック院長 殿

私は、上記のウルティムガン治療の作用、副作用および安全性について十分に理解し、
治療を受けることに同意します。

年 月 日

氏名
