

밭 토양 비료사용 처방서



경지 현황

조사번호	2026-14	작물명	오미자(3년이상)		재배면적	3,637 m ²	
농경지주소	강원특별자치도 양구군 동면 팔랑리 774						
토양통	지곡통	지형	곡간지/선상지	심토토성	사양질	배수등급	양호
토양특성	비가 많이 오면 흙과 양분이 유실되기 쉬우므로 철저한 배수시설 관리와 침식방지대책(승수구 설치, 등고선 재배등)이 필요합니다.						

토양의 이화학적 특성

항목 (단위)	적정 범위	분석 결과	적음	적정	많음	유기물 관리가 필요합니다.
pH(1:5)	6.0 ~ 6.5	6.5				
유기물 (g/kg)	20 ~ 30	20				
유효인산 (mg/kg)	200 ~ 600	299				
칼륨 (cmol+/kg)	0.4 ~ 0.7	0.50				
칼슘 (cmol+/kg)	3.0 ~ 6.0	5.2				
마그네슘 (cmol+/kg)	1.0 ~ 2.0	2.3				
전기전도도 (dS/m)	0.0 ~ 2.0	0.20				

비료 추천량 (kg / 3,637 m²) * 비료는 단일비료 또는 복합비료를 선택하여 사용하세요.

구분	혼합가축분퇴비(우분퇴비)④	소석회(석회고토)	단일비료로 줄 때 비료량*			복합비료를 줄 때 비료량②	
			요소(유안)	용성인비(용과린)	염화칼륨(황산칼륨)	비료종류	사용량
밀거름	2,599 (6,825)	- (-)	53 (115)	121 (121)	35 (42)	21-17-17	114
웃거름	-	-	53 (115)	0 (0)	15 (18)	18-0-16	134

* 10a(1000m²)당 필요한 비료성분량(kg, 밀거름/웃거름): 질소(6.6/6.6), 인산(6.7/0.0), 칼리(5.7/2.4)

① 혼합가축분퇴비 대신 돈분퇴비를 주실 경우 1,502kg, 계분퇴비를 주실 경우 1,160kg을 주시면 됩니다.

② 복합비료는 질소 기준으로 계산되었습니다.

<참고> 오미자(3년이상) 재배시에 밀거름은 추천한 비료량을 사용하시고 웃거름은 생육상태에 따라 다소 조절해 주셔도 됩니다.