

시설 토양 비료사용 처방서



경지 현황

조사번호	2025-28	작물명	토마토(시설)	재배면적	2,267 m ²
농경지주소	강원특별자치도 양구군 해안면 오유리 39-5				
토양통		지형		심토토성	배수등급
토양특성	해당 없음				

토양의 이화학적 특성

항목(단위)	적정범위	분석결과	적음	적정	많음	pH가 낮은 토양에서는 아질산가스 발생에 의해 작물 생육이 저조할 수 있습니다. 석회질비료와 퇴비를 살포하고, 인산질 비료는 적게 주는것이 좋습니다.
pH(1:5)	6.0~6.5	5.2				
유기물(g/kg)	20~30	26				
유효인산(mg/kg)	400~500	915				
칼륨(cmol+/kg)	0.7~0.8	2.31				
칼슘(cmol+/kg)	5.0~6.0	12.3				
마그네슘(cmol+/kg)	1.5~2.0	2.7				
전기전도도(dS/m)	0.0~3.0	6.25				

비료 추천량 (kg / 2,267 m²) * 비료는 단일비료 또는 복합비료를 선택하여 사용하세요.

구분	혼합가축분퇴비(우분퇴비)①	소석회(석회고토)	단일비료로 줄 때 비료량*			복합비료를 줄 때 비료량②	
			요소(유안)	용성인비(용과린)	염화칼륨(황산칼륨)	비료종류	사용량
밀거름	1,729 (4,540)	226 (257)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	21-17-17	0
웃거름	-	-	0 (0)	0 (0)	0 (0)	18-0-6	0

* 10a(1000m²)당 필요한 비료성분량(kg, 밀거름/웃거름): 질소(0.0/0.0), 인산(0.0/0.0), 칼리(0.0/0.0)

① 혼합가축분퇴비 대신 돈분퇴비를 주실 경우 999kg, 계분퇴비를 주실 경우 772kg을 주시면 됩니다.

② 복합비료는 질소 기준으로 계산되었습니다.

<참고> 토마토(시설) 재배시에 추천한 비료량을 밀거름으로 전량 사용하시기 바랍니다.