

시설 토양 비료사용 처방서



경지 현황

조사번호	2026-91	작물명	토마토(시설)		재배면적	3,306 m ²	
농경지주소	강원특별자치도 양구군 해안면 오유리 1461						
토양통	월곡통	지형	곡간지/선상지	심토토성	사양질	배수등급	약간양호
토양특성	자갈이 많은 토양으로 작물 뿌리의 뻗음이 나쁘고 경종관리가 어렵기 때문에 토심을 높이기 위하여 자갈을 제거하거나 객토등의 토양관리가 필요합니다.						

토양의 이화학적 특성

항목(단위)	적정범위	분석결과	적음	적정	많음	대체로 지력은 좋은 편입니다. 인산질 비료는 적게 주는것이 좋습니다.
pH(1:5)	6.0~6.5	5.6				
유기물(g/kg)	20~30	30				
유효인산(mg/kg)	400~500	1012				
칼륨(cmol+/kg)	0.7~0.8	3.99				
칼슘(cmol+/kg)	5.0~6.0	12.0				
마그네슘(cmol+/kg)	1.5~2.0	4.3				
전기전도도(dS/m)	0.0~3.0	7.84				

비료 추천량 (kg / 3,306 m²) * 비료는 단일비료 또는 복합비료를 선택하여 사용하세요.

구분	혼합가축분퇴비(우분퇴비)①	소석회(석회고토)	단일비료로 줄 때 비료량*			복합비료를 줄 때 비료량②	
			요소(유안)	용성인비(용과린)	염화칼륨(황산칼륨)	비료종류	사용량
밀거름	2,521 (6,620)	330 (374)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	21-17-17	0
웃거름	-	-	0 (0)	0 (0)	0 (0)	18-0-16	0

* 10a(1000m²)당 필요한 비료성분량(kg, 밀거름/웃거름): 질소(0.0/0.0), 인산(0.0/0.0), 칼리(0.0/0.0)

① 혼합가축분퇴비 대신 돈분퇴비를 주실 경우 1,456kg, 계분퇴비를 주실 경우 1,125kg을 주시면 됩니다.

② 복합비료는 질소 기준으로 계산되었습니다.

<참고> 토마토(시설) 재배시에 추천한 비료량을 밀거름으로 전량 사용하시기 바랍니다.