




1920年，美国物理学家康普顿在观察X 射线被物质散射时，发现**散射线**中含有**波长**发生了**变化**的成分——散射束中除了有与入射波长 λ_0 相同的射线，还有波长 $\lambda > \lambda_0$ 的射线。



一 实验装置






二 实验结果

1 波长的偏移
($\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$) 与
散射角有关.

2 $\Delta\lambda$ 与散射
物体无关.

I (相对强度)





三 经典理论的困难


按**经典**电磁理论，带电粒子受到入射电磁波的作用而发生受迫振动，从而向各个方向辐射电磁波，**散射束**的频率应与**入射束**频率**相同**，带电粒子仅起能量传递的作用。

可见，经典理论无法解释波长变长的散射线。



四 量子解释

1 物理模型




◆ 入射光子（X射线或 γ 射线）能量大。

$$E = h\nu \quad \text{范围为: } 10^4 \sim 10^5 \text{ eV}$$



- ◆ 电子热运动能量 $\ll h\nu$ ，可近似为**静止电子**.



- ◆ 固体表面电子束缚较弱，视为**近自由电子**.
- ◆ 电子反冲速度很大，用**相对论力学**处理.



2 定性分析

(1) 入射光子与散射物质中束缚微弱的电子弹性碰撞时，一部分能量传给电子，散射光子能量减少，频率下降、波长变大。

(2) 光子与原子中束缚很紧的电子发生碰撞，近似与整个原子发生弹性碰撞时，能量不会显著减小，所以散射束中出现与入射光波长相同的射线。



3 定量计算


能量守恒

$$h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2 \quad (1)$$

动量守恒

$$\frac{h\nu_0}{c} \vec{e}_0 = \frac{h\nu}{c} \vec{e} + m\vec{v} \quad (2)$$

$$m^2v^2 = \frac{h^2\nu_0^2}{c^2} + \frac{h^2\nu^2}{c^2} - 2\frac{h^2\nu_0\nu}{c^2} \cos \theta \quad (3)$$





$$m^2 v^2 = \frac{h^2 \nu_0^2}{c^2} + \frac{h^2 \nu^2}{c^2} - 2 \frac{h^2 \nu_0 \nu}{c^2} \cos \theta$$

式(1)平方得 $m^2 c^4 (1 - \frac{v^2}{c^2}) =$

$$m_0^2 c^4 - 2 h^2 \nu_0 \nu (1 - \cos \theta) + 2 m_0 c^2 h (\nu_0 - \nu)$$

$$m = m_0 (1 - v^2 / c^2)^{-1/2}$$

$$\frac{c}{\nu} - \frac{c}{\nu_0} = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta) = \lambda - \lambda_0 = \Delta \lambda$$



$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_0c} (1 - \cos \theta) = \frac{2h}{m_0c} \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

◆ 康普顿波长 $\lambda_C = \frac{h}{m_0c} = 2.43 \times 10^{-12} \text{ m}$

◆ 康普顿公式

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_0c} (1 - \cos \theta) = \lambda_C (1 - \cos \theta)$$



4 结论


◆ 散射光波长的改变量 $\Delta\lambda$ 仅与 θ 有关.

$$\theta = 0, \Delta\lambda = 0$$

$$\theta = \pi, (\Delta\lambda)_{\max} = 2\lambda_C$$

◆ 散射光子能量减小

$$\lambda > \lambda_0, \nu < \nu_0$$





5 讨论

◆ 光具有波粒二象性

一般而言，光在传递过程中，波动性较为显著；光与物质相互作用时，粒子性比较显著.

◆ 若 $\lambda_0 \gg \lambda_C$ 则 $\lambda \approx \lambda_0$ ，可见光观察不到康普顿效应.



- ◆ $\Delta\lambda$ 与 θ 的关系与物质无关，是光子与近自由电子间的相互作用。
- ◆ 散射中 $\Delta\lambda = 0$ 的散射光是因光子与紧束缚电子的作用。原子量大的物质，其电子束缚较强，因而康普顿效应不明显。



6 物理意义

- ◆ 光子假设的正确性，狭义相对论力学的正确性。
- ◆ 微观粒子的相互作用也遵守能量守恒和动量守恒定律。



例1 波长 $\lambda_0 = 1.00 \times 10^{-10} \text{ m}$ 的 X 射线与静止的自由电子作弹性碰撞，在与入射角成 90° 角的方向上观察， **问：**

- (1)** 散射波长的改变量 $\Delta\lambda$ 为多少？
- (2)** 反冲电子得到多少动能？
- (3)** 在碰撞中，光子的能量损失了多少？



解

$$\begin{aligned} (1) \quad \Delta\lambda &= \lambda_C (1 - \cos\theta) = \lambda_C (1 - \cos 90^\circ) = \lambda_C \\ &= 2.43 \times 10^{-12} \text{ m} \end{aligned}$$

(2) 反冲电子的动能

$$E_k = mc^2 - m_0c^2 = \frac{hc}{\lambda_0} - \frac{hc}{\lambda} = \frac{hc}{\lambda_0} \left(1 - \frac{\lambda_0}{\lambda}\right) = 295 \text{ eV}$$

(3) 光子损失的能量 = 反冲电子的动能