

农业病虫害手册（可打印细化版）

一、总则

1.1 编制目的

为规范农业病虫害识别、监测与防治工作，指导农技人员与种植户科学防控，降低病虫害损失，保障农产品产量、质量安全与生态环境安全，实现农业绿色可持续发展。

1.2 防治方针与原则

核心方针：预防为主，综合防治

基本原则：

- 生态优先：优先农业、物理、生物防治，严控化学农药用量
- 科学用药：对症选药、适期用药、精准用药、轮换用药
- 安全高效：保障人畜、作物、环境安全，兼顾防效与成本
- 分区治理：结合地域、作物、病虫害发生规律差异化防控

1.3 适用范围

适用于水稻、小麦、玉米、大豆、棉花、蔬菜、果树等主要农作物的病虫害防控，覆盖大田、设施、果园等种植场景；可根据本地特色作物补充完善。

二、病虫害基础认知（精简版，便于快速识别）

2.1 病害分类与典型症状

病害类型	核心症状	典型病害示例
真菌性病害	病斑、霉层、粉状物、锈状物、腐烂、萎蔫	稻瘟病、小麦锈病、黄瓜霜霉病
细菌性病害	斑点、溃疡、菌脓，病斑	水稻白叶枯病、番茄青枯

	无霉层	病
病毒性病害	花叶、黄化、皱缩、畸形、矮化	番茄病毒病、水稻条纹叶枯病
线虫病害	根结、根腐、植株矮黄、生长衰弱	大豆胞囊线虫、黄瓜根结线虫

2.2 虫害分类与典型危害

虫害类型	核心危害	典型害虫示例
咀嚼式口器害虫	咬食叶片、茎秆、果实，造成缺刻、孔洞、蛀道	菜青虫、玉米螟、地老虎
刺吸式口器害虫	吸食汁液，卷叶、黄化，传播病毒，诱发煤污病	蚜虫、飞虱、红蜘蛛、粉虱
地下害虫	危害种子、根系、茎基部，造成缺苗断垄	蝼蛄、蛴螬、金针虫

三、综合防治技术体系（可直接套用）

3.1 农业防治（基础措施）

- 选用抗病虫品种，减少用药基数
- 合理轮作（水旱轮作、禾豆轮作），避免连作
- 清洁田园：及时清除病残体，深翻晒垡
- 科学水肥：控氮增磷钾，合理排灌，避免徒长
- 适期播种、合理密植，优化通风透光条件

3.2 物理防治（绿色安全）

- 诱杀：杀虫灯（蛾类、金龟子）、黄板/蓝板（蚜虫、粉虱）、性诱剂（棉铃虫、玉米螟）
- 阻隔：防虫网、银灰膜（驱蚜虫）

- 人工：捉虫、摘除病叶、刮除虫卵

3.3 生物防治（生态环保）

- 天敌利用：七星瓢虫（蚜虫）、赤眼蜂（鳞翅目卵）、捕食螨（红蜘蛛）
- 微生物制剂：Bt（菜青虫）、枯草芽孢杆菌（霜霉病）、白僵菌（蛴螬）
- 生物源农药：苦参碱、印楝素、春雷霉素

3.4 化学防治（应急控害）

核心规范：对症选药、适期用药（病害初期、害虫 3 龄前）、精准用量、轮换用药、遵守安全间隔期

禁用农药：六六六、滴滴涕、甲胺磷、对硫磷、呋喃丹、涕灭威等（完整版见附录）

四、主要农作物病虫害防治清单（可打印张贴）

4.1 水稻病虫害防治清单

病虫害名称	识别要点	防治时期	推荐防治方法
稻瘟病	苗瘟：苗叶褐色病斑；叶瘟：梭形病斑；穗颈瘟：穗颈变黑、籽粒干瘪	苗期、分蘖期、抽穗扬花期	1. 选用抗病品种； 2. 化学防治：三环唑、稻瘟灵、肟菌·戊唑醇喷雾
纹枯病	叶鞘、叶片出现云纹状病斑，后期腐烂、植株倒伏	分蘖期至孕穗期	1. 合理密植、浅水勤灌； 2. 化学防治：噻呋酰胺、井冈霉素喷雾
稻飞虱	吸食稻株汁液，后期植株倒伏，传播病毒	分蘖期、孕穗期、灌浆期	1. 清理田埂杂草； 2. 化学防治：吡蚜酮、噻虫嗪、异丙威喷雾
二化螟/三化螟	蛀茎，造成枯心苗、白穗	分蘖期、破口期	1. 冬耕灭蛹； 2. 化学防治：氯虫苯甲

			酰胺、三唑磷喷雾
--	--	--	----------

4.2 小麦病虫害防治清单

病虫害名称	识别要点	防治时期	推荐防治方法
赤霉病	穗部腐烂，产生粉红色霉层，籽粒带毒	扬花初期（关键期）	1. 选用抗病品种； 2. 化学防治：戊唑醇、咪鲜胺、氰烯菌酯喷雾
条锈病/叶锈病	叶片出现铁锈色粉孢堆，后期叶片干枯	拔节期至抽穗期	1. 选用抗病品种； 2. 化学防治：三唑酮、氟环唑、吡唑醚菌酯喷雾
麦蚜	吸食叶片、穗部汁液，传播病毒，分泌蜜露	返青期、灌浆期	1. 利用瓢虫、蚜茧蜂天敌； 2. 化学防治：吡虫啉、抗蚜威喷雾
麦蜘蛛	叶片失绿、出现黄白色斑点，严重时干枯	返青期、拔节期	1. 深耕除草； 2. 化学防治：阿维菌素、哒螨灵喷雾

4.3 玉米病虫害防治清单

病虫害名称	识别要点	防治时期	推荐防治方法
大斑病/小斑病	大斑病：梭形大斑；小斑病：椭圆形小斑，均会导致叶片枯死	拔节期至抽雄期	1. 选用抗病品种； 2. 化学防治：肟菌·戊唑醇、吡唑醚菌酯喷雾
玉米螟	蛀茎、蛀穗，造成折茎、籽粒受损	大喇叭口期（关键期）	1. 性诱剂诱杀成虫； 2. 化学防治：氯虫苯甲酰胺、甲

			维盐喷雾
粗缩病（病毒病）	植株矮化、叶片浓绿、节间缩短，生长停滞	苗期（灰飞虱传毒期）	1. 防灰飞虱：吡虫啉、噻虫嗪喷雾； 2. 清除田间杂草
地下害虫（蛴螬、金针虫）	咬食种子、根系，造成缺苗断垄	播种期、苗期	1. 种子包衣（吡虫啉、噻虫嗪）； 2. 撒施毒土（辛硫磷）

4.4 蔬菜病虫害防治清单（番茄/黄瓜/白菜）

作物	病虫害名称	识别要点	推荐防治方法
番茄	灰霉病	花瓣、果实、叶片出现灰色霉层，果实腐烂	1. 通风降湿；2. 化学防治：腐霉利、异菌脉喷雾
	青枯病	植株萎蔫，维管束变褐，挤压有菌脓	1. 轮作；2. 化学防治：噻唑锌、春雷霉素灌根
	棉铃虫	蛀食果实，造成孔洞、腐烂	1. 性诱剂诱杀；2. 化学防治：甲维盐、茚虫威喷雾
黄瓜	霜霉病	叶片出现黄色多角形病斑，背面有黑色霉层	1. 通风降湿；2. 化学防治：霜霉威盐酸盐、烯酰吗啉喷雾
	角斑病	叶片出现透明小斑点，后期穿孔，有菌脓	1. 清洁田园；2. 化学防治：噻唑锌、氯溴异氰尿酸喷雾
	红蜘蛛	叶片失绿、出现小白点，背面有蛛丝	1. 保持湿度；2. 化学防治：阿维菌

			素、哒螨灵喷雾
白菜	软腐病	叶柄、叶球腐烂，有恶臭味	1. 高垄种植、排水防涝；2. 化学防治：春雷霉素、氢氧化铜喷雾
	菜青虫	咬食叶片，造成缺刻、孔洞	1. 天敌防治（瓢虫）；2. 化学防治：Bt制剂、氯虫苯甲酰胺喷雾
	蚜虫	吸食叶片汁液，叶片卷曲、黄化	1. 黄板诱杀；2. 化学防治：吡虫啉、噻虫嗪喷雾

4.5 果树病虫害防治清单（柑橘/苹果）

作物	病虫害名称	识别要点	推荐防治方法
柑橘	溃疡病	叶片、果实出现凸起病斑，破裂后有菌脓	1. 清除病枝病果；2. 化学防治：噻唑锌、氢氧化铜喷雾
	红蜘蛛	叶片失绿、出现灰白色斑点，严重时落叶	1. 利用捕食螨；2. 化学防治：阿维菌素、螺螨酯喷雾
	潜叶蛾	叶片出现弯曲虫道，叶片卷曲、脱落	1. 统一放梢；2. 化学防治：甲维盐、氯氟氰菊酯喷雾
苹果	腐烂病	枝干皮层腐烂、发黑，有酒糟味	1. 刮除病斑，涂抹药剂；2. 化学防治：戊唑醇、腐殖酸铜涂抹
	食心虫	蛀食果实，造成果	1. 性诱剂诱杀；2.

		肉腐烂、脱落	化学防治：氯虫苯甲酰胺、辛硫磷喷雾
	蚜虫	吸食新梢汁液，叶片卷曲、畸形	1. 黄板诱杀；2. 化学防治：吡虫啉、抗蚜威喷雾

4.6 本地特色作物病虫害补充（可填写）

特色作物名称	病虫害名称	识别要点	防治方法

五、病虫害监测与预警

- 监测方法：田间定点观察、杀虫灯/性诱剂诱测、结合气象数据分析
- 预警分级：轻度（零星发生，无需普防）、中度（多点发生，局部防治）、重度（大面积爆发，全面防控）

六、安全防护与应急处置

6.1 施药安全

- 施药时穿戴防护服、口罩、手套，避免皮肤接触
- 避开高温时段（10:00-16:00），顺风施药
- 施药后及时清洗身体、更换衣物，禁止吸烟、饮食

6.2 中毒急救

- 皮肤接触：用清水冲洗 15 分钟，更换干净衣物
- 吸入中毒：移至通风处，必要时进行人工呼吸

- 误食中毒：立即催吐、洗胃，送医时携带农药标签

6.3 突发爆发应急

- 快速普查，明确病虫害发生范围与严重程度
- 优先采用绿色防控，必要时科学使用化学农药控灾
- 组织统防统治，提高防治效率，防止扩散蔓延

七、附录（可打印备用）

附录 1 常用农药安全使用表

农药类别	代表药剂	防治对象	安全间隔期（天）
三唑类	戊唑醇、苯醚甲环唑	真菌病害	7-14
甲氧基丙烯酸酯类	吡唑醚菌酯、肟菌酯	真菌病害	5-10
新烟碱类	吡虫啉、噻虫嗪	刺吸式害虫	7-15
双酰胺类	氯虫苯甲酰胺	咀嚼式害虫	14-21
生物农药	Bt、苦参碱、春雷霉素	害虫/病害	1-3

附录 2 禁用与限用农药清单

禁用农药（严格杜绝使用）

甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、磷胺、六六六、滴滴涕、呋喃丹、涕灭威、克百威、毒鼠强、氟乙酰胺等

限用农药（严格按照规定使用）

1. 毒死蜱、三唑磷：蔬菜、瓜果、茶叶、中药材禁用
2. 氧乐果、水胺硫磷：果树、蔬菜慎用

3. 氟虫腈：除卫生用、玉米等部分作物外，禁止使用

附录 3 病虫害防治历（简表）

- 水稻：苗期防稻蓟马、苗瘟；分蘖期防纹枯病、飞虱；穗期防穗颈瘟、螟虫
- 小麦：返青期防纹枯病；拔节期防锈病；扬花期防赤霉病；灌浆期防蚜虫
- 玉米：苗期防地下害虫、粗缩病；大喇叭口期防玉米螟、叶斑病；穗期防蚜虫、纹枯病
- 蔬菜：定植后防蚜虫、粉虱；生长期防霜霉病、灰霉病；结果期防蛀果类害虫
- 果树：萌芽期防越冬病虫害；花期防蚜虫、蓟马；结果期防食心虫、病害