

66 의료기관 간호업무 종사자에서 발생한 계류유산

성별	여성	나이	30세	직종	간호직	직업관련성	높음
----	----	----	-----	----	-----	-------	----

1 개 요

근로자 ○○○은 2001년 □병원에 입사하여 2002년까지 병동 간호업무를 수행하였고, 2002년 9월 ○의료원에 입사하여 2009년까지 약 7년 2개월간 병동에서 입원환자를 간호하는 업무를 수행하던 중, 2009년 11월 재태주수 5주경 임신을 인지하였다. 이후 7주째 태아심음이 들리지 않았으며 9주째 계류유산을 진단받고, 치료적 소파술을 시행받았다.

2 작업환경

○○○은 2002년 9월 ○의료원에 입사하여 2009년 11월까지 약 7년 2개월간 일반 병동에서 입원환자를 간호하는 업무를 수행하였다. 근로자는 3교대 근무를 수행하였고, 병동에서 입원환자를 위해 정제의 투여약물을 뽑는 업무를 수행하면서 약물 분진에 노출되었다.

3 해부학적 분류

- 생식계질환

4 유해인자

- 화학적요인(기타화학물)

5 의학적 소견

근로자는 이전에 3.45kg의 남아를 자연분만 하였으나 임신 초기 절박유산 증상이 있었으며 태어난 남아에게 동맥관 개존증이 있었지만 자연폐쇄 되었다. 또한, 배우자의 특이 질병 과거력 및 흡연력은 없었다. 근로자는 2009년 11월 재태주수 5주경 임신을 인지하였고, 이후 7주째 태아심음이 들리지 않았으며 9주째 계류유산을 진단받고, 치료적 소파술을 시행받았다.

6 고찰 및 결론

근로자 ○○○는 의료기관의 병동에서 간호사로 근무하면서 임신 5주에 임신을 인지할 때까지 3교대 근무를 수행하였으며, 소속 기관의 경영상의 문제로 인한, 고용불안, 임금 미지급 등 특수한 스트레스 상황에 노출되었다. 또한, 소량이기는 하지만 유산과 관련성이 의심되는 약물 분진에 노출되었던 점이 시기적으로 볼 때 근로자의 계류유산 발생과 관련성이 있는 것으로 판단되어, 업무관련성은 높은 것으로 판단되었다. 끝.