

新时代大学数学系列教材

线性代数

 高等教育出版社

第二章 行列式

第四节 克拉默法则

目录



逆矩阵的一个简明表达式



克拉默法则

一、逆矩阵的一个简明表达式

引理1 设 $A=(a_{ij})_{n,n}$, 则

$$a_{i1}A_{j1} + \cdots + a_{in}A_{jn} = \begin{cases} \det A, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

证

设 $i \neq j$: $a_{i1}A_{j1} + \cdots + a_{in}A_{jn} =$

$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div>i行</div> <div>j行</div> </div>	$= 0$
---	--	-------

引理2 设 A 为 n 阶矩阵, 则 $AA^* = A^*A = (\det A)I$,

其中:

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

(A 的伴随矩阵)

证.

$$AA^* = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

??

$$= \text{diag}(\det A, \det A, \dots, \det A) = (\det A)I$$



定理 1 方阵 A 可逆的充要条件为 $|A| \neq 0$ 。当 A 可逆时,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} A^*.$$

证 A 可逆的充要条件为 $|A| \neq 0$ 。(前面已证)

当 A 可逆时, $|A| \neq 0$:

$$AA^* = (\det A)I,$$

$$A\left(\frac{1}{\det A} A^*\right) = I,$$

所以

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} A^*.$$



例 1

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 7 \\ 2 & 4 & -3 \\ -3 & 7 & 2 \end{pmatrix} \text{ 是否可逆? 若可逆则求 } A^{-1}.$$

解

$\det A = 196 \neq 0$, 所以 A 可逆。

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} A^* = \frac{1}{196} \begin{pmatrix} 29 & 55 & -19 \\ 5 & 23 & 17 \\ 26 & 2 & 10 \end{pmatrix}$$

例2 设

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \text{ 求 } (A^*)^{-1}.$$

解 $AA^* = (\det A)I,$

A^{-1} 存在, 所以 $\det A \neq 0,$

$$\left(\frac{1}{\det A} A\right)A^* = I, \quad (A^*)^{-1} = \frac{1}{\det A} A. \quad \frac{1}{\det A} = \det A^{-1} = 2.$$

$$A = (A^{-1})^{-1} = \frac{1}{\det A^{-1}} (A^{-1})^* = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5 & -2 & -1 \\ -2 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(A^*)^{-1} = \frac{1}{\det A} A. = 2A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -1 \\ -2 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

二、克拉默法则

已有定理： 方阵A可逆的充要条件为 $AX=b$ 有唯一解.

克拉默法则. 设A可逆，则 $AX=b$ 的唯一解为：

$$x_j = \frac{\det A_j}{\det A}, \quad (j = 1, \dots, n)$$

$\det A_j$ 是用 b 代替 $\det A$ 中的第 j 列得到的行列式.

说明：

$$|A_j| = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,j-1} & b_2 & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{2n} \end{vmatrix}$$

$$= b_1 A_{1j} + b_2 A_{2j} + \cdots + b_n A_{nj}.$$

证 解的唯一性（显然）

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = A^{-1}b = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} \det A_1 \\ \vdots \\ \det A_n \end{pmatrix}$$

为什么？

例3

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + a^2x_3 = 1 \\ x_1 + bx_2 + b^2x_3 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & b \\ 1 & a^2 & b^2 \end{vmatrix} \\ &= (b-a)(b-1)(a-1) \end{aligned}$$

若 $b \neq a, b \neq 1, a \neq 1$, 则 $|A| \neq 0$.

$$|A_1| = |A|,$$



$$|A_2| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a^2 \\ 1 & 1 & b^2 \end{vmatrix} = 0,$$

$$|A_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & b & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|} = 1, \quad x_2 = x_3 = 0.$$



例4 求一个二次多项式 $f(x)$, 使

$$f(1)=0, \quad f(2)=3, \quad f(-3)=28.$$

解 设所求的二次多项式为

$$f(x)=ax^2+bx+c,$$

得一个关于未知数 a, b, c 的线性方程组,

$$f(1)=a+b+c=0,$$

$$f(2)=4a+2b+c=3,$$

$$f(-3)=9a-3b+c=28,$$



$$\text{又 } D = -20 \neq 0, \quad D_1 = -40, D_2 = 60, D_3 = -20.$$

$$\text{得 } a = D_1/D = 2, \quad b = D_2/D = -3, \quad c = D_3/D = 1$$

故所求多项式为

$$f(x) = 2x^2 - 3x + 1.$$

注意： 解方程组一般不用Cramer法则，计算量非常大，不具有实际计算意义，主要是理论上的意义（如，给出了解的表达式）。

谢谢