

第五章 特征值与特征向量

5.2 矩阵的相似对角化

一、问题引入

二、矩阵相似的定义与性质

三、矩阵的相似对角化



一、问题的引入

例 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -5 & 1 \end{pmatrix}$$

求 A^{10} .



解 $A = P\Lambda P^{-1}$

$$= \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{10} = P\Lambda P^{-1}P\Lambda P^{-1} \dots P\Lambda P^{-1}P\Lambda P^{-1} = P\Lambda^{10}P^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-2)^{10} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

问题： 1. 什么样的矩阵有这样的 P 与 Λ ?

2. $p = ?$ $\Lambda = ?$



二、 矩阵相似的定义与性质

定义 设 A 与 B 都是 n 阶矩阵， 如果存在可逆矩阵 P ， 使

$$P^{-1}AP = B$$

则称 A 与 B 相似， 记为 $A \sim B$.

简单性质：

(1) 反身性 $A \sim A$;

(2) 对称性 $A \sim B \Rightarrow B \sim A$;

(3) 传递性 $A \sim B$ 且 $B \sim C \Rightarrow A \sim C$.



简单性质:

$$2. P^{-1}(A_1 A_2)P = (P^{-1} A_1 P)(P^{-1} A_2 P).$$

3. 若 A 与 B 相似, 则 A^m 与 B^m 相似(m 为正整数).

$$4. P^{-1}(k_1 A_1 + k_2 A_2)P = k_1 P^{-1} A_1 P + k_2 P^{-1} A_2 P$$

其中 k_1, k_2 是任意常数.



定理1 相似矩阵有相同的特征值.

证 设 $A \sim B$, 则 $B = P^{-1}AP$.

$$\begin{aligned} |\lambda I - B| &= |\lambda I - P^{-1}AP| \\ &= |P^{-1}(\lambda I - A)P| \\ &= |P^{-1}| |\lambda I - A| |P| \\ &= |\lambda I - A| \end{aligned}$$

思考：相似矩阵有相同的行列式？



三、 矩阵的相似对角化

定理2 设矩阵

$$A \sim \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

则 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的全部特征值。



证 $|\lambda I - \Lambda| = \begin{vmatrix} \lambda - \lambda_1 & & & \\ & \lambda - \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda - \lambda_n \end{vmatrix}$

$$= (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n)$$

$\therefore \Lambda$ 的全部特征值是: $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$.

$\therefore A$ 与 Λ 的特征值相同,

$\therefore A$ 的全部特征值是: $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$.



定理3 n 阶矩阵 A 与对角矩阵相似的充分必要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量 .

证 充分性 设 A 有 n 个线性无关的特征向量:

$$P_1, P_2, \dots, P_n \quad AP_i = \lambda_i p_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

$$\text{令 } P = (P_1 \ P_2 \ \dots \ P_n) \quad \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$\text{则 } AP = P\Lambda \quad P^{-1}AP = \Lambda$$

$$\therefore A \sim \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$



必要性 设 $P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$

则 $AP = P\Lambda$

设 $P = (P_1 \ P_2 \ \cdots \ P_n)$

则 $(AP_1 \ AP_2 \ \cdots \ AP_n) = (\lambda_1 P_1 \ \lambda_2 P_2 \ \cdots \ \lambda_n P_n)$

$$AP_i = \lambda_i P_i \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

$\therefore P_1, P_2, \cdots, P_n$ 是 A 的 n 个线性无关的特征向量.



定理4 矩阵 A 不同特征值的特征向量线性无关.

证 设 $A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1, A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_2, \dots, A\alpha_m = \lambda_m\alpha_m$,
且 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 互不相同.

当 $m = 2$ 时, 设 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = 0$. (1)

$$\begin{aligned} \text{则 } A(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2) &= k_1A\alpha_1 + k_2A\alpha_2 \\ &= k_1\lambda_1\alpha_1 + k_2\lambda_2\alpha_2 = 0 \end{aligned} \quad (2)$$

$$\text{又由式(1): } k_1\lambda_1\alpha_1 + k_2\lambda_1\alpha_2 = 0 \quad (3)$$

$$(2) - (3): k_2(\lambda_2 - \lambda_1)\alpha_2 = 0$$

$\because \lambda_1 \neq \lambda_2$ 且 $\alpha_2 \neq 0$, $\therefore k_2 = 0$, 同理, $k_1 = 0$,

$\therefore \alpha_1, \alpha_2$ 线性无关.

由归纳法可证: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.



推论1 如果矩阵 A 的特征值都是单特征根，
则 A 与对角矩阵相似。

证 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的互异特征值，
 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是它们对应的特征向量
则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关，
 $\therefore A$ 与对角矩阵相似。

推论2 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 是矩阵 A 的不同特征值，
 $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{ir_i}$ 是 λ_i 的线性无关特征向量，
则 $\alpha_{11}, \dots, \alpha_{1r_1}, \dots, \alpha_{k1}, \dots, \alpha_{kr_k}$ 线性无关。



推论3 n 阶矩阵 A 与对角矩阵相似

\Leftrightarrow 若 λ_i 是 A 的 k_i 重特征值, 则 $(\lambda_i I - A)X = 0$ 的基础解系由 k_i 个解向量组成.

$\Leftrightarrow R(\lambda_i I - A) = n - k_i$.

分析: 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ 是 A 的全部互异特征值,
则 $k_1 + k_2 + \dots + k_r = n$.



例1 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^{10} .

解 $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 4 & -6 & 0 \\ 3 & \lambda + 5 & 0 \\ 3 & 6 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 2)(\lambda - 1)^2$

$$\lambda_1 = -2, \lambda_2 = 1 (\text{二重}).$$

$$(\lambda_1 I - A) = \begin{pmatrix} -6 & -6 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \\ 3 & 6 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = -x_3, x_2 = x_3, \alpha_1 = (-1, 1, 1)^T$$



$$\lambda_2 I - A = \begin{pmatrix} -3 & -6 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = -2x_2 + 0x_3$$

$$\alpha_2 = (-2, 1, 0)^T, \quad \alpha_3 = (0, 0, 1)^T.$$

$$\text{令 } P = (\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3) = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{则 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -2 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} = \Lambda$$



$$A = P\Lambda P^{-1}$$

$$A^{10} = P\Lambda^{10}P^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1024 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -1022 & -2046 & 0 \\ 1023 & 2047 & 0 \\ 1023 & 2046 & 1 \end{pmatrix}$$



例2 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & a & \cdots & a \\ a & a & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & \cdots & a \end{pmatrix} \quad (a \neq 0)$$

求 A 的特征值与特征向量，
并判断 A 能否与对角矩阵相似。

解

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a & -a & \cdots & -a \\ -a & \lambda - a & \cdots & -a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a & -a & \cdots & \lambda - a \end{vmatrix}$$



$$= \begin{vmatrix} \lambda - na & \lambda - na & \cdots & \lambda - na \\ -a & \lambda - a & \cdots & -a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a & -a & \cdots & \lambda - a \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda - na) \begin{vmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \cdots & \mathbf{1} \\ -a & \lambda - a & \cdots & -a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a & -a & \cdots & \lambda - a \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda - na) \begin{vmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \cdots & \mathbf{1} \\ \mathbf{0} & \lambda & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - na) \lambda^{n-1},$$



$$\lambda_1 = na, \quad \lambda_2 = 0 \quad (n-1 \text{重}).$$

$$(\lambda_1 I - A)X = 0 \quad \text{即}$$

有什么特点?

$$\begin{pmatrix} (n-1)a & -a & \cdots & -a \\ -a & (n-1)a & \cdots & -a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a & -a & \cdots & (n-1)a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\alpha_1 = (1, 1, \dots, 1)^T$$

λ_1 对应的特征向量为 : $k_1 \alpha_1 \quad (k_1 \neq 0)$.



$$\lambda_2 I - A = \begin{pmatrix} -a & -a & \cdots & -a \\ -a & -a & \cdots & -a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a & -a & \cdots & -a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$$

$$\alpha_2 = (1, -1, 0, \cdots, 0, 0)^T,$$

$$\alpha_3 = (0, 1, -1, \cdots, 0, 0)^T,$$

$$\cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots$$

$$\alpha_n = (0, 0, 0, \cdots, 1, -1)^T.$$

A 有 n 个线性无关的特征向量, 能与对角矩阵相似.



例3 下列矩阵能否与对角矩阵相似.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & -8 & -2 \end{pmatrix}$$

解 $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda - 1 & 2 \\ 2 & 2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda + 1)(\lambda - 3)$

$$A \sim \text{diag}(1, -1, 3)$$



$$|\lambda I - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & 1 & 2 \\ -2 & \lambda & 2 \\ -2 & 1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 1)^2$$

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 1 (\text{二重}).$$

$$\lambda_2 I - B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = \frac{1}{2}x_2 + x_3, \quad \alpha_2 = (1, 2, 0)^T, \quad \alpha_3 = (1, 0, 1)^T.$$

$$B \sim \text{diag} (0, 1, 1)$$



$$\text{又 } R(\lambda_2 I - B) = 1,$$

$\therefore B$ 与对角矩阵相似.

$$|\lambda I - C| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -1 & 0 \\ 4 & \lambda + 1 & 0 \\ -4 & 8 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 (\lambda + 2)$$

$$\lambda_1 = 1, (\text{二重}) \quad \lambda_2 = -2,$$

$$R(\lambda_1 - C) = 2,$$

$\therefore C$ 不能与对角矩阵相似.



例4 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ x & 1 & y \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \Lambda$ 为对角阵.

求 x 与 y 应满足的条件 .

解 $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -1 \\ -x & \lambda - 1 & -y \\ -1 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1)$

$$\lambda_1 = 1 (\text{二重}), \lambda_2 = -1.$$

$A \sim \text{对角阵} \Leftrightarrow \lambda_1$ 有两个线性无关的特征向量

$$\Leftrightarrow R(\lambda_1 E - A) = 1$$



$$\lambda_1 E - A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -x & 0 & -y \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -x-y \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$R(\lambda_1 E - A) = 1 \Leftrightarrow -x - y = 0$$

$$\text{即 } x + y = 0.$$



例5 设 $A \sim B, C \sim D$, 证明:

$$\begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & C \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} B & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & D \end{pmatrix}.$$

证 $\because A \sim B, C \sim D$

$\therefore \exists$ 可逆矩阵 P, Q , 使

$$P^{-1}AP = B, Q^{-1}CQ = D$$

$$\begin{pmatrix} P^{-1} & 0 \\ 0 & Q^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}$$

$$\therefore \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & C \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} B & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & D \end{pmatrix}.$$



例6 设 A 是 3 阶矩阵且 $I + A, 3I - A, I - 3A$ 均不可逆. 证明:

(1) A 可逆, (2) A 与对角矩阵相似.

证 (1) $\because I + A$ 不可逆, $\therefore |I + A| = 0$,

$$\therefore (-1)^3 |-I - A| = 0 \Rightarrow |-I - A| = 0,$$

$\therefore \lambda_1 = -1$ 是 A 特征值.

由 $|3I - A| = 0 \Rightarrow \lambda_2 = 3$ 是 A 的特征值.

$$|I - 3A| = 3^3 \left| \frac{1}{3}I - A \right| = 0 \Rightarrow \left| \frac{1}{3}I - A \right| = 0,$$

$\therefore \lambda_3 = \frac{1}{3}$ 是 A 的特征值.

A 的特征值均不为零, 故 A 可逆.



(2) $\because A$ 的特征值都是单特征值，

$$\therefore A \sim \Lambda = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 3 & \\ & & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$



四、小结

1. 相似矩阵

相似是矩阵之间的一种关系，它具有很多良好的性质，除了课堂内介绍的以外，还有：

(1) A 与 B 相似, 则 $\det(A) = \det(B)$;

(2) 若 A 与 B 相似, 且 A 可逆, 则 B 也可逆, 且 A^{-1} 与 B^{-1} 相似;

(3) A 与 B 相似, 则 kA 与 kB 相似, k 为常数;



2. 相似变换与相似变换矩阵

相似变换是对方阵进行的一种运算，它把 A 变成 $P^{-1}AP$ ，而可逆矩阵 P 称为进行这一变换的相似变换矩阵。

这种变换的重要意义在于简化对矩阵的各种运算，其方法是先通过相似变换，将矩阵变成与之等价的对角矩阵，再对对角矩阵进行运算，从而将比较复杂的矩阵的运算转化为比较简单的对角矩阵的运算。



思考题

判断下列两矩阵 A, B 是否相似.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} n & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$



思考题解答

解 因 $\det(A - \lambda E) = (n - \lambda)(-\lambda)^{n-1}$, A 的特征值为 $\lambda_1 = n, \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 0$. 又 A 是实对称矩阵, 存在可逆矩阵 P_1 , 使得

$$P_1^{-1} A P_1 = \Lambda = \text{diag}(n, 0, \cdots, 0),$$

还可求得

$$\det(B - \lambda E) = (n - \lambda)(-\lambda)^{n-1},$$

即 B 与 A 有相同的特征值.



对应特征值 $\lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 0$, 有 $n-1$ 个线性无关的特征向量, 故存在可逆矩阵 P_2 , 使得

$$P_2^{-1} B P_2 = \Lambda,$$

从而
$$P_1^{-1} A P_1 = P_2^{-1} B P_2,$$

即
$$P_2 P_1^{-1} A P_1 P_2^{-1} = B,$$

故 A 与 B 相似.

