논문 3 · 검사법 차이에 따른 집락률 과소평가 가능성

ZARATHU

PAPER 3 · GBS COLONIZATION · Yonsei Med J 2022

VS

Direct plating
↔
Selective enrichment

핵심 차이
검체 부위 + 증균 단계

10.6% → 실제 집락률은 더 높을 가능성

본 연구에서 관찰된 전국 GBS 집락률

METHOD LIMITATION

논문 Discussion은 기존 근거를 인용해, selective enrichment 없이 direct agar plating을 쓰면 GBS carrier가 최대 약 50%까지 false-negative일 수 있다고 설명했다. 이 연구에서 정확히 50%가 누락됐다는 뜻은 아니다.

INTERPRETATION

Observed prevalence ≠ True prevalence

10.6%는 검사에서 관찰된 값이다. 검사 민감도가 낮으면 실제 prevalence보다 낮아질 수 있다.

집락률은 생물학적 차이뿐 아니라 검체 채취 부위와 배양 방법에도 영향을 받는다.
이 연구의 10.6%는 direct vaginal culture 방식 때문에 실제 GBS 보균율을 과소평가했을 가능성이 있다.

Bae HG, et al. Yonsei Med J. 2022;63:717–723 · Methods / Discussion

검사실 연구 논문의 통계와 연구 방법론

서울의과학연구소 의학통계 강의

김진섭

2026-09-01

강의의 출발점

연구 질문 → 분석 단위 → 통계 방법

QUESTION

핵심 질문

범위 · 차이 · 비율 · 군집 · 변화

UNIT

분석 단위

사람 · 검체 · 조직 · 분리 균주

EVIDENCE

결과 표현

분포 · 회귀 · 차이 · 비율 · 프로파일

개념 → 논문 Figure/Table → 해석

강의에서 다룰 5편의 논문

ZARATHU

01 · RANGE

검사값의 정상 범위

PTH reference interval

KNHANES 2024 · PTH 측정 4,502명
주요 분석 155명 · Step 11 82명
Percentile · Bootstrap · Survey weighting

BMC Endocr Disord 2026;26:176
GC Labs

02 · AGREEMENT

두 검사법의 일치도

Triglyceride harmonization

동일 혈청 98쌍
Passing–Bablok · Bland–Altman · Bias

Ann Lab Med 2025;45:291-299
GC Labs

03 · PROPORTION

집락률·내성률 차이

GBS colonization

질 면봉 배양 33,721건
Proportion · Chi-square · Fisher's exact

Yonsei Med J 2022;63:717-723
서울의과학연구소

04 · MULTIPLICITY

여러 미생물 동시 비교

CRC tissue microbiome

환자 38명 · 조직 39개
qPCR · Diversity · Relative abundance · FDR

Sci Rep 2020;10:19915
연세대학교

05 · PROFILE

계통·내성 조합의 시간 변화

GBS WGS

과거 37 vs 최근 209 균주
ST/CC · ARG · AMR profile

Ann Lab Med 2025 (alm.2025.0439)
서울의과학연구소

분석 단위 · 관찰 단위의 정의

ZARATHU

개인 · 논문 1

PTH 검사값 · 주요 155명 / Step 11 82명

→

동일 혈청 검체 · 논문 2

두 검사법의 측정값 · 98쌍

→

배양 검체 · 논문 3

질 면봉 33,721건

→

조직 검체 · 논문 4

환자 38명 · 조직 39개

→

분리 균주 · 논문 5

37 vs 209 균주

사람 ≠ 검체 ≠ 균주 · 논문 4는 환자 38명에서 조직 39개 (한 환자에 병변 2개)

연구 질문 → 통계 방법

ZARATHU

분포의 범위를 추정 · 논문 1

결과: 하한–상한

Percentile → 이상치 → Bootstrap CI → Survey weighting

동일 검체의 두 값을 비교 · 논문 2

결과: 회귀식 + 차이 + 기준값 대비 bias

Passing–Bablok → Bland–Altman → Harmonization

빈도와 비율을 비교 · 논문 3 · 5

결과: n/N (%) + P value

Chi-square 또는 Fisher’s exact test

고차원 결과를 해석 · 논문 4 · 5

결과: 전체 군집 + 개별 feature + profile

Diversity → FDR → WGS/ARG 연결

추정 대상 + 분모 확인 · P-value는 이후 해석

참고구간 · 검사값의 중앙 95%

01 · RANGE

개인 검사값의 분포 범위 · 2.5th–97.5th percentiles

Reference interval ≠ Confidence interval

ZARATHU

REFERENCE INTERVAL

2.5th–97.5th

개인 검사값의 중앙 95% 범위

vs

CONFIDENCE INTERVAL

추정치의 불확실성

하한·상한 추정의 불확실성

참고집단 선정

검사값에 영향을 주는 조건 제외

→

이상치 확인

MAD 기반 극단값 평가

범위 추정

2.5th–97.5th percentiles

→

불확실성 평가

Bootstrap CI



참고구간은 분포의 양쪽 2.5%를 잘라낸 중앙 95% 구간

중앙 95%를 자르는 위치와 해당 위치 추정의 정밀도는 서로 다른 개념

논문 1 · PTH 참고집단의 단계별 선정 흐름

ZARATHU

PAPER 1 · PTH · BMC Endocr Disord 2026

넓은 PTH 측정자 수 → 주요 milestone만 표시

4,502 PTH 측정자

↓

861 만성질환 제외

↓

288 보충제 제외

… Step 3–5 · 임신 · 부정맥 · 고혈압 제외 …

165 Step 6 · 비만까지 제외

… Step 7 · 당뇨 제외 …

159 Step 8 · eGFR ≥60 적용

↓

84 Step 9 · Vitamin D ≥20 ng/mL

Step 10 · Ca/Mg/P 정상 → 83명

82 Step 11 · ALP 정상

분석 흐름도 · 원 논문 Table 1의 단계별 PTH 측정자 수를 재구성

MAIN REFERENCE POPULATION

N = 155

Step 8 집단에서
이상치 제거 후 복합표본 분석에 포함

20.5–67.7 pg/mL

논문 초록·본문의 주요 가중 참고구간

STRICTEST STEP

82명

Vitamin D·Ca/Mg/P·ALP까지 적용

가중·이상치 제거 후 N=80

N < 120

생물학적으로 가장 엄격하지만 참고한계 추정의 정밀도는 낮음

**선정 기준 강화에 따라 참고집단 N이 감소하며,
소표본 단계에서는 참고한계 추정의 불확실성이 증가한다.**

논문 1 · PTH 참고구간 분석 절차

ZARATHU

PAPER 1 · PTH · BMC Endocr Disord 2026

STEP 1

참고집단 선정

Stepwise reference population selection

질환, 보충제 사용,
비만, 당뇨, 신기능, Vitamin D 등
PTH 영향 조건을 순서대로 적용

참고집단 선정

STEP 2

이상치 제거

MAD outlier detection

PTH 분포에서 중앙값을 기준으로
너무 멀리 떨어진 값을 제거

Median absolute deviation (MAD)

극단값 제거를 통한 상한 추정 영향 감소

STEP 3 · MAIN ANALYSIS

복합표본 가중 반영

Complex survey weighting

층화·집락·검진 가중치를 반영해 40세 이상 한국 성인의
2.5th–97.5th percentile 추정

표본을 40세 이상 한국 성인에 맞춰 반영

MAIN RESULT

주요 참고구간
20.5–67.7 pg/mL

Step 8 주요 분석집단 · 40세 이상 한국 성인
가중 percentile 추정

IF N < 120

소표본 보완 분석

CLSI robust method + bootstrap

n<120 하위집단: 이상치 제거 후 비가중 PTH에
CLSI EP28-A3c 기반 robust method 적용

Bootstrap으로 참고하한·참고상한의 90% CI 추정

소표본 불확실성 보고

SMALL SUBGROUP

Step 9–11은 N<120

소표본 보완 분석을 사용했지만
참고한계의 정밀도는 낮음

**참고집단 선정과 MAD는 공통 전처리이고, 이후 주 분석은 survey-weighted percentile,
n<120 집단은 robust method와 bootstrap으로 보완했다.**

Choi R, et al. BMC Endocr Disord. 2026;26:176 · Methods / Table 1–3

논문 1 · Table 1: 단계별 참고집단 선정 결과

ZARATHU

PAPER 1 · PTH · BMC Endocr Disord 2026

Table 1 Number of subjects according to stepwise selection criteria

Step	Rule	*N* of subjects with PTH measurement	
0	Start (all survey subjects)	4,502	START
1	Exclusion of participants with self-reported physician-diagnosed chronic diseases or abnormal health conditions	861	1
2	Exclusion of participants with a history of dietary supplement use (≥ 2 weeks) within the preceding year	288	2
3	Exclusion of pregnant participants	288	
4	Exclusion of participants with an irregular pulse identified during the physical examination	283	
5	Exclusion of participants with hypertension based on blood pressure measurements obtained during the survey examination	235	
6	Exclusion of participants classified as obese (body mass index ≥ 25 kg/m^2)	165	3
7	Exclusion of participants with diabetes mellitus, defined by fasting plasma glucose ≥ 126 mg/dL, glycated hemoglobin ≥ 6.5%, a physician diagnosis of diabetes mellitus, or current treatment with insulin or oral hypoglycemic agents	162	
8	Inclusion restricted to participants with an estimated glomerular filtration rate ≥ 60 mL/min/1.73 m^2	159	
9	Inclusion restricted to participants with serum 25-hydroxyvitamin D concentrations ≥ 20 ng/mL	84	4
10	Inclusion restricted to participants with serum calcium, magnesium, and phosphorus concentrations within predefined reference intervals provided by the assay manufacturers	83	
11	Inclusion restricted to participants with serum alkaline phosphatase concentrations within sex-specific reference intervals provided by the assay manufacturers	82	FINAL

Abbreviations: N, number; PTH, parathyroid hormone

Table 1 발췌·강조 · 단계별 선정 기준과 PTH 측정자 수
Choi R, et al. BMC Endocr Disord. 2026;26:176 · Table 1

KEY VARIABLE

주요 확인 항목

N of subjects with PTH measurement

Residual subjects ≠ 실제 PTH 분석 N
참고구간은 PTH measurement 열을 기준으로 읽는다.

1 만성질환 제외
4,502 → 861
−3,641명
가장 큰 감소

2 보충제 사용 제외
861 → 288
−573명
두 번째로 큰 감소

3 비만 제외
235 → 165
−70명
Step 6

4 Vitamin D ≥20 ng/mL
159 → 84
−75명
여기서 N<120

N < 120 시작 Step 9–11 · 84 → 83 → 82명

**질환·보충제 제외 단계에서 표본 감소가 가장 크며,
Vitamin D 기준 적용 이후 n<120으로 참고한계 추정의 정밀도가 감소한다.**

논문 1 · Table 2: 전처리 전후 PTH 분포 변화

ZARATHU

PAPER 1 · PTH · BMC Endocr Disord 2026

이상치 제거 + 복합표본 가중 적용 전후의 PTH 분포 비교

Characteristics	Unweighted, before outlier exclusion							Weighted, after outlier exclusion						
	N	Mean	SD	Med	IQR	2.5th-97.5th	Min-Max	N	Mean	SD	Med	IQR	2.5th-97.5th	Min-Max
PTH	4502	39.2	16.1	36.4	29.4–45.5	18.7–74.6	5.4–352.0	4408	37.8	11.9	36.0	29.3–44.9	19.1–66.1	5.4–77.2

Table 2 발췌·강조 · Step 0의 PTH 분포

Choi R, et al. BMC Endocr Disord. 2026;26:176 · Table 2

EDUCATIONAL EXAMPLE

MAD 기반 이상치 판정



중앙값에서 ±3.5 MAD보다 멀리 떨어진
PTH 값만 이상치로 제외

실제 논문은 PTH 값에만 이 규칙을 적용

분석 N: 4,502 → 4,408

단위: pg/mL ● 전·무가중 ● 후·가중

평균	39.2	→	37.8	조금 감소
중앙값	36.4	→	36.0	변화 미미
참고구간	18.7–74.6	→	19.1–66.1	상한 감소 74.6 → 66.1
Min–Max	5.4–352.0	→	5.4–77.2	변화 폭 최대

INTERPRETATION NOTE

Table 2의 왼쪽과 오른쪽은 '무가중 · 이상치 제거 전'과 '가중 · 이상치 제거 후'를 비교한다.
따라서 모든 차이를 MAD 단독 효과로 해석하면 안 된다.

평균과 중앙값의 변화는 작았으나, 참고상한과 극단값은 상대적으로 크게 감소했다.
이상치 제거는 분포의 상위 꼬리에 주로 영향을 미친다.

Choi R, et al. BMC Endocr Disord. 2026;26:176 | Table 2 · 단위 주: 원론 Table 제목의 ng/mL 표기는 본문·초록 및 수치 규모상 pg/mL로 해석

논문 1 · Table 3: 최종 PTH 참고구간 비교

ZARATHU

PAPER 1 · PTH · BMC Endocr Disord 2026

Table 3 Parathyroid hormone levels (ng/mL) measured using the Elecsys PTH assay (Roche Diagnostics, Manheim, Germany)

Reference	Category	*N* of subjects	PTH 2.5th	PTH 97.5th
Manufacturer's information[†]	Previous information from the instructions for use	N/A	16.0	65.0
	Subjects with normal Ca, P, and creatinine levels, regardless of 25(OH)D status	489	17.3	74.1
	Subjects with normal Ca, P, and creatinine levels and 25(OH)D ≥ 30 ng/mL	141	17.9	58.6
	Subjects with normal Ca, P, and creatinine levels and 25(OH)D > 20 to < 30 ng/mL	165	17.0	60.4
	Subjects with normal Ca, P, and creatinine levels and 25(OH)D ≤ 20 ng/mL	183	19.5	86.4
Gong and Wang et al.[†] [15]	Subjects with Ca 8.4–10.4 mg/dL, P 2.5–4.5 mg/dL, eGFR ≥ 60 mL/min/1.73m^2, and 25(OH)D ≥ 20 ng/mL	25,139	22.3	73.2
	Subjects with Ca 8.4–10.4 mg/dL, P 2.5–4.5 mg/dL, eGFR ≥ 60 mL/min/1.73m^2, and 25(OH)D ≥ 30 ng/	4,465	21.5	68.5
Hataysal et al.[‡] [16]	Subjects with Ca 8.4–10.4 mg/dL, P 2.5–4.5 mg/dL, and eGFR ≥ 60 mL/min/1.73m^2, regardless of 25(OH)D status	22,662	15.3	76.8
	Subjects with Ca 8.4–10.4 mg/dL, P 2.5–4.5 mg/dL, eGFR ≥ 60 mL/min/1.73m^2, and 25(OH)D > 20 to < 30 ng/mL	11,356	15.6	78.1
Choi et al.[§] [29]	Subjects with Ca 8.6–10.0 mg/dL, P 2.5–4.5 mg/dL, and eGFR ≥ 60 mL/min/1.73m^2, regardless of 25(OH)D status	449	17.3	53.8
	Subjects with Ca 8.6–10.0 mg/dL, P 2.5–4.5 mg/dL, eGFR ≥ 60 mL/min/1.73m^2, and 25(OH)D ≥ 30 ng/mL	254	16.6	50.1
	Subjects with Ca 8.6–10.0 mg/dL, P 2.5–4.5 mg/dL, eGFR ≥ 60 mL/min/1.73m^2, and 25(OH)D ≥ 20 ng/mL	356	16.8	52.1
This study[‖]	Subjects with eGFR ≥ 60 mL/min/1.73m^2, regardless of 25(OH)D status (survey-weighted)	155	20.5	67.7
	Subjects with eGFR ≥ 60 mL/min/1.73m^2 and 25(OH)D levels ≥ 20 ng/mL (survey-weighted)	82	21.5	58.0
	Subjects with Ca 8.6–10.0 mg/dL, P 2.5–4.5 mg/dL, eGFR ≥ 60 mL/min/1.73m^2, and 25(OH)D ≥ 20 ng/mL (survey-weighted)	81[¶]	21.4	58.2

Table 3 발췌·강조 · 제조사 기준과 본 연구의 주요/엄격 기준 비교

Choi R, et al. · Table 3

※ 원문 Table 3 제목의 ng/mL 표기는 본문·초록·수치와 불일치하며, 본 강의에서는 pg/mL로 해석함.

MANUFACTURER

기기 설명서 기준

N: N/A

16.0–65.0 pg/mL

제조사 기기 설명서 기반 참고구간

MAIN RESULT

This study · N=155

eGFR ≥60 · 25(OH)D 조건과 무관

20.5–67.7 pg/mL

본문에서 대표로 사용하는 주요 참고구간

STRICTER SUBGROUP

강화된 건강인 기준

N=82	N=81
21.5–58.0	21.4–58.2

Vitamin D·Ca·Mg·P·ALP 조건까지 적용
상한은 낮아지지만 표본이 작아 정밀도는 떨어짐

기준 강화 → 상한 ↓ · N 155 → 82/81

본 논문의 대표 PTH 참고구간은 N=155 기반 20.5–67.7 pg/mL이다.
강화된 기준에서는 상한이 58 pg/mL 수준으로 낮아지지만, 대표 참고구간으로 적용하기에는 표본 규모가 제한적이다.

Manufacturer보다 주요 참고구간의 하한·상한이 모두 약간 높다 · 엄격 하위집단은 기준 강화에 따른 변화를 보여주는 보조 근거

Choi R, et al. BMC Endocr Disord. 2026;26:176 · Table 3

논문 1 · Figure 1: 선정 기준에 따른 PTH 참고구간 변화

ZARATHU

PAPER 1 · PTH · BMC Endocr Disord 2026

건강인 기준 강화에 따른 참고하한·참고상한 변화

97.5th 참고상한

2.5th 참고하한



Figure 1. Step별 PTH 참고하한·참고상한 및 가중 전후 비교
큰 반투명 영역은 발표용 강조 표시

원 논문 표식: 주황/빨강 = 무가중·이상치 제거 전 · 파랑 = 가중·이상치 제거 후

LOWER LIMIT

참고하한
약 20 pg/mL

대부분의 Step에서 2.5th percentile은 비교적 안정

Step 8: 20.5 · Step 9: 20.5

UPPER LIMIT

참고상한
상한 추정의 변동성

97.5th percentile은 건강인 기준·가중치·표본 수에 더 민감

Step 8: 67.7 → Step 9: 62.4 pg/mL

Table 2 · weighted, after outlier exclusion

BIOLOGICAL FILTER

Vitamin D 기준

Step 9에서 25(OH)D ≥20 ng/mL 적용

PTH 측정자 159 → 84명

표본 감소와 참고상한 하향 변화

UPPER LIMIT VARIABILITY

복합표본의 97.5th percentile은 소수의 큰 survey weight 관찰값에 민감하다.

논문에서도 Step 6–8 일부 upper 90% CI가 불안정해 표시되지 않았다.
이를 생물학적 변화라고 단정할 수 없다.

참고하한은 비교적 안정적이지만, 참고상한은 건강인 기준과 복합표본 구조에 더 민감하다.

선정 기준 강화 → 참고구간 축소 · 표본 감소 → 정밀도 저하

검사법 비교 · Correlation ≠ Agreement

02 · AGREEMENT

Paired data · 관계 / 차이 / 변환 가능성

논문 2 · Table 1: 2022년 TG 측정법 변경

ZARATHU

PAPER 2 · TRIGLYCERIDE · Ann Lab Med 2025

Year	2005, 2007, and 2008*	2008–2017†	2018–2021	Since 2022
Measurement principle	Enzymatic, with glycerol blanking	Enzymatic, with glycerol blanking	Enzymatic, with glycerol blanking	Direct enzymatic, without glycerol blanking
Reagent kit	TRIG (Siemens‡, USA)	Pureato S TG-N (Sekisui§, Japan)	Qualigent TG (Sekisui)	TRIGL (Roche, China)
Calibrator name	Not available	Cholestest N calibrator (Sekisui)	Qualigent N calibrator (Sekisui)	Calibrator for automated systems (Roche, Germany)
Calibrator traceability	Not available	Reference material produced by HECTEF (Japan)	Reference material produced by HECTEF (Japan)	IDMS
Analyzer	Advia 1650 (Siemens, USA)	Hitachi 7600 (Hitachi, Japan)	Labospect 008AS (Hitachi, Japan)	Cobas 8000 c702 (Roche, Germany)
Laboratory	Seoul Clinical Laboratories	Seegene Medical Foundation (Neodin)‖	Seegene Medical Foundation	GC Labs
US FDA clearance	US FDA cleared	Non-US FDA cleared	Non-US FDA cleared	US FDA cleared
Free glycerol treatment	Glycerol blanking (free glycerol eliminated)	Glycerol blanking (free glycerol eliminated)	Glycerol blanking (free glycerol eliminated)	Glycerol non-blanking (free glycerol included)

Table 1 발췌 · 2018–2021 vs Since 2022 측정법 비교

핵심 변화 1

2018–2021

Enzymatic
with glycerol blanking 방식

핵심 변화 2

Since 2022

Direct enzymatic
without glycerol blanking 방식

KEY VARIABLE

주요 확인 항목

1. Year
   비교 시기 구분
2. Measurement principle
   glycerol blanking 유무
3. Laboratory · Analyzer · Reagent kit
   실제 측정 환경 변화
4. Free glycerol treatment
   과거에는 제거 · 2022부터 포함

INTERPRETATION

측정법이 달라지면 값도 달라질 수 있다

같은 중성지방이라도 분석법 변화로 체계적 차이가 생길 수 있어, 시계열 비교에는 보정식이 필요하다.

특히 glycerol blanking 유무의 변화가 이 논문의 핵심 출발점이다.

2022년부터 중성지방 측정법이 바뀌었기 때문에, 이전 연도와 직접 비교하려면 보정식이 필요하다.

Choi R, et al. Ann Lab Med 2025;45:291–299 · Table 1

논문 2 · Figure 1: TG 보정식 개발과 적용 흐름

ZARATHU

PAPER 2 · TRIGLYCERIDE · Ann Lab Med 2025



Figure 1 발췌 · TG 보정식 개발 및 적용 흐름
동일 혈청 비교 → conversion equation 도출 → 과거 KNHANES 자료에 적용

연구 배경

측정법 전환

2005–2021 · glycerol blanking
2022 이후 · glycerol non-blanking
연도 간 직접 비교에 불연속성이 생길 수 있음

분석 방법

Conversion equation 도출

비교 연구로 과거 TG 값을 2022 측정법 기준으로 보정

$$2022\ TG = 11.94 + 0.99 \times 2005–2021\ TG$$

적용 대상

2019–2021 KNHANES 적용

- 보정 후 평균 TG 수준 변화 확인
- 고중성지방혈증(≥200 mg/dL) 유병률 변화 평가

측정법 전환에 따른 불연속성을 줄이기 위해 TG 보정식을 개발하고 적용했다.

Choi R, et al. Ann Lab Med. 2025;45:291–299 · Figure 1

Correlation ≠ Agreement

ZARATHU

CORRELATION

r = 0.997

두 측정값이 **함께 증가**하는 정도

AVERAGE DIFFERENCE

+10.7 mg/dL

Non-blanking이 평균적으로 더 높음

두 값이 높은 상관관계를 보여도 → 항상 +10 mg/dL → **불일치**

Correlation = 관계 · Bland–Altman = 차이

Passing-Bablok 회귀분석 개념도



- 회귀식: Y = a + bX
- 절편 a: constant bias 평가
- 기울기 b: proportional bias 평가

동일 검체에서 얻은 두 검사법의 측정값 관계를 평가

절편 = constant bias · 기울기 = proportional bias

논문 2 · Figure 2: 측정법 간 관계와 차이

ZARATHU

Paired comparison · 동일 혈청 98개

PAPER 2 · TRIGLYCERIDE · Ann Lab Med 2025

A · 관계 B · 절대 차이 C · 퍼센트 차이



Figure 2. 측정법 비교 · A 관계 / B 절대 차이 / C 퍼센트 차이

GC Labs non-blanking 측정값과 Seegene glycerol blanking 측정값 비교

A · RELATIONSHIP

Passing–Bablok

r = 0.997

Y = 11.94 + 0.99X

두 방법은 매우 높은 상관관계를 보이지만, 측정값의 일치를 의미하지 않음

Slope 95% CI
0.977–1.013 → 1 포함

Intercept 95% CI
9.50–14.76 → 0 불포함

비례 차이는 작고 · 일정한 양의 차이가 남음

B · ABSOLUTE DIFFERENCE

Bland–Altman · mg/dL

+10.7 mg/dL

95% CI
8.9–12.6 mg/dL

새 non-blanking 방식이 평균적으로 더 높음 · 대부분의 점이 0선 위

C · PERCENT DIFFERENCE

Bland–Altman · %

+10.0%

95% CI
8.3–11.7%

낮은 TG에서는 같은 절대 차이가 더 큰 퍼센트 차이로 보임

150 mg/dL	200 mg/dL	500 mg/dL
약 +6.9%	약 +5.0%	약 +1.4%

높은 상관관계는 두 측정값의 일치를 의미하지 않는다.
회귀식은 변환 관계를, Bland–Altman은 실제 차이를 제시한다.

Choi R, et al. Ann Lab Med. 2025;45:291–298 · Figure 2

논문 2 · Figure 3: TG 보정 전후 분포와 유병률 변화

ZARATHU

PAPER 2 · TRIGLYCERIDE · Ann Lab Med 2025



분포 변화

보정 후 오른쪽 이동

빨간선이 파란선보다 전체적으로 오른쪽으로 이동
같은 과거 사람들의 TG가 새 측정척도에서는 더 높게 표현됨

MEAN TG

123.7 → 134.3 mg/dL

+10.6 mg/dL

2019–2021 N=16,015에 보정식 적용

HYPERTRIGLYCERIDEMIA

11.9% → 13.8%

≥200 mg/dL · +1.9 percentage points

예시용 비가중(unweighted) 분석

INTERPRETATION

빨간선과 초록선의 해석

2019–2021과 2022는 서로 다른 연도·다른 참여자
보정 목적은 두 집단을 같게 만드는 것이 아니라 측정 척도를 맞추는 것

측정 척도를 바꾸면 같은 과거 자료에서도 평균 TG와 ≥200 mg/dL 비율이 함께 증가한다.
검사법 변화는 개인 수치뿐 아니라 역학 통계에도 영향을 준다.

Choi R, et al. Ann Lab Med. 2025;45:291–299 · Figure 3

Bias · 기준값 대비 측정 차이 평가

ZARATHU

1 · DIFFERENCE

두 검사법의 차이

검사법 B − 검사법 A

Bland–Altman으로 두 방법 사이의 실제 차이와 범위를 평가

2 · BIAS

기준값 대비 차이

검사값 − 기준값

양수면 기준보다 높고, 음수면 기준보다 낮게 측정

3 · PERCENT BIAS

기준값 대비 백분율

(검사값 − 기준값)
÷ 기준값 × 100

측정 수준이 달라도 상대적인 벗어남을 같은 척도로 비교

Difference와 Bias는 기준이 다르다

Bland–Altman은 두 검사법 사이의 차이를 평가하고,
bias 분석은 각 검사법이 기준값에서 얼마나 벗어났는지를 평가한다.

Allowable bias ±5%

0%에 가까울수록 기준값과 가까움

Bland–Altman = 두 검사법 사이의 차이 · Bias = 기준값에서 벗어난 정도

논문 2 · Figure 4: CDC 기준 대비 TG 측정 Bias 변화

ZARATHU

PAPER 2 · TRIGLYCERIDE · Ann Lab Med 2025



INTERPRETATION

Bias

(검사값 − CDC 목표값) ÷ CDC 목표값 × 100

0%에 가까울수록 CDC target과 가까움
±5% 안 = 허용 범위

2018–2021

Glycerol blanking
주로 음의 Bias

- 대부분 0% 아래
- 여러 측정값이 −5% 기준 밖
- CDC target보다 낮게 측정되는 방향

CDC target은 total glyceride · non-blanking 기준

SINCE 2022

Non-blanking
±5% 이내

- 2022 결과는 CDC LSP 허용범위 안
- 측정 원리가 CDC 기준과 일치하도록 정렬됨

INTERPRETATION NOTE 2018–2021의 음의 bias를 '옛 검사실이 나빴다'고 해석하면 안 된다.
옛 blanking 방식은 free glycerol을 제거하지만 CDC target은 non-blanking total glyceride 기준이므로 측정 척도 자체가 달랐다.

**2018–2021의 음의 bias는 측정 척도 차이와 관련되고,
2022 non-blanking 전환 후 CDC 기준과의 comparability가 개선됐다.**

Choi R, et al. Ann Lab Med 2025;45:291-299 · Figure 4

비율 비교 · 분모의 정의

03 · PROPORTION

집락률 / 내성률 / MDR · 분모 각각 확인

논문 3 · 집락률·내성률·MDR의 분모

ZARATHU

PAPER 3 · GBS COLONIZATION · Yonsei Med J 2022

집락률
임산부 검체에서 GBS가 얼마나 검출됐는가

GBS 양성 배양 검체 ÷ 전체 질 면봉 배양 검체
3,578 / 33,721 = 10.6%

항생제 내성률
각 항생제마다 검사 가능한 균주 수가 다를 수 있음

특정 항생제에 R인 GBS 균주
R인 균주 / 해당 약 검사 N
해당 항생제 감수성검사를 받은 균주

1 전체 배양 검체 **33,721건** →

2 GBS 양성 **3,578건** 10.6% →

3 감수성검사 **3,512균주** → 5개 약 조합 평가 가능 subset

4 MDR 분석 하위집단 **1,672균주** →

5 MDR **538균주** 32.2%

COLONIZATION **3,578 / 33,721** 집락률 10.6%

SUSCEPTIBILITY **각 약의 R / 해당 약 검사 N** 항생제별 내성률

MDR **538 / 1,672** 32.2%

동일 논문에서도 분석 결과에 따라 분모가 달라진다.
비율 해석 전 분모(N)를 확인한다.

Bae HG, et al. Yonsei Med J 2022;63:717–723

논문 3 · 2018–2020년 전국 GBS 집락률

ZARATHU

PAPER 3 · GBS COLONIZATION · Yonsei Med J 2022

최대 차이 = 0.3%p

큰 연도 변화 없음

STATISTICAL TEST

Chi-square test

연도별 GBS 양성/음성 비율을 비교

논문 결과 · 연도별 집락률 차이 없음

전국 GBS 집락률은 2018–2020년 10.5–10.8%로 거의 일정했다.
10.8% → 10.5%를 의미 있는 감소 추세로 해석하지 않는다.

Bae HG, et al. Yonsei Med J. 2022;63:717–723 · Table 1

논문 3 · Figure 1: 지역별 GBS 집락률 분포

ZARATHU

PAPER 3 · GBS COLONIZATION · Yonsei Med J 2022



Fig. 1. Rate of maternal colonization in regional cities in which more than 30 culture samples were obtained.

Figure 1 · 검체 수가 30개를 초과한 지역 도시의 GBS 집락률

REGIONAL RANKING

3년 전체 지역 subtotal



REGIONAL RANGE 13.2% ↔ 9.6% 차이 3.6%p

CHI-SQUARE BY REGION · 각 연도 내 지역 비교

2018	2019	2020
강원·전라 높음 · p<0.01	서울·경상 낮음 · p<0.01	유의한 지역 차이 없음 · p>0.05

INTERPRETATION NOTE

지역 차이는 검체 구성·의뢰기관·검사 규모와 함께 해석해야 한다.
후향적 검사실 자료만으로 지역 자체를 원인이라 할 수 없다.

전국 평균은 10.6%였지만, 지역별 집락률은 9.6–13.2% 범위였다.
지역별 집락률 해석 시 지역별 표본 규모를 함께 고려한다.

Bae HG, et al. Yonsei Med J. 2022;63:717-723 · Figure 1/ Table 1

논문 3 · Table 3: 항균제별 내성률

ZARATHU

PAPER 3 · GBS COLONIZATION · Yonsei Med J 2022

RESISTANCE RATE · COMMON SCALE 0–60%

0% 20% 40% 60%

Tetracycline Resistance ≈50% — **50.0–53.3%**

2018 50.4 · 2019 50.0 · 2020 53.3

Erythromycin Resistance ≈35% — **35.6–36.8%**

2018 36.6 · 2019 35.6 · 2020 36.8

Clindamycin Resistance ≈35% — **33.4–35.7%**

2018 34.3 · 2019 33.4 · 2020 35.7

Levofloxacin Resistance ≈20% — **18.2–19.6%**

2018 18.2 · 2019 18.5 · 2020 19.6

Chloramphenicol 약 3% R — **2.6–2.7%**

2018 ND · 2019 2.7 · 2020 2.6

100% SUSCEPTIBLE

내성 발견 없음

Penicillin	Ampicillin
Vancomycin	Ceftriaxone
Cefotaxime	Cefepime
Meropenem	

본 연구의 GBS isolate는 위 항생제에 모두 감수성

YEAR TREND

내성 수준과 시간 추세의 구분

2018–2020년 내성률 차이의 p-value는 모두 0.05보다 컸다.

Chloramphenicol	p=0.753	Levofloxacin	p=0.659
Clindamycin	p=0.593	Erythromycin	p=0.876
Tetracycline	p=0.301		

내성률은 높았지만 3년간 뚜렷한 증가·감소 증거는 없음

INTERPRETATION

Clindamycin · 33.4–35.7% R

Penicillin을 사용할 수 없는 경우, 대체약 선택 시 감수성 결과 확인이 중요

Penicillin계는 감수성이 유지됐지만, clindamycin·erythromycin은 약 1/3, tetracycline은 약 절반에서 내성이었다.
내성 수준이 높다는 것과 시간이 지나며 증가했다는 것은 서로 다른 해석이다.

Bae HG, et al. Yonsei Med J. 2022;63:717–723 · Table 3

논문 3 · Table 2: MDR 내성 조합

ZARATHU

PAPER 3 · GBS COLONIZATION · Yonsei Med J 2022

Table 2. Resistance Patterns of 538 Multi-Drug Resistant Group B *Streptococcus* Isolates among 1672 GBS Isolates

Susceptibility to antimicrobial agents					
Chloramphenicol	Levofloxacin	Clindamycin	Erythromycin	Tetracycline	n
S	S	R	R	R	384
S	R	R	R	R	110
S	R	R	R	S	14
S	R	S	R	R	7
S	R	I	R	R	1
S	R	R	R	S	1
S	I	R	R	R	2
R	R	R	R	R	23
R	R	R	R	S	1
R	R	S	R	R	2
R	S	R	R	R	7
R	S	S	R	S	2
R	S	S	R	R	2
R	I	R	R	R	2

S, susceptible; R, resistant; I, intermediate.

Table 2 - 538개 MDR GBS isolates의 resistance pattern

Table 2 · 538개 MDR GBS isolate의 resistance pattern

KEY VARIABLE

열 순서 · Chloramphenicol → Levofloxacin → Clindamycin → Erythromycin → Tetracycline
S susceptible · R resistant · I intermediate · S-S-R-R-R = 앞의 두 약에는 감수성, 뒤의 세 약에는 내성

MDR DEFINITION

3개 이상 항생제 계열에 내성

538 / 1,672 32.2%

분모는 전체 AST 3,512균주가 아니라, 5개 비β-lactam 약 결과를 함께 평가할 수 있었던 1,672균주

PRIMARY RESISTANCE PATTERN

S · S · R · R · R

CHL · LVX · CLI · ERY · TET

364 / 538 67.7%

주요 MDR resistance pattern · Clindamycin + Erythromycin + Tetracycline 동시 내성

SECONDARY RESISTANCE PATTERN

S · R · R · R · R

110 / 538 20.4%

Levofloxacin까지 포함한 4개 약 동시 내성

PATTERN SHARE

INTERPRETATION NOTE 32.2%는 전체 임산부의 비율이 아니다. 1,672개 GBS isolate 중 MDR phenotype을 보인 균주의 비율이다.

1,672균주 중 538균주(32.2%)가 MDR이었고, 주요 resistance pattern은 clindamycin · erythromycin · tetracycline 동시 내성이었다.
MDR 비율과 동시 내성 항생제 조합을 함께 평가한다.

Bae HG, et al. Yonsei Med J. 2022;63:717–723 · Table 2

THIS STUDY본 연구의 검사 흐름

CDC-RECOMMENDED회수율을 높이는 표준 접근

2×2 표 · Chi-square와 Fisher’s exact

ZARATHU

Pearson Chi-square test

Asymptotic approximation

X^2 통계량을 카이제곱분포로 근사

표본과 기대빈도가 충분히 크면 정확검정과 매우 비슷한 결과가 나올 수 있음

Fisher’s exact test

Exact probability

고정된 주변합에서 가능한 2×2 표를 직접 계산

기대 빈도가 작아도 Type I error가 α를 넘지 않음

검정 선택 기준: 전체 N보다 expected cell count

논문 3

전체 자료 규모 N=33,721

대부분의 비교 셀에 충분한 관찰 수

→ Chi-square test

VS

논문 5

과거 37 vs 최근 209 균주

일부 범주 비교에서 희소 셀 발생

→ Fisher’s exact test

표본과 기대빈도가 충분히 크면 두 결과가 매우 비슷해질 수 있다

이 논문은 비율비교에 chi-square test를 우선 적용하고, 기대빈도가 작은 경우 Fisher’s exact test를 사용했다. Fisher’s exact test는 희소한 2×2 표에 적합하지만 조건부 검정이어서 다소 보수적일 수 있다. · Agresti (1992), Upton (1992)

미생물 다중결과 · 분석 층 + FDR

04 · MULTIPLICITY

양성/음성 · Ct value · 상대 풍부도 · Alpha/Beta diversity · 개별 OTU

미생물 분석 · 한 검체에서 산출되는 6가지 결과

ZARATHU

qPCR

양성 / 음성

정한 균이 **검출되었는가**

범주형 · n (%) · Fisher’s exact

qPCR

Ct value

몇 번째 cycle에서 신호가 잡혔는가 · 낮을수록 target DNA가 많음

연속형 · Mann–Whitney U

16S rRNA

Relative abundance

그 검체의 전체 read 중 해당 분류군의 **비율**

합이 100%인 조성 자료 · 하나가 늘면 다른 것이 줄어듦

16S rRNA

Alpha diversity

검체 하나 안의 다양성 · Chao1은 종의 수, Shannon은 종 수와 균등도

검체당 값 하나

16S rRNA

Beta diversity

검체 사이 군집 구성의 거리 · 검체 쌍마다 거리를 계산

Principal components 기반 차원축소로 시각화
이 논문에서는 CRC군과 대조군 사이 유의한 차이 없음

16S rRNA

개별 OTU 비교

수백 개 분류군을 **각각** 검정 · 이 논문은 698개

다중검정 → FDR 보정

동일 검체에서도 분석법에 따라 평가 대상과 결과변수가 다르다.

논문 4 · qPCR과 16S rRNA의 분석 역할

ZARATHU

PAPER 4 · CRC MICROBIOME · Sci Rep 2020

STUDY POPULATION · CRC

CRC 38 patients → 39 CRC samples

한 환자에서 primary adenocarcinoma lesion 2개

38명 / 39조직

환자 수와 조직 수 구분

조직 검체

STUDY POPULATION · CONTROL

Control 21 individuals

대조군의 normal tissue

21명

normal tissue

qPCR

특정 CRC-associated bacteria 검출

- Fusobacterium nucleatum
- colB+ E. coli
- bft+ Bacteroides fragilis
- Enterococcus faecalis
- Streptococcus gallolyticus

Positive / Negative
Positive rate → Fisher's exact test

Ct value
Mann–Whitney U test

특정 균이 있는가 · 얼마나 많이 검출되는가

16S rRNA sequencing

전체 microbial community 분석

- **Relative abundance** 분류군별 상대풍부도
- **Alpha diversity** 검체 안의 다양성
- **Beta diversity** 검체 사이 군집 차이
- **Individual OTUs** 개별 OTU 비교

총 698 OTUs → multiple testing → FDR correction

전체 세균 군집을 폭넓게 탐색

qPCR · Targeted 특정 균을 미리 정해서 검사

VS

16S · Community-wide 전체 세균 군집을 폭넓게 탐색

qPCR은 특정 균의 검출을, 16S rRNA는 전체 미생물 군집의 구성을 본다.
같은 조직에서 나온 결과라도 분석법에 따라 질문과 통계 방법이 달라진다.

Kim M, et al. Sci Rep. 2020;10:19915 / Methods / Results

논문 4 · Table 2: CRC 관련 세균 qPCR 검출률

ZARATHU

PAPER 4 · CRC MICROBIOME · Sci Rep 2020

Bacteria	No. (%) of patients positive for qPCR		
	CRC patients (n = 39)[a]	Controls (n = 21)[b]	*P*-value[c]
Fusobacterium nucleatum	32 (82.1)	0 (0.0)	< 0.0001
colB + *E. coli*	15 (38.5)	4 (19.0)	0.1538
bft + *Bacteroides fragilis*	14 (35.9)	8 (38.1)	1.0000
Enterococcus faecalis	6 (15.4)	1 (4.8)	0.4037
Streptococcus gallolyticus	0 (0.0)	1 (4.8)	0.3500

Table 2. Prevalence of CRC-associated bacteria by quantitative real-time PCR (qPCR). [a]No. of positives on detection in the carcinoma tissues of CRC patients. [b]No. of positives based on detection in the left and right normal tissues of controls. [c]P-values were calculated using Fisher's exact test.

Table 2 발췌·강조 · CRC 관련 세균 5종의 qPCR 검출률 비교

KEY RESULT

Fusobacterium nucleatum

CRC **32 / 39** **82.1%** vs CONTROL **0 / 21** **0%**

P < 0.0001

CRC carcinoma tissue에서 유일하게 뚜렷한 검출률 차이를 보인 세균

OTHER BACTERIA

나머지 4개는 유의한 차이 없음

모두 P > 0.05

colB+ E. coli	38.5% vs 19.0%	P=0.1538
bft+ B. fragilis	35.9% vs 38.1%	P=1.0000
Enterococcus faecalis	15.4% vs 4.8%	P=0.4037
Streptococcus gallolyticus	0% vs 4.8%	P=0.3500

INTERPRETATION NOTE

82.1%는 환자 전체의 장내 Fusobacterium 비율이 아니라, CRC carcinoma tissue에서 qPCR로 *F. nucleatum*이 검출된 비율이다.

검출률 · prevalence ≠ 상대풍부도 · relative abundance

STATISTICAL TEST

Fisher's exact test

qPCR positive / negative 비율 비교

	Positive	Negative
CRC	32	7
Control	0	21

→ Fisher's exact : P < 0.0001

5개 후보 세균 중 F. nucleatum만 CRC 조직에서 뚜렷하게 높은 qPCR 검출률을 보였다.
CRC 82.1% vs control 0% · Fisher's exact P<0.0001

Kim M, et al. Sci Rep 2020;10:19915 · Table 2

논문 4 · Figure 1: F. nucleatum의 병기·조직별 분포

ZARATHU

PAPER 4 · CRC MICROBIOME · Sci Rep 2020

A · Stage　B · Tissue　C · fadA



Figure 1. *F. nucleatum* statuses of CRC patients and controls. (**A**) Patients with CRC were categorized according to tumor stage (I/II: early stage, III/IV: late stage). *F. nucleatum* prevalence was significantly higher in CRC patients at early and late stages than in controls (92% and 76.9% vs. 0%, respectively; Fisher's exact test, $P < 0.0001$, each). (**B**) Tissues of CRC patients were collected from carcinoma tissues (CTs), adjacent normal tissues (ATs) and/or normal tissues (NTs) from non-CRC sites. *F. nucleatum* was significantly higher in CTs (82.1%) than in ATs (38.9%) and NTs (33.3%) of CRC patients (CT vs. AT, CT vs. NT, AT vs. T, and NT vs. T; Fisher's exact test, $P = 0.0002$, < 0.0001, 0.0008, and 0.003, respectively) and was significantly higher in CTs than in tissues (Ts) of controls ($P < 0.0001$). (**C**) Comparison of the prevalence of the *fadA* gene revealed significant differences between the CTs of patients and tissues (Ts) of controls (69.2% vs. 9.5%; Fisher's exact test, $P < 0.0001$). Four asterisks (****) indicate $P < 0.0001$, three asterisks (***) indicate $P < 0.001$, and two asterisks (**) indicate $P < 0.001$; Fisher's exact test was performed using GraphPad Prism version 5.0 for Windows.

Figure 1 · F. nucleatum의 tumor stage·tissue type 및 fadA 검출 결과

A · TUMOR STAGE
초기·후기 모두 높은 검출률

Control	Early I/II	Late III/IV
0 / 21	12 / 13	20 / 26
0%	92.3%	76.9%

두 CRC stage 모두 control보다 높음 · P<0.0001 each
Early vs Late 자체의 차이는 유의하지 않음

B · TISSUE TYPE
암 조직에서 가장 높음

Carcinoma tissue · CT	32/39 · 82.1%	Adjacent normal · AT	38.9%
Non-CRC-site normal · NT	33.3%	Control tissue	0%

CT vs AT · P=0.0002　CT vs NT · P<0.0001

같은 CRC 환자에서도 *F. nucleatum*은 carcinoma tissue에 더 집중됨

C · fadA VIRULENCE GENE
fadA도 CRC tissue에서 더 흔함

CRC carcinoma tissue **69.2%** vs Control tissue **9.5%**

P < 0.0001

adhesion / invasion 관련 virulence factor

qPCR Ct VALUE

qPCR-positive 조직끼리 비교했을 때 carcinoma tissue의 Ct가 AT/NT보다 더 낮았다. Mann–Whitney U · P<0.0001
낮은 Ct → 상대적으로 더 많은 target DNA

Figure 1 직접 표시 아님
Ct comparison: Results / Supplementary Fig. S1

F. nucleatum 검출률은 CRC 초기·후기 모두 높았으며, 동일 환자의 carcinoma tissue에서 더 높았다.
검출 여부와 조직 위치에 따른 분포를 구분해 해석한다.

Kim M, et al. Sci Rep. 2020;10:19915 · Figure 1

Beta diversity · 검체 간 미생물 군집 차이

ZARATHU

차원축소 플롯(그래프)이란?

여러 변수(특징)로 구성된 고차원 데이터를, 주요한 구조를 보존하면서 2차원(또는 3차원)으로 표현한 그래프입니다.

고차원 데이터

여러 변수로 구성된 원래 데이터

검체 (샘플)	변수 1 (특징 1)	변수 2 (특징 2)	…	변수 p (특징 p)
검체 1	2.31	-0.45	…	1.27
검체 2	0.12	1.05	…	-0.33
검체 3	-1.08	0.32	…	0.71
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
검체 *n*	0.55	-1.20	…	0.18

변수가 매우 많음 ($p >> 2$)

차원축소

PCA / PCoA / t-SNE / UMAP

차원축소 후 2차원 그래프



점 하나 = 검체 1개

가까운 점 = 군집구성이 유사함

두 집단이 분리되면 군집구성이 다를 가능성

핵심 아이디어: 원래 고차원 데이터에서 중요한 패턴(유사도/거리 구조)을 최대한 보존하여, 2차원 평면에서 시각적으로 군집(군집구성)과 분리 정도를 쉽게 파악할 수 있게 합니다.

교육용 개념도 · principal component plot과 같은 차원축소 플롯 읽기

SAMPLE REPRESENTATION

점 하나 = 검체 하나

각 조직 검체의 전체 microbial composition을 저차원 공간의 한 점으로 표현

수백 개 OTU 정보가 몇 개 축으로 요약됨

DISTANCE

점 사이 거리 = 군집 구성 차이

가까운 점
미생물 구성이 상대적으로 비슷함

멀리 떨어진 점
미생물 구성이 상대적으로 다름

집단 분리는 군집 차이 가능성을 시각화하지만, 그림만으로 통계적 유의성을 확정하지 않음

THIS STUDY

CRC vs Control
β-diversity · 유의한 차이 없음

α-diversity도 유의한 차이 없음

전체 microbial community 수준에서 두 집단이 뚜렷하게 분리되지 않음

ALPHA DIVERSITY · 한 검체 안
species richness / evenness

vs

BETA DIVERSITY · 검체 사이
community composition difference

전체 군집 차이가 없어도 개별 OTU는 다를 수 있다.
다음: 698개 OTU의 다중검정과 FDR →

Beta diversity는 검체 사이의 전체 미생물 군집 차이를 본다.
이 연구에서는 CRC와 control 사이의 α·β diversity 차이가 유의하지 않았다.

Kim M, et al. Sci Rep. 2020;10:19915 · Methods / Supplementary Fig. S2

다중검정 · 698개 OTU의 FDR 보정

ZARATHU

ONE TEST

검정 1회 P < 0.05

한 가지 가설만 검사할 때는 하나의 P-value를 해석

VS

698 TESTS

698 OTUs 각각 비교

각 OTU를 CRC와 control 사이에서 개별 검정

검정 수 ↑ → 우연히 작은 P-value도 늘어날 수 있음

698 OTUs
분석 시작

→

OTU별 CRC vs Control 비교
individual tests

→

698개 raw P-values
보정 전 결과

→

FDR correction
multiple testing correction

→

6 OTUs
FDR 보정 후 유의

FDR

False Discovery Rate

여러 결과를 동시에 유의하다고 판단할 때, 그 발견들 중 거짓 양성이 포함되는 비율을 통제하는 접근

multiple testing correction

FDR-ADJUSTED RESULT

6 / 698 OTUs

CRC vs control에서
FDR 보정 후 유의한 차이

Peptostreptococcus	Collinsella	Prevotella
Parvimonas	Fusobacterium	Gemella

α·β diversity는 유의하지 않았지만, 개별 OTU 수준에서는 차이가 남았다. → 다음 Figure 2

수백 개 OTU를 동시에 비교할 때는 raw P-value만으로 판단하지 않고 FDR 보정이 필요하다.
이 연구에서는 698개 OTU 중 FDR 보정 후 6개 OTU가 CRC와 control 사이에서 차이를 보였다.

Kim M, et al. Sci Rep. 2020;10:19915 · Methods / Results / Figure 2

논문 4 · Figure 2: CRC와 대조군 간 차이를 보인 6개 OTU

ZARATHU

PAPER 4 · CRC MICROBIOME · Sci Rep 2020

CASE = CRC patients | CONTROL = controls | Y-axis = relative abundance | Boxplot = 분포 비교



Figure 2. Relative abundance of six OTUs that were significantly different between cases (CRC patients) and controls were compared using R software.

Figure 2 · CRC와 control 사이에서 차이를 보인 6개 OTU

각 패널의 y-axis scale은 서로 다름 · genus 간 절대 높이 직접 비교 금지

FDR-ADJUSTED RESULT

FDR 보정 후 차이가 남은 6개 genus

6 / 698 OTUs

Peptostreptococcus	Collinsella
Prevotella	Parvimonas
Fusobacterium	Gemella

CRC case와 control 사이 relative abundance 차이

ANALYSIS LEVEL

전체 군집과 개별 OTU

α / β diversity	유의한 차이 없음
Individual OTUs	6개에서 차이

전체 군집 수준과 개별 OTU 수준의 결과는 다를 수 있음

KEY RESULT

Fusobacterium

CRC에서 더 높은 relative abundance

Figure 표시 P = 6.8 × 10⁻⁵

qPCR에서도 CRC tissue의 *F. nucleatum* 검출률이 높아, 두 분석법에서 일관된 연관성이 관찰됨 · 측정값은 서로 다름

전체 α·β diversity에는 차이가 없었지만, 698개 OTU 중 6개 genus는 CRC와 control 사이에서 차이를 보였다.
전체 군집 수준의 결과와 개별 feature 수준의 결과는 서로 다를 수 있다.

Kim M, et al. Sci Rep. 2020;10:19915 / Figure 2

논문 4 · Figure 3: 음주와 Fusobacterium 상대풍부도

ZARATHU

PAPER 4 · CRC MICROBIOME · Sci Rep 2020

LEFT · CRC cases · P = 0.003

RIGHT · Controls · P = 0.636

Y-axis · Relative abundance (%)



Figure 3. Differences in the proportion of *Fusobacterium* between heavy drinkers and non/light drinkers by cases (CRC patients) and controls. The proportion of *Fusobacterium* OTUs was significantly higher in heavy drinkers than in non/light drinkers ($P = 0.003$); no corresponding pattern was observed in controls. We used software to perform the comparison and generate the figure.

90.00

Figure 3 · 음주군별 Fusobacterium relative abundance 비교

두 패널의 y-axis scale이 서로 다름 · CRC와 control의 box 높이 직접 비교 금지

CRC PATIENTS

Heavy drinker에서 더 높은 abundance

P = 0.003

Heavy drinker vs Non/light drinker

Fusobacterium OTU의 relative abundance 분포가 heavy drinker에서 더 높음

CONTROLS

차이 없음

P = 0.636

Heavy vs Non/light

Control에서는 같은 패턴이 관찰되지 않음

ANALYSIS DISTINCTION

양성률과 상대풍부도의 구분

TABLE 4 · 양성 / 음성

≥1% 기준의 양성 여부

Heavy · 14/15 positive · 93.3%

Non/light · 11/17 positive · 64.7%

Fisher's exact · P = 0.088

6/17은 negative

FIGURE 3 · 연속형 abundance

연속형 상대풍부도

실제 relative abundance 전체 분포 비교

CRC · P = 0.003

16S rRNA 결과 · qPCR 결과가 아님

일반적인 0.05 기준에서 Table 4 P=0.088은 유의하지 않음

P = 0.088과 P = 0.003은 서로 다른 분석 결과

ASSOCIATION / CAUSATION

CRC 환자에서 heavy drinking과 높은 Fusobacterium abundance가 연관됨

Alcohol → Fusobacterium → CRC 인과 경로는 확인되지 않음

CRC 환자에서는 heavy drinker의 Fusobacterium 상대풍부도가 더 높았지만(P=0.003), control에서는 같은 패턴이 없었다(P=0.636).
검출 여부(P=0.088)와 상대풍부도(P=0.003)는 서로 다른 분석이다.

Kim M, et al. Sci Rep. 2020;10:19915 · Figure 3 / Table 4

논문 4 · 연관성 해석과 연구의 한계

ZARATHU

PAPER 4 · CRC MICROBIOME · Sci Rep 2020

HEAVY ALCOHOL
EXPOSURE

?

FUSOBACTERIUM ↑
RELATIVE ABUNDANCE

?

CRC
DISEASE

Association observed · Causal pathway not established

OBSERVED ASSOCIATIONS

관찰된 연관성

① CRC tissue에서 *F. nucleatum* 검출률이 높음 · **82.1% vs control 0%**

② CRC 환자의 heavy drinker에서 Fusobacterium relative abundance가 더 높음 · **Figure 3 · P=0.003**

③ qPCR-positive sample은 16S에서도 Fusobacterium abundance가 높은 경향

LIMITS OF INTERPRETATION

이 연구에서 확인되지 않은 인과관계

✕ 술이 Fusobacterium을 증가시킨다

✕ Fusobacterium 증가가 CRC를 발생시킨다

✕ Alcohol → Fusobacterium → CRC 순차 인과 경로

✕ Fusobacterium을 줄이면 CRC가 예방된다

LIMITATION 1

Small sample size

CRC 38명 · 39 samples
Control 21명
작은 표본이 통계적 유의성을 제한할 수 있음

LIMITATION 2

Tubular adenoma 별도군 분석 불가

대조군 일부가 tubular adenoma였으나 표본이 작아 독립된 adenoma group으로 분석하지 못함

LIMITATION 3

1% OTU cutoff

16S OTU ≥1%를 positive로 정의
추가 연구로 cutoff 확인 필요

STRENGTH

한 연구에서 동시에 통합 분석

qPCR · 16S rRNA · Demographics · Clinical data

서로 다른 측정 결과를 함께 해석할 수 있음

이 연구에서는 CRC·Fusobacterium·음주 사이의 연관성이 관찰되었으나, Alcohol → Fusobacterium → CRC의 인과 경로는 확인되지 않았다.
작은 표본과 제한된 subgroup 분석을 고려해 결과를 해석해야 한다.

Kim M, et al. Sci Rep. 2020;10:19915 · Discussion / Limitations

WGS · 계통 + 내성 조합

05 · PROFILE

표현형 · ST/CC · cps · ARG · AMR profile · 시간 변화

논문 5 · 연구 설계: 1994–2000 vs 2017–2022 GBS 균주

ZARATHU

PAPER 5 · GBS WGS · Ann Lab Med 2025



유전체 정보 → 분류 변수(ST, CC, cps) → 빈도·비율 계산 → 시기별 비교

교육용 도식 · GBS isolate별 WGS·내성 결과를 범주형 변수로 정리

TOTAL · 246 GBS isolates

PAST		RECENT
37	VS	209
1994–2000 · isolates		2017–2022 · isolates

GBS isolate 하나에 붙는 정보

CC 큰 계통 · clonal complex	**cps** capsular genotype	**ST** sequence type
AMR 실제 표현형 내성	**ARG** 내성 관련 유전자	**PROFILE** 여러 항생제 내성 조합

분석 단위 = 사람 × · 검체 ×
GBS isolate 1개

각 시대의 기본 분모: 37과 209
1/37 = 2.7% · 32/209 = 15.3%
CC 내부가 아닌 시대 전체 isolate 중 비율

STUDY WORKFLOW

GBS isolate → AST → WGS → CC / ST / cps / ARG → AMR profile → 두 시기 n (%) 비교

PROPORTION COMPARISON

두 독립 시기의 비율 비교
Primary · Chi-square
Sparse expected cells · Fisher's exact
전체 N만으로 검정을 선택하지 않음

이 논문은 GBS isolate별로 계통·유전자·내성 정보를 통합한 뒤, 과거 37균주와 최근 209균주의 구성을 비교했다.
WGS 결과도 결국 isolate 단위의 n (%)로 정리되어 시대 간 비교된다.

Ahn K., et al. Ann Lab Med. 2025 · Methods / Table 1–3

논문 5 · AST와 WGS의 통합 분석 흐름

ZARATHU

PAPER 5 · GBS WGS · Ann Lab Med 2025

GBS ISOLATE

AST

Phenotypic resistance

항생제별 감수성·내성 표현형

MicroScan MicroSTREP Plus Panel

Penicillin	Ampicillin	Cefepime	Cefotaxime
Ceftriaxone	Meropenem	Vancomycin	Erythromycin
Clindamycin	Tetracycline	Levofloxacin	Chloramphenicol

WGS

Genotype / lineage

계통·피막 유전형과 내성 관련 유전자를 확인

ST	CC	cps	ARG
sequence type	clonal complex	capsular genotype	resistance gene

MLSB	TET	LEV	CHL
ermB · ermT · lnuB · lsaC · mefA · msrD	tetM · tetO	gyrA · gyrB · parC · parE	catA

INTEGRATED ANALYSIS

Phenotype resistance · ST / CC / cps · ARG · Resistance profile · Time period

1994–2000
VS
2017–2022 · 비율 비교

PHENOTYPE
항균제 감수성 검사 결과

≠

GENOTYPE · ARG presence
내성 관련 유전자 보유 여부

METHOD CONSISTENCY

AST는 동일 기관·같은 MicroScan panel로 통일해 시행
WGS도 동일한 analytical pipeline 적용

같은 GBS 균주에서 AST로 표현형 내성을, WGS로 계통·ARG 정보를 얻어 두 시대의 내성 구성을 함께 비교했다.
표현형과 유전형은 연결되어 있지만 동일한 결과변수는 아니다.

Ahn K, et al. Ann Lab Med. 2025 · Methods

논문 5 · Table 1: GBS 계통 구성의 시간 변화

ZARATHU

PAPER 5 · GBS WGS · Ann Lab Med 2025

Table 1. Changes in CCs, *cps* genotypes, and STs of 246 group B *Streptococcus* isolates according to study period

CC (N)		*cps* genotype	(N)	1994–2000		2017–2022		*P**
				N (%)	ST (N)	N (%)	ST (N)	
1	(79)	VIII	(33)	1 (2.7)	ST1 (1)	32 (15.3)	ST2 (32)	0.037
		V	(22)	4 (10.8)	ST1 (4)	18 (8.6)	ST1 (18)	0.753
		VI	(15)	0 (0)		15 (7.2)	ST1 (11), ST667 (4)	0.137
		II	(7)	0 (0)		7 (3.3)	ST676 (5), ST1 (1), ST1274 (1)	0.599
		VII	(2)	0 (0)		2 (1.0)	ST1 (2)	1.000
19	(75)	III	(50)	14 (37.8)	ST19 (12), ST106 (1), ST1973 (1)	36 (17.2)	ST335 (18), ST19 (11), ST27 (4), ST861 (2), ST1911 (1)	0.004
		V	(24)	0 (0)		24 (11.5)	ST19 (22), ST27 (2)	0.031
		Ib	(1)	0 (0)		1 (0.5)	ST335 (1)	1.000
12	(42)	Ib	(38)	10 (27.0)	ST8 (8), ST12 (1), ST1977 (1)	28 (13.4)	ST654 (14), ST10 (8), ST12 (3), ST1912 (1), ST1913 (1), ST8 (1)	0.034
		II	(3)	1 (2.7)	ST12 (1)	2 (1.0)	ST12 (2)	0.388
		III	(1)	0 (0)		1 (0.5)	ST12 (1)	1.000
17	(15)	III	(15)	1 (2.7)	ST17 (1)	14 (6.7)	ST17 (14)	0.707
23	(13)	Ia	(13)	4 (10.8)	ST23 (4)	9 (4.3)	ST23 (8), ST144 (1)	0.113
452	(9)	Ia	(5)	1 (2.7)	ST24 (1)	4 (1.9)	ST24 (3), ST890 (1)	0.561
		V	(3)	0 (0)		3 (1.4)	ST498 (2), ST24 (1)	1.000
		III	(1)	0 (0)		1 (0.5)	ST24 (1)	1.000
327	(7)	V	(6)	0 (0)		6 (2.9)	ST529 (6)	0.595
		III	(1)	0 (0)		1 (0.5)	ST529 (1)	1.000
22	(2)	II	(2)	0 (0)		2 (1.0)	ST22 (2)	1.000
459	(1)	IV	(1)	0 (0)		1 (0.5)	ST196 (1)	1.000
NA†	(3)	Ia	(1)	1 (2.7)	ST103 (1)	0 (0)		0.150
		II	(1)	0 (0)		1 (0.5)	NA‡ (1)	1.000
		III	(1)	0 (0)		1 (0.5)	ST862 (1)	1.000

*Statistical differences in the prevalence of specific CCs and *cps* genotypes between the two periods were evaluated. The chi-square test was first used, and if any expected frequency was < 5, Fisher's exact test was used.
†NA indicates isolates for which the ST was identified but the CC was not available on the PubMLST website.
‡Because of a variant in the last 28 bases of *adhP* allele 401, one isolate could not be assigned an allele, ST, or CC.
Abbreviations: CC, clonal complex; ST, sequence type; NA, not available.

Do not copy Article

Table 1 · 1994–2000년과 2017–2022년의 ST·CC·cps genotype 분포

DOMINANT CC

우세 CC의 변화

PAST · 1994–2000 **CC19** 13 / 37 · 35.1% → RECENT · 2017–2022 **CC1** 74 / 209 · 35.4%

INCREASE

CC1 · cps VIII

PAST 1 / 37 · 2.7% → RECENT 32 / 209 · 15.3%

P = 0.037

과거 ST1 1균주 → 최근 32균주는 모두 ST2

DECREASE

CC19 · cps III

PAST 14 / 37 · 37.8% → RECENT 36 / 209 · 17.2%

P = 0.004

비율 감소

NEWLY EMERGED

CC19 · cps V

PAST 0 / 37 · 0% → RECENT 24 / 209 · 11.5%

P = 0.031

과거에는 없었지만 최근 집단에서 확인

DECREASE

CC12 · cps Ib

PAST 10 / 37 · 27.0% → RECENT 28 / 209 · 13.4%

P = 0.034

메인 결과는 원표(Table 1) 값 사용

TABLE 읽는 법 · 기본 분모는 시대별 전체 isolate 수

PAST 37 · RECENT 209 · 1/37=2.7% · 32/209=15.3%

CC 내부 비율이 아니라 각 시대 전체 isolate 중 비율

※ 원문 내부 수치 주의 · CC19은 본문·초록에서 13/37(35.1%)로 보고되나 Table 1 세부행 합계는 14로 읽힘.

CC12–Ib는 본문 27/209(12.9%), P=.027; Table 1은 28/209(13.4%), P=.034. **본 슬라이드는 CC12–Ib에 원표 값을 사용함.** 희소 cell 비교 · Fisher's exact

1994–2000과 2017–2022 사이에 GBS의 주요 계통 조합이 뚜렷하게 재편되었다.

과거 우세 CC는 CC19, 최근 우세 CC는 CC1이며, 여러 cps·ST 조합이 증가·감소 또는 새롭게 등장했다.

Ahn K, et al. Ann Lab Med 2023 · Table 1

논문 5 · 표현형 내성 ≠ ARG

ZARATHU



Fig. 1. Comparison of antimicrobial resistance rates and related resistance genes by period. Asterisks mark statistically significant ($P < 0.05$) differences between the two periods.

Figure 1. 시기별 표현형 내성과 관련 내성 유전자 변화 · Ahn K, et al. Ann Lab Med 2025

TETRACYCLINE R

97.3% → 60.8%

P < 0.001

tetO

2.8% → 29.9%

P = 0.017

LEVOFLOXACIN R

0% → 23.4%

P = 0.001

tetM

91.7% → 72.4%

P < 0.001

표현형 내성과 ARG prevalence를 시기별로 각각 비교 · 균주 단위 일치도는 별도 분석

Genotype–phenotype · 비율 변화와 일치도 분석의 차이

ZARATHU

THIS PAPER

시기별 비율 비교

1994–2000 VS 2017–2022

Phenotype · Tetracycline R	ARG · tetM	ARG · tetO
97.3% → 60.8%	91.7% → 72.4%	2.8% → 29.9%

Population-level proportion comparison

VS

AGREEMENT ANALYSIS

군주 단위 일치도

같은 isolate의 ARG × phenotype

	Phenotype R	Phenotype S
ARG +	a	b
ARG −	c	d

일치도 연구를 한다면 계산 가능한 지표

Sensitivity	Specificity
PPV	NPV
Cohen's κ	95% CI

이 논문이 실제 계산한 결과는 아님

POPULATION TREND AND ISOLATE CONCORDANCE

Phenotype resistance ↓
ARG prevalence ↓

≠

같은 isolate에서
ARG와 resistance가 일치함

두 비율의 시기별 변화 방향이 유사해도 개별 isolate의 대응은 별도 2×2 분석 없이는 평가할 수 없음

THIS PAPER · 정확한 결론

ARG prevalence와 phenotypic resistance의 시간 변화를 각각 분석했다.
Isolate-by-isolate genotype–phenotype concordance는 별도로 평가하지 않았다.

ARG presence
내성 관련 유전자 보유

VS

Phenotypic resistance
검사에서 확인된 내성 표현형

gene presence와 phenotype 사이에는
expression · functional mutation · breakpoint · other mechanism 가 존재

시기별 phenotype·ARG 비율 변화와 개별 균주의 genotype–phenotype 일치도는 서로 다른 분석이다.
이 논문은 전자를 분석했으며, sensitivity·specificity·kappa 기반 일치도 분석은 별도로 수행하지 않았다.

논문 5 · Table 2: 시기별 AMR profile 분포 변화

ZARATHU

PAPER 5 · GBS WGS · Ann Lab Med 2025

Table 2. Changes in resistance profiles of 246 group B *Streptococcus* isolates according to study period

Resistance pattern	N (%) isolates		*P**
	1994–2000	2017–2022	
No resistance	1 (2.7)	50 (23.9)	0.003
TET	20 (54.1)	39 (18.7)	<0.001
LFX	0 (0)	19 (9.1)	0.087
ERY	0 (0)	4 (1.9)	1.000
CLI-TET	3 (8.1)	2 (1.0)	0.025
ERY-TET	1 (2.7)	15 (7.2)	0.479
TET-CHL	1 (2.7)	0 (0)	0.150
ERY-CLI	0 (0)	8 (3.8)	0.610
TET-LFX	0 (0)	6 (2.9)	0.595
LFX-CHL	0 (0)	1 (0.5)	1.000
ERY-CLI-TET	9 (24.3)	41 (19.6)	0.512
ERY-TET-LFX	0 (0)	8 (3.8)	0.610
CLI-TET-LFX	0 (0)	1 (0.5)	1.000
TET-LFX-CHL	0 (0)	1 (0.5)	1.000
ERY-CLI-TET-CHL	2 (5.4)	1 (0.5)	0.060
ERY-CLI-TET-LFX	0 (0)	9 (4.3)	0.363
ERY-TET-LFX-CHL	0 (0)	3 (1.4)	1.000
ERY-CLI-TET-LFX-CHL	0 (0)	1 (0.5)	1.000
Consistently common profiles†	35 (94.6)	98 (46.9)	<0.001
Period-specific profiles‡	1 (2.7)	61 (29.2)	

*The chi-square test was first used, and if any expected frequency was <5, Fisher's exact test was used.
†Resistance patterns were persistently observed throughout the study period.
‡Resistance patterns were identified exclusively in an exact period.
Abbreviations: TET, tetracycline; LFX, levofloxacin; ERY, erythromycin; CLI, clindamycin; CHL, chloramphenicol.

Table 2 · 1994–2000년과 2017–2022년의 AMR profile 분포

PROFILE DIVERSITY

AMR profile 종류 증가

PAST 6 profiles → RECENT 16 profiles

최근 새롭게 확인된 pattern 11종

개별 내성률이 아니라 한 isolate의 동시 내성 조합 수

NO RESISTANCE

내성이 없는 isolate도 증가

PAST 1 / 37 2.7% → RECENT 50 / 209 23.9%

P = 0.003

Profile 다양성 증가는 모든 isolate의 내성 증가를 의미하지 않음

TET ONLY

과거의 지배적 단독 profile 감소

PAST 20 / 37 54.1% ↓ RECENT 39 / 209 18.7%

P < 0.001

Tetracycline 내성이 사라진 것이 아니라 TET-only 비중이 감소

PERIOD-SPECIFIC PROFILES

특정 시기에만 나타난 조합 증가

PAST 1 / 37 2.7% → RECENT 61 / 209 29.2%

P < 0.001

Table 2의 common vs period-specific 전체 비교

AMR PROFILE 읽는 법

TET = tetracycline resistance only
ERY-CLI-TET = 3개 약 동시 내성
ERY-CLI-TET-LFX = 위 3개 + levofloxacin 내성

ERY erythromycin · CLI clindamycin · TET tetracycline · LFX levofloxacin · CHL chloramphenicol

COMMON vs PERIOD-SPECIFIC · P < 0.001

CONSISTENTLY COMMON 94.6% → 46.9% VS PERIOD-SPECIFIC 2.7% → 29.2%

반복되던 조합 비중은 줄고 최근 시기에만 관찰된 조합은 증가

AMR PROFILE DIVERSITY

No resistance ↑ · TET-only ↓ · 새로운 복합 profiles ↑
AMR profile diversity가 증가함

Levofloxacin 관련 81.8%(초록)와 80.3%(본문)는 분모·표현이 달라 직접 결합하지 않음

GBS 내성 profile은 과거 6종에서 최근 16종으로 증가했으며, 최근 시기에만 관찰된 새로운 내성 조합의 비중이 증가했다.
개별 내성률과 여러 항생제 내성의 조합을 함께 평가한다.

Ahn K, et al. Ann Lab Med. 2025 · Table 2

논문을 읽을 때 확인할 7가지

ZARATHU

01 **연구 질문**
무엇을 추정하거나 비교하는가?
범위 · 차이 · 비율 · 군집 · profile

02 **분석 단위**
사람 · 검체 · 조직 · 균주
"무엇 하나가 N=1인가?"

03 **분자와 분모**
n / N (%)에서
무엇을 무엇으로 나눴는가?

04 **자료 구조**
독립 자료인가?
paired / repeated data인가?

05 **효과크기와 불확실성**
P-value만 보지 말고
차이의 크기 · 95% CI · 표본수 확인

06 **다중검정**
여러 feature를 동시에 비교했다면
FDR 등 correction 여부 확인

07 **해석 범위**
연관성인가 인과성인가?
참고집단 · 검사법 · 표본선정이
결론의 적용 범위를 어디까지 제한하는가?

연구 질문 → 분석 단위 → 결과변수 → 통계 방법 → Figure/Table → 해석
P-value는 마지막에 본다.

핵심 요약

ZARATHU

01 PTH 참고구간 · 집단 차이 검정 X · **검사값 분포 범위**

02 TG 검사법 비교 · **Correlation ≠ Agreement**

03 GBS 집락률 · **분모 및 분석 단위 확인**

04 CRC 미생물 · **전체 군집 / 개별 feature / FDR**

05 GBS WGS · **계통 / ARG / 표현형 / profile**

06 논문 통계 · **연구 질문 → 분석 단위 → 방법**

연구 질문 → 분석 단위 → 결과변수 → Figure/Table