Departamento de Estadística y Matemáticas Facultad de Ciencias Económicas Estadística II Parcial I

Nombre:	Cédula:

1. (2 puntos) Basados en un estudio sobre el número de descargas diarias de un nuevo filtro de realidad aumentada para una red social, durante su primer mes de lanzamiento (escalado a cientos de descargas), se encontró que el número de descargas (en cientos) posee la siguiente función de densidad de probabilidad:

$$f(x) = \frac{2}{13^2}x^1$$
 para $0 < x < 13$

Suponga que el equipo de marketing digital, , luego de tomar una muestra aleatoria X_1, X_2, \ldots, X_{47} se encuentra interesada en la distribución de probabilidad del número **máximo** de descargas, y por tanto solicita que se realice el cálculo de la distribución de probabilidad para dicho estadístico de orden, junto a su media y varianza. ¿Qué se podría concluir de los resultados obtenidos?

2. (2 puntos) Una cooperativa agrícola está probando dos variedades de semillas de maíz (Variedad A y Variedad B) para determinar cuál ofrece un mejor rendimiento en las condiciones climáticas de la región. Se seleccionan varias parcelas de tierra homogéneas y se siembra cada variedad en un número igual de parcelas asignadas al azar. Tras la cosecha, se registra el rendimiento en toneladas por hectárea para cada parcela. Los agrónomos quieren establecer si hay una diferencia estadísticamente significativa en el rendimiento promedio entre las dos variedades de semillas.

Variedad A

8.763	9.486	7.424	6.404	10.164	10.003	10.135	8.342	13.244	11.155
8.616	11.193	13.246	10.378	11.58	11.568	11.508	12.618	12.168	8.489
9.075	10.057	10.437	11.59	10.782	9.949	9.722	9.44	10.112	9.341
9.69	11.143	12.697	12.417	10.856	5.472	9.579	10.927	10.075	7.718
12.735	10.624	6.798	9.842	10.887	10.588	9.296	12.442		

Variedad B

8.16	5.385	5.346	6.628	5.209	6.905	4.996	6.595	6.128	9.515
7.32	5.153	4.821	6.671	3.474	2.88	4.23	6.479	3.441	6.812
4.212	6.885	9.446	4.666	6.231	7.758	7.465	7.332	7.531	7.049
8.77	7.113	7.928	5.612	5.508	8.957	7.408	10.356	6.298	4.794
5.916	4.661	3.974	7.597	5.305	6.068	6.628	5.915		

Con base en los datos de rendimiento de las variedades de maíz recolectados por la cooperativa agrícola,

a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que la diferencia absoluta entre el rendimiento promedio de la Variedad A y el rendimiento promedio de la Variedad B sea al menos de -3.24 toneladas por hectárea. ¿Qué podría recomendar la cooperativa a los agricultores sobre qué variedad sembrar?

- b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que la razón entre la desviación estándar del rendimiento de la Variedad B y la desviación estándar del rendimiento de la Variedad A sea menor a 1.05. ¿Qué podría concluir sobre la predictibilidad o riesgo asociado al rendimiento de cada variedad?
- 3. (1 punto) Un analista económico de una consultora financiera investiga el número de nuevos proyectos de inversión que una ciudad atrae mensualmente. Después de analizar datos históricos y factores macroeconómicos, el analista propone que la distribución de probabilidad para el número de nuevos proyectos en un mes sigue el siguiente modelo:

ſ	x	0	1	2	3	4	5	6	7
ĺ	p(x)	0.736842	0.153509	0.052934	0.023353	0.011976	0.006805	0.004166	0.010415

Si un economista junior decide realizar un seguimiento del número de nuevos proyectos atraídos por la ciudad durante los próximos 44 meses, en los que encuentra que el promedio de los nuevos proyectos atraídos es de 3.375 ¿cuál es la probabilidad de que este economista observe una desviación estándar mensual en el número de nuevos proyectos que sea menor a 1.05 proyectos?