

Departamento de Estadística y Matemáticas
Facultad de Ciencias Económicas
Estadística I
Parcial II

Nombre: _____ Cédula: _____

1. **(1 punto)** Un estudiante que trabaja en una fotocopidora de la Universidad de Antioquia y decide encontrar una función de probabilidad que se ajuste al número de toner de tinta negra que gasta en un día una fotocopidora. Luego de recaudar información de varios meses, encuentra que la distribución que presenta un mejor ajuste al gasto de toner, posee una distribución de Yule truncada en 4, la cual está dada por

$$p(x) = k(\mu + 1) \frac{\Gamma(x+1)\Gamma(\mu+2)}{\Gamma(x+\mu+3)} \quad \text{para } x = 0, 1, 2, 3, 4$$

Entonces si el valor del parámetro $\mu = 2.5$,

- a) **(0.5 punto)** Encuentre el valor k que hace que la función de probabilidad esté bien definida, y construya la tabla de probabilidad, $(x, p(x))$.
- b) **(0.5 punto)** Encuentre la probabilidad de que el número de toner que se gastan en un día en la fotocopidora sea mayor a 3 toners.
2. **(1 punto)** Suponga que Rappi hace un estudio sobre el número de pedidos que realiza un Rappitendero en bicicleta en una hora y el número de pedidos que realiza un Rappitendero en motocicleta en una hora.

Sea la variable aleatoria X el número de pedidos que realiza un Rappitendero en bicicleta en una hora y la variable aleatoria Y el número de pedidos que realiza un Rappitendero en motocicleta en una hora. Entonces si las variables aleatorias X y Y son independientes con función conjunta dada por

$p(x, y)$		X				
		0	1	2	3	4
Y	0	900	420	500	900	210
	1	6300	2940	3500	6300	1470
	2	7560	3528	4200	7560	1764
	3	540	252	300	540	126
	4	4860	2268	2700	4860	1134
	5	6210	2898	3450	6210	1449

Entonces, si se toma un intervalo cualquiera de una hora

- a) **(0.5 punto)** Calcule el valor k que hace que la función de probabilidad conjunta $p(x, y)$ esté bien definida, y calcule las distribuciones marginales, $g(x)$ y $h(y)$. **Nota:** Trate de usar fraccionarios para que no se compliquen con tanto decimal.
- b) **(0.5 punto)** Calcule las funciones de distribución acumulada $G(X)$ y de $H(Y)$.
3. **(1 punto)** Suponga IMUSA decide hacer una prueba extensa a la nueva lavadora que pretende sacar al mercado, con el fin de determinar el tiempo de vida de una lavadora hasta que ésta requiera de una reparación mayor. suponga que la función de distribución del tiempo de vida de las lavadoras está dado por

$$f(x) = x^4 - 6x^2 + 9 \quad \text{para } 1 \leq x \leq 3$$

- a) **(0.5 punto)** Verifique si la función de densidad de probabilidad está bien definida (de no estarlo, multiplique por una constante k , de tal forma que quede bien definida), y calcule la función de distribución acumulada del tiempo de vida de una lavadora hasta que requiera de una reparación mayor.
- b) **(0.5 punto)** Calcule la probabilidad de que el tiempo de vida de una lavadora hasta que requiera una reparación sea superior a 0.67 pero máximo de 2.17.
4. **(1 punto)** Suponga que la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia encabeza un estudio sobre el número meses de garantía que se ofrecen para diferentes marcas de bicicletas en el país, y encuentra que la función de distribución acumulada $F(X)$ del número de meses de garantía que las bicicletas está dada por

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 3 \\ 0.0025 & 3 \leq x < 8 \\ 0.0174 & 8 \leq x < 11 \\ 0.062 & 11 \leq x < 17 \\ 0.1512 & 17 \leq x < 23 \\ 0.2851 & 23 \leq x < 26 \\ 1 & x \geq 26 \end{cases}$$

- a) **(0.5 punto)** Construya la tabla de la función de masa de probabilidad $(x, p(x))$.
- b) **(0.5 punto)** Calcular la probabilidad de que el número de meses de garantía que tiene una bicicleta sea al menos de 36, dado que se sabe que el número de meses de garantía es de mayor a 8 meses.
5. **(1 punto)** Una nueva cervecería decide crear un nuevo tipo de cerveza y para ello decide mezclar el sabor de la malta tostada que caracteriza a las cervezas STOUT, con el sabor de la malta pálida que caracteriza a las cervezas LAGER, y otros sabores frutales que caracterizan a las cervezas Ale. Las proporciones de malta tostada y malta pálida en una mezcla pueden traducirse en una función de distribución conjunta, siendo X la proporción de malta tostada, y Y la proporción de malta pálida.

La función de densidad de probabilidad conjunta se presenta a continuación

$$f(x, y) = 5x^2 + 15y^2 \quad \text{para } 0 < x < 1; \quad 0 < y < 1; \quad x + y \leq 1$$

Si la cervecería logra sintetizar un nuevo sabor de cerveza

- a) **(0.5 punto)** Calcule es la probabilidad de que la proporción de malta tostada sea menor a 70 %, y la proporción de malta pálida sea inferior a 4 %.
- b) **(0.5 punto)** Calcule es la probabilidad de que la proporción de malta tostada sea no menos de 11 %, y la proporción de malta pálida sea no menos de 12 %.