

Departamento de Estadística y Matemáticas
Facultad de Ciencias Económicas
Estadística II
Parcial II

Nombre: _____ Cédula: _____

1. **(2 puntos)** Suponga que luego de realizar ciertos estudios se ha encontrado que el tiempo que tarda un estudiante en realizar un parcial sobre demostraciones sigue una distribución de probabilidad acumulada $F(x)$ dada por

$$F(x) = \theta \left(\frac{1}{\theta} - \frac{1}{\theta(1+x)^\theta} \right) \quad \text{para } x > 0; \theta > 0$$

Entonces, si se toma una muestra aleatoria X_1, X_2, \dots, X_n *iid* del tiempo que tardan los estudiantes en completar la tarea de programación

- a) **(1 puntos)** Encuentre un estimador para θ usando el método de momentos.
 - b) **(1 punto)** Encuentre un estimador para θ usando el método de máxima verosimilitud.
 - c) **(1 punto)** Pruebe las dos condiciones que debe cumplir el estimador $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$, para ser un estimador consistente del parámetro θ .
2. **(2 puntos)** Suponga que luego de analizar el proceso de selección dentro de una entidad bancaria, un egresado de Administración de Empresas ha notado que el número de nuevos trabajadores que ingresan a la empresa en un día sigue una distribución binomial con parámetros $n = 100$ y p desconocido.

$$f(x) = \binom{100}{x} p^x (1-p)^{100-x} \quad \text{para } x = 0, 1, 2, \dots, 100; 0 < p < 1$$

Entonces, sea X_1, X_2, \dots, X_{100} una muestra aleatoria *iid* del número de nuevos trabajadores que ingresan a la empresa por día, demuestre cuál de los dos estimadores planteados para el parámetro poblacional p es más eficiente

$$\hat{p}_1 = \frac{X_{34} - 5}{98}$$
$$\hat{p}_2 = \frac{10X_{86} - 2X_{76}}{200}$$