# 부모용 진행 안내 · 단항식의 곱셈과 나눗셈

중2 수학 · 수와식 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-MONOMUL-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필과 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 단항식의 곱셈에서 계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 곱하고 같은 문자는 지수법칙으로 정리하며, 괄호 밖에 지수가 있으면 먼저 계산하고 부호는 음수의 개수로 정한다.
**확인** 넓이 모형 설명(S03), 단항식의 곱셈(S04, S05, S06, S07, S13 ①②, 활동지 1)
**성공 기준** $3a \times 2b = 6ab$를 넓이로 설명하고, $(-3a^2) \times 4a^3b = -12a^5b$, $(-3a)^2 \times 2a = 18a^3$처럼 부호·계수·문자를 바르게 정리한다.

**목표 B** 단항식의 나눗셈을 분수 꼴로 써서 약분하거나 나누는 식의 역수를 곱해 계산하고, 곱셈과 나눗셈이 섞인 식을 앞에서부터(÷를 역수의 곱셈으로 바꾸어) 계산한다.
**확인** 나눗셈(S08, S09, S11 ①~④, S13 ③④⑤, 활동지 2·3), 섞인 계산(S10, S11 ⑤⑥, S12, S13 ⑥, S15, 활동지 4·5)
**성공 기준** $12a^3 \div 4a = 3a^2$, $6a^2b \div 2분의\ 3a = 4ab$로 계산하고, $6x^2 \div 2x \times 3x$를 1이 아니라 $9x^2$으로 계산하며 $x = 1$을 넣어 확인한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 지수법칙 2
- 정수와 유리수의 나눗셈
- 문자의 사용과 식의 값

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(지수법칙 2, 정수와 유리수의 나눗셈, 문자의 사용과 식의 값)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 계수끼리 더하거나 같은 문자의 지수를 곱한다($2x^2 \times 3x^3 = 5x^5$ 또는 $6x^6$). | 넓이 모형과 곱셈의 순서 바꾸기로 계수끼리 곱함을 보이고 지수법칙을 다시 쓴다(S03, S04). |
| 음수 계수가 있는 단항식을 거듭제곱할 때 부호나 계수를 빠뜨린다($(-3a)^2 = -9a^2$). | 괄호 안의 식을 지수만큼 곱셈식으로 풀어 쓴다(S05, S07). |
| 나눗셈에서 계수만 나누고 문자는 약분하지 않는다($12a^3 \div 4a = 3a^3$). | 분수 꼴로 써서 계수와 문자를 따로 약분한다(S08). |
| 곱셈·나눗셈이 섞인 식에서 뒤의 곱셈을 먼저 묶는다($6x^2 \div 2x \times 3x = 1$). | ÷를 역수의 곱셈으로 바꾸고 x = 1을 넣어 값을 비교한다(S10, S12). |
| 분수 꼴 단항식으로 나눌 때 역수를 일부만 바꾼다(÷ 2분의 3a를 × 3분의 2 × a로). | 나누는 식 전체를 괄호로 묶고 분자와 분모를 통째로 바꾼다(S09, S13 ⑤). |

**오늘 다루지 않는 것** 계수가 정수나 간단한 분수인 단항식끼리의 곱셈·나눗셈, 괄호 밖에 지수가 있는 단항식, 곱셈·나눗셈이 섞인 세 단항식의 계산, 간단히 한 뒤 식의 값 구하기를 다룬다. 다항식이 들어 있는 곱셈·나눗셈('단항식과 다항식의 곱셈·나눗셈'), 덧셈·뺄셈이 섞인 식, 문자가 셋 이상이거나 단항식이 넷 이상인 복잡한 식은 다루지 않는다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(지수법칙, 역수) | 약 3분 | — |
| S03 | 넓이로 보는 단항식의 곱셈 | 약 3분 | A |
| S04 | 부호와 지수가 있는 단항식의 곱셈(시범) | 약 3분 | A |
| S05 | 거듭제곱이 있는 단항식의 곱셈(시범) | 약 2분 | A |
| S06 | 안내받는 연습(단항식의 곱셈) | 약 3분 | A |
| S07 | 오개념 비교(거듭제곱의 부호) | 약 2분 | A |
| S08 | 단항식의 나눗셈(분수 꼴, 시범) | 약 2분 | B |
| S09 | 나누는 식이 분수 꼴일 때(역수의 곱셈, 시범) | 약 2분 | B |
| S10 | 곱셈과 나눗셈이 섞인 식(시범) | 약 3분 | B |
| S11 | 안내받는 연습(단항식의 나눗셈, 섞인 계산) | 약 4분 | B |
| S12 | 오개념 비교(× 뒤를 먼저 계산) | 약 2분 | B |
| S13 | 혼자 해결 | 약 4분 | A, B |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S14 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B |
| S15 | 마무리 확인(처음 보는 문제) | 약 2분 | A, B |
| S16 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B |
| S17 | 선수 학습 보충(역수, 거듭제곱, 지수법칙) | 약 5분 | — |

# 장별 안내




**S01 단항식의 곱셈과 나눗셈** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

직사각형의 넓이를 식으로 나타내는 상황으로 단항식끼리의 곱셈이 필요함을 보여 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “가로가 3a, 세로가 2b인 직사각형이야. 넓이를 식으로 쓰면?”
- “3a × 2b를 더 간단히 쓸 수 있을까?”

**예상 답**


- “3a × 2b요.” “6ab요.” “5ab요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

**막히면**

- a = 1, b = 1이면 가로 3, 세로 2인 직사각형의 넓이(6)를 먼저 구해 봅니다.

**주의**

- 답은 6ab입니다. S03에서 작은 칸으로 나눠 확인합니다.
- 단항식은 수와 문자의 곱으로만 된 식(항이 하나인 식)입니다(중1 ‘일차식과 수의 곱셈·나눗셈’에서 배운 말).
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.




**S02 지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(지수법칙, 역수) · 약 3분

지수법칙(곱셈·나눗셈·곱의 거듭제곱)과 역수를 곱해 나누는 방법을 확인합니다. 오늘 계수와 문자를 따로 계산할 때 모두 씁니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①은 지수를 더할까, 뺄까? ②는?”
- “③은 −2와 a 모두 제곱해야 해.”
- “④는 나누는 수의 역수를 곱해. −(3분의 2)의 역수는?”

**정답**


- ① $a^8$
- ② $x^4$
- ③ $4a^2$
- ④ −9 (6 × (−2분의 3))

**막히면**

- ①②③이 흔들리면 S17(보충)과 앞 차시 ‘지수법칙 2’를 다시 봅니다. ④가 흔들리면 S17에서 역수를 다시 보고, 그래도 어려우면 중1 ‘정수와 유리수의 나눗셈’을 먼저 다시 합니다.

**주의**

- 역수: 곱해서 1이 되는 수입니다. 부호는 그대로 두고 분자와 분모를 바꿉니다.




S03 **계수끼리, 문자끼리 곱해요** · 넓이로 보는 단항식의 곱셈 · 약 3분

직사각형을 넓이가 ab인 칸으로 나누어 3a × 2b = 6ab임을 보고, 곱셈의 순서를 바꿔 계수끼리, 문자끼리 곱하면 됨을 압니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “가로 3a는 a가 3개, 세로 2b는 b가 2개야. 작은 칸 하나의 넓이는?”
- “작은 칸이 모두 몇 개야? 그럼 전체 넓이는?”
- “3a × 2b = 3 × a × 2 × b야. 곱하는 순서를 바꿔 수끼리, 문자끼리 모으면?”

### 예상 답


- “ab요.” “6개라서 6ab요.” “3 × 2 × a × b = 6ab요.”

### 막히면

- a = 2, b = 1처럼 수를 넣어 칸을 세어 봅니다: 가로 6, 세로 2, 넓이 12 = 6 × 2 × 1.

### 주의

- 계수: 문자 앞에 곱해진 수입니다(3a의 계수 3). 계수끼리 더해 5ab로 쓰는 실수가 있습니다(M1).
- 곱셈은 순서를 바꾸거나 묶어서 계산해도 결과가 같습니다(교환법칙·결합법칙).




S04 **단항식의 곱셈** · 부호와 지수가 있는 단항식의 곱셈(시범) · 약 3분

부호가 있는 계수와 거듭제곱이 있는 문자를 따로 곱해 합쳐 쓰는 순서를 보여 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “계수는 무엇무엇이야? 곱하면?”
- “$a^2 \times a^3$은 지난 시간에 배운 대로 하면? b는 하나뿐이니까 그대로 써.”

### 예상 답


- “−3과 4, 곱하면 −12요.” “$a^5$이요.”

### 막히면

- 색연필로 계수에는 동그라미, 문자에는 밑줄을 쳐서 나눠 보게 합니다.

### 주의

- 답은 부호 → 계수 → 문자(알파벳 순서) 순서로 씁니다: $-12a^5b$.




S05 **거듭제곱이 있으면 먼저** · 거듭제곱이 있는 단항식의 곱셈(시범) · 약 2분

괄호 밖에 지수가 있는 단항식은 곱의 거듭제곱을 먼저 계산한 뒤 곱한다는 순서를 보여 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "$(-2x)^2$을 먼저 계산하면?"
- "그다음 $4x^2 \times 3x^3$은?"

**예상 답**


- "$4x^2$이요." "$12x^5$이요."

**막히면**

- $(-2x)^2 = (-2x) \times (-2x)$로 풀어 씁니다.

**주의**

- $(-2x)^2$을 $-4x^2$으로 쓰면 부호 실수입니다(M2). 다음 연습과 S07에서 다룹니다.




S06 **단항식끼리 곱해요** · 안내받는 연습(단항식의 곱셈) · 약 3분

도움을 받으며 부호·분수 계수·거듭제곱이 있는 단항식의 곱셈을 합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "계수끼리 먼저 곱해 볼래? 부호는?"
- "⑤⑥은 거듭제곱을 먼저 계산해."

**정답**


- ① $10ab$
- ② $-12x^3$
- ③ $-6a^3b$
- ④ $4x^2y$
- ⑤ $18a^3$
- ⑥ $-x^4y^6$

**막히면**

- 계수와 문자를 나누어 두 줄로 계산하게 합니다(S04처럼).

**주의**

- ③의 $-a$는 $(-1) \times a$입니다. 계수는 $6 \times (-1) = -6$.
- ④의 2분의 x는 2분의 $1 \times x$입니다. 2분의 $1 \times 8 = 4$, $x \times x \times y = x^2y$입니다.
- ⑥은 $(xy^2)^3 = x^3y^6$, $x^3y^6 \times (-x) = -x^4y^6$입니다.




S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(거듭제곱의 부호) · 약 2분

음수 계수가 있는 단항식을 거듭제곱할 때 부호를 그대로 두는 실수(M2)를 풀어 쓰기로 반박합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “$(-3a) \times (-3a)$에서 음수를 몇 번 곱했어? 부호는?”
- “$a = 1$을 넣으면 $(-3)^2 \times 2$는 얼마야?”

### 예상 답

- “두 번이라 +예요. $9a^2$이에요.” “18이에요. 곰이 맞아요.”

### 정답


- 곰이 맞습니다. $(-3a)^2 = 9a^2$, $9a^2 \times 2a = 18a^3$
- $a = 1$일 때 $(-3)^2 \times 2 = 18$

### 막히면

- 중1 ‘정수와 유리수의 혼합 계산’에서 배운 $(-3)^2 = 9$를 떠올리게 합니다.

### 주의

- 지치면 S07 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.




S08 **나눗셈은 분수 꼴로** · 단항식의 나눗셈(분수 꼴, 시범) · 약 2분

단항식의 나눗셈을 분수 꼴로 써서 계수끼리, 같은 문자끼리 약분하는 방법을 보여 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “$\div 4a$는 $4a$를 분모에 쓰는 거야. 12와 4를 약분하면?”
- “$a^3 \div a$는 지수법칙으로?”

### 예상 답


- “3이요.” “$a^2$이요. 그래서 $3a^2$이에요.”

### 막히면

- 분수를 크게 쓰고 $12 \div 4$, $a^3 \div a$를 따로 계산하게 합니다.

### 주의

- 계수만 나누고 문자를 그대로 두는 실수($3a^3$)가 있습니다(M3).
- $12a^3 \div 4 \times a$처럼 $4a$를 떼어 쓰지 않습니다. $4a$는 한 덩어리($4 \times a$)이므로 통째로 분모에 씁니다.




S09 **역수를 곱해요** · 나누는 식이 분수 꼴일 때(역수의 곱셈, 시범) · 약 2분

나누는 단항식이 분수 꼴이면 역수를 곱하는 곱셈으로 바꾸어 계산하는 방법을 보여 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “2분의 3a의 역수는? 분자와 분모를 바꾸면?”
- “$6a^2b \times 2$를 3a로 나누면?”

### 예상 답


- “3a분의 2요.” “$12a^2b \div 3a = 4ab$요.”

### 막히면

- 수로 먼저 해 봅니다: 6 ÷ 2분의 3 = 6 × 3분의 2 = 4.

### 주의

- 2분의 3a의 역수를 2분의 3 × a처럼 일부만 바꾸는 실수가 있습니다(M5). 3a 전체가 분모로 내려갑니다.
- 역수는 중1 ‘정수와 유리수의 나눗셈’에서 배웠습니다.




S10 **곱셈과 나눗셈이 섞이면** · 곱셈과 나눗셈이 섞인 식(시범) · 약 3분

곱셈과 나눗셈이 섞인 식은 앞에서부터 계산하거나 ÷를 역수의 곱셈으로 바꾸어 한 번에 계산함을 보여 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “÷ 2x를 곱셈으로 바꾸면 무엇을 곱하는 거지?”
- “이제 모두 곱셈이니까 분수 하나로 써서 약분해 볼래?”
- “앞에서부터 $6x^2 \div 2x$를 먼저 하고 3x를 곱해도 같은지 확인해 봐.”

### 예상 답


- “2x분의 1이요.” “$18x^3 \div 2x = 9x^2$이요.” “$3x \times 3x = 9x^2$로 같아요.”

### 막히면

- x = 1을 넣어 6 ÷ 2 × 3 = 9를 먼저 계산해 보게 합니다.

### 주의

- 핵심: 곱셈과 나눗셈만 있는 식은 앞에서부터 차례로 계산합니다. 2x × 3x를 먼저 계산하면 $6x^2 \div 6x^2 = 1$이 되어 틀립니다(M4). 다음 장(S12)에서 다룹니다.




**S11 나누고, 섞인 계산을 해요** · 안내받는 연습(단항식의 나눗셈, 섞인 계산) · 약 4분

도움을 받으며 단항식의 나눗셈과 곱셈·나눗셈이 섞인 계산을 합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “①②③은 분수 꼴로 써서 약분해 봐.”
- “④는 나누는 식이 분수 꼴이야. 역수는?”
- “⑤⑥은 앞에서부터, 또는 ÷를 역수의 곱셈으로 바꿔서.”

### 정답

- ① $3b$
- ② $-3x^2$
- ③ $-4a$
- ④ $6x^2$
- ⑤ $2b$
- ⑥ $-2x^2$

### 막히면

- 계수와 문자를 나누어 계산하고, 부호는 음수의 개수로 먼저 정하게 합니다.

### 주의

- ③은 음수가 하나라서 답이 음수입니다: $-4a$.
- ④는 $4x^3$ × 2x분의 3 = $6x^2$입니다.
- ⑥은 $(-2x)^3 = -8x^3$을 먼저 계산하고, $-8x^3 \div 4x^2 = -2x$, $-2x \times x = -2x^2$입니다.




**S12 누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(× 뒤를 먼저 계산) · 약 2분

곱셈·나눗셈이 섞인 식에서 뒤의 곱셈을 먼저 묶는 실수(M4)를 값을 넣어 반박합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “x = 1이면 처음 식은 6 ÷ 2 × 3이야. 앞에서부터 계산하면?”
- “토끼의 답 1과 곰의 답 $9x^2$에 1을 넣으면?”

### 예상 답

- “9예요.” “토끼는 1, 곰은 9라서 곰이 맞아요.”

### 정답


- 곰이 맞습니다. $6x^2 \div 2x \times 3x = 3x \times 3x = 9x^2$
- x = 1일 때 6 ÷ 2 × 3 = 9

### 막히면

- ÷ 2x를 × 2x분의 1로 바꿔 쓰면 2x가 분모에만 들어간다는 것을 보여 줍니다.

### 주의

- 곱셈과 나눗셈만 있으면 앞에서부터 계산합니다. 헷갈리면 ÷를 모두 역수의 곱셈으로 바꾸는 것이 가장 안전합니다.




S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 단항식의 곱셈(A)과 나눗셈·섞인 계산(B)을 하는지 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ⑥번을 어떻게 했는지 설명해 줘.”

**정답**

- ① $-15xy$
- ② $-8a^7$
- ③ $5x^3$
- ④ $-3a$
- ⑤ $4xy$
- ⑥ $2a$

**막히면**

- 바로 알려 주지 말고 “계수끼리 먼저 해 볼래?” “÷를 곱셈으로 바꾸면?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

**주의**

- ①②가 맞으면 목표 A, ③~⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 함께 합니다.




S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 부호, 약분, 역수의 실수를 바로잡습니다.

수업용에만 있는 장입니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “네 답과 같은지 볼까? ⑥은 x 대신 a = 1, b = 1을 넣어 확인해 볼래?”

**정답**

- ① $-15xy$ ② $-8a^7$ ③ $5x^3$ ④ $-3a$ ⑤ $4xy$ ⑥ $2a$

**막히면**

- ①②가 틀리면 S03~S05로, ③~⑥이 틀리면 S08~S10으로 돌아갑니다.

**주의**

- ⑥은 $4a^2 \times 3b = 12a^2b$, $12a^2b \div 6ab = 2a$입니다. a = 1, b = 1이면 4 × 3 ÷ 6 = 2로 확인됩니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.




**S15 마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제에서 곱셈과 나눗셈의 관계를 쓰고, 식을 간단히 한 뒤 값을 구하는지 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “①은 넓이를 가로로 나누면 되겠지?”
- “②는 곱셈을 거꾸로 하면 돼.”
- “③은 먼저 식을 간단히 하고 나서 수를 넣어 봐.”

### 정답

- ① $12a^2b \div 3a = 4ab$
- ② $8x^3y \div 2x = 4x^2y$
- ③ 간단히 하면 $-3x^2y$, $x = 2$, $y = -1$을 넣으면 $-3 \times 4 \times (-1) = 12$

### 막히면

- ①②는 수로 먼저 생각합니다: 넓이 12, 가로 3이면 세로 4.

### 주의

- ③을 처음 식에 바로 넣어도 $6 \times 8 \times 1 \div 4 = 12$로 같습니다. 간단히 한 뒤 넣으면 계산이 짧아진다는 것을 느끼게 합니다.
- 음수는 괄호에 넣어 대입합니다(중1 ‘문자의 사용과 식의 값’).




**S16 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “단항식을 곱할 때와 나눌 때 어떻게 하는지 한 문장씩 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

### 예상 답

- “계수끼리, 문자끼리 곱해요.” “분수로 써서 약분하거나 역수를 곱해요.”

### 정답


- ① $12a^3$
- ② $5x^2$
- ③ $5a^3b$

### 막히면

- S03과 S08을 다시 보여 줍니다.

### 주의

- 다음 차시 ‘다항식의 덧셈과 뺄셈’에서는 중1에서 배운 동류항 계산을 $x^2$이 있는 식(이차식)까지 넓힙니다.




S17 **보충: 역수와 지수법칙** · 선수 학습 보충(역수, 거듭제곱, 지수법칙) · 약 5분

S02가 흔들리면 역수를 곱해 나누는 방법, 곱의 거듭제곱, 지수법칙을 되살립니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “6 ÷ 2는 6에 2의 역수를 곱한 것과 같아. 2의 역수는?”
- “$(-2a)^2$을 풀어 써 볼래?”
- “$a^5 \div a^2$과 $a^3 \times a^5$은?”

**정답**

- 2의 역수 2분의 1, 6 × 2분의 1 = 3
- $(-2a)^2 = 4a^2$
- $a^3$, $a^8$

**막히면**

- 역수는 분자와 분모를 바꾼 수입니다. 2 = 1분의 2로 쓰고 바꿔 보게 합니다.

**주의**

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘지수법칙 2’, 중1 ‘정수와 유리수의 나눗셈’, ‘문자의 사용과 식의 값’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 20xy / $-14a^2b$ / $-3x^5$ / $-12a^2b$ |
| 2 | $3a^2$ / −3x / −2ab / 2x |
| 3 | ① 6a ($9a^2$ × 3a분의 2) ② $10x^2y$ ($8x^3y$ × 4x분의 5) |
| 4 | ① $6a^2$ ② 3y ③ −6ab |
| 5 | $15x^2y \div 5x = 3xy$ |
| 6 | ① $12a^3$ ② $5x^2$ ③ $5a^3b$ |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 지수법칙 흔들림(보충 S17) □ 역수 흔들림 □
S13 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 곱셈(①②)만 □ 나눗셈·섞인 계산(③~⑥)만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 계수를 더함·지수를 곱함(M1) □ 거듭제곱의 부호(M2) □ 문자를 약분하지 않음(M3) □ × 뒤를 먼저(M4) □ 역수를 잘못(M5) □

메모: _____