Testiranje bolnikov s hitrimi testi za ugotavljanje okužbe s Sars-Cov-2 v Splošni bolnišnici Izola

Testiramo vse odrasle bolnike, ki potrebujejo urgenten sprejem v Enoto intenzivne terapije (EIT) oz. Enoto intenzivne internistične terapije (EIIT), oz. pediatrične bolnike, ki potrebujejo urgentno premestitev v Ljubljano.

Vzorce za hitri molekularni (PCR) test pošljemo v mikrobiološki laboratorij v Kopru.

Pokliče se v mikrobiološki laboratorij v Kopru na tel: : **051 331 002** in se jih obvesti, da potrebujemo test, ki potrebuje prednostno obravnavo.

Delavnik: med tednom v dopoldanskem in popoldanskem času 07.00 - 20.00, med vikendom: sobota 07.00 - 13.00, nedelja 10.00 - 13.00 \*

\* Testiranje je včasih možno tudi izven navedenega urnika, če so na delovišču.

Po dogovoru z mikrobiološkim laboratorijem v Kopru se odvzame bris za hitri PCR test na COVID-19. V rednem delovnem času 7.00-14.00 se pokliče na **051 280 224** (Maks Vončina) in se dogovori za transport. Izven rednega delovnega časa se vzorec pošlje s transportom zunanjega izvajalca (Česnik: tel: **040 295 170**). V obeh primerih se pošlje pod NUJNO preko laboratorija SBI, kjer izvajalec transporta prevzame vzorce za transport.

Če je izvid negativen, se bolnika lahko premesti v EIT/EIIT. Če je izvid pozitiven, se bolnika premesti v COVID enoto.

Če hitri molekularni (PCR) test mikrobiološkem laboratoriju v Kopru **NI MOGOČ:** 

## 1. Simptomatski bolnik

Če ni mogoče opraviti hitrega PCR testa v mikrobiološkem laboratoriju v Kopru, se pri bolniku, ki ima simptome za okužbo s Sars-Cov-2 odvzame bris za hitri antigenski test, ki ga opravi laboratorij v naši ustanovi.

- 1. Če je izvid pozitiven, bolnika preusmerimo v COVID enoto.
- 2. Če je izvid negativen, se odvzame bris za hitri PCR test v naši ustanovi (za potrditev kliči predstojnika oddelka), do rezultat brisa se bolnika namesti v samostojno sobo v intenzivni terapiji oz. v sobo akutne hemodialize.

## 2. Asimptomatski bolnik

Če bolnik, ki potrebuje sprejem v EIT, nima simptomov za Sars-Cov-2 okužbo, se odvzame hitri antigenski test, ki ga opravi laboratorij v naši ustanovi.

- 1. Če je izvid negativen, se odvzame bris za redni PCR test, ki se ga pošlje v mikrobiološki laboratorij v Koper. Bolnika se sprejme v EIT/EIIT.
- 2. Če je izvid pozitiven, se odvzame bris za hitri PCR test v naši ustanovi (za potrditev kliči predstojnika oddelka), do rezultat brisa se bolnika namesti v samostojno sobo v intenzivni terapiji oz. v sobo akutne hemodialize.