

Rozpis testování

U všech alergenů platí, že ačkoliv poslední den je možné v příkrmech podat neomezenou dávku, zároveň stačí podat obvykle opět stejné množství jako druhý den.

1) Luštěniny

	Já	Dcera
1. den	50 g červené čočka	
2. den	50 g jakékoliv luštěniny	1 lžička červené čočky
3. den	Neomezeně	2–3 lžičky červené čočky
4. den	Neomezeně	neomezeně

U luštěnin se reakce projeví zpravidla až třetí den.

2) Kořenová zelenina

	Já	Dcera
1. den	1 střední mrkev	
2. den	neomezeně, ale min. 100 g mrkve, celeru, petržele může být i ve formě vývaru	1–2 lžičky mrkve
3. den		5–7 lžiček mrkve
4. den		neomezeně

Mrkev při testování může být syrová či vařená. Řapíkatý celer není kořenová zelenina, při dietě jsem jej mohla jíst i před testováním kořenové zeleniny.

3) Rajčata a papriky

	Já	Dcera
1. den	neomezeně rajčata (či papriky), minimum je 5 malých rajčátek.	
2. den		½ malého rajčátka
3. den		½ malého rajčátka
4. den		neomezeně

I čtvrtý den v příkrmu postačuje malá dávka rajčátka k otestování alergenu.

Houby - poté, co projdou rajčata a luštěniny, obvykle prochází i houby. Já je cca od této doby občas jedla.

4) Exotické ovoce

	Já	Dcera
1. den	1–2 banány	
2. den	1 kiwi	1–2 lžičky banánu
3. den	jakékoliv exotické ovoce v neomezené dávce	½ banánu
4. den		1 banán + 1 lžička kiwi

5) Citrusy

	Já	Dcera
1. den	1 mandarinka nebo ½ pomeranče	
2. den	3 mandarinky nebo 1 pomeranč	1–2 dílky mandarinky
3. den	citrusy neomezeně, lze i džus	3–4 i dílky mandarinky
4. den		neomezeně

Citrusy v příkrmu lze otestovat i džusem (100% džus z mandarinek či pomerančů) v přepočtu 1 dílek mandarinky = 1 lžička džusu.

6) Pšenice

	Dcera
1. den	1–2 kousky těstovin nebo 1 sousto rohlíku
2. den	2–4 kousky těstovin nebo 2 sousta rohlíku
3. den	neomezeně

Lepek se testuje pouze u dětí – já ho měla povolený v neomezeném množství od samého začátku (viz kapitola Lepek). U dcery u nás lepek sice prošel, i tak jsme měli doporučeno ho podávat z počátku pouze 2–3x týdně a dávku postupně navyšovat.

7) Oves

	Dcera
1. den	2–3 lžičky ovesné kaše
2. den	5-10 lžiček ovesné kaše
3. den	neomezeně

Taktéž oves se testuje pouze u dětí a já ho mohla jíst od začátku v neomezeném množství.

8) Vejce a kuřecí maso

	Já	Dcera
1. den	vejce i kuřecí maso neomezeně	
2. den		½ lžičky žloutku či 1 lžička kuřecího
3. den		½ žloutku či 2–3 lžičky kuřecího
4. den		celý žloutek

Vejce u nás neprošla vůbec, ani přes mě. I tak jsem dostala doporučení jíst je minimálně jednou týdně v zapečené formě. Maximum pak bylo 2-4x.

9) Ryby

	Já	Dcera
1. den	min. 80 g lososa či pstruha	
2. den	tuňák/kapr/pstruh/losos	1 lžička lososa/pstruha/tuňáka
3. den	min. 150 g sardinky/treska/tuňák	2-3 lžičky lososa/pstruha/tuňáka
4. den	neomezeně vše	neomezeně

Ryby jsem během testu mohla jíst v neomezeném množství, měla jsem jen dané druhy ryb a minimální množství, které jsem musela za den sníst. Bylo možné jíst ryby jak čerstvé (tedy tepelně zpracované), tak z plechovky.

Ryby u nás prošly a měly zázračný účinek. Kdykoliv po otestování všech alergenů se dcerce objevila nějaká vyrážka – třeba v důsledku stresu – tak po sněžení jedné malé porce ryb napřímo zase zmizela. Zjistili jsme to paradoxně díky štědrovečerní večeři a následnému focení. ☺ Byla to taková „naše“ potravina, kterou jsme ekzém dohájili úplně do ztracena .

10) BKM (bílkovina kravského mléka)

	Já	Dcera
1.den	máslo neomezeně	
2. den	zakysané, min. 1 jogurt	1 lžička jogurtu/Lučiny/tvrdého sýra
3. den	zakysané, min. 1 jogurt	2 lžičky jogurtu/Lučiny/tvrdého sýra
4. den	nezakysané mléčné výrobky	½ jogurtu/20 g Lučiny
5. den	nezakysané mléčné výrobky	1 jogurt

Test BKM je trochu komplikovanější a trvá o den déle než ostatní testy. Já mohla vždy daný druh (tedy máslo, zakysané mléčné výrobky či nezakysané mléčné výrobky) v neomezené formě.

Je možné, že projde pouze máslo a ostatní již ne, nebo je také možné, že projdou pouze zakysané mléčné výrobky a ostatní ne. Ty, co projdou, můžete pak jíst v neomezeném množství.

Neprojde-li BKM, doporučuji nechat po ní 2 – 3 dny klidového režimu (tedy dní, kdy nebudete testovat žádný další alergen), BKM odchází z těla pozvolna.

Mezi zakysané mléčné výrobky patří jogurty, tvrdé sýry, Lučina, kefír, podmásli, cottage. **Nezakysané jsou** mléko, tvaroh, Lipánek a jemu podobné výrobky, smetana, mozzarella.

Alergie na BKM může být rychlá a nebo může mít kumulativní efekt – po prvních dnech se projevuje pouze plíživě a pozvolna, ale čím déle by dítě BKM přijímalo (ať už napřímo či přes kojení), tím horší by byly reakce.

BKM u nás neprošla, měla jsem ji v rámci „tréninku“ povolenou jednou až dvakrát týdně v zapečené formě a jednou až dvakrát týdně ve formě zakysaných mléčných výrobků.

Dcera napřímo začala BKM tolerovat nejdříve také v zapečené formě.

11) Maliny, rybíz a ostružiny

	Já	Dcera
1. den	maliny po 4 dny v neomezeném množství	
2. den		2 maliny
3. den		3–5 malin
4. den		neomezeně

Namísto malin lze jíst i malinovou přesnídávku (v poměru 1 malina = 1 lžička přesnídávky).

Projdou-li maliny, prochází i rybíz a ostružiny a naopak. I pokud toto ovoce projde, není doporučeno podávat maliny každý den, jelikož obsahují histamin, který ekzém zhoršuje (histamin není alergen sám o sobě a záleží u něj na množství – v malých dávkách je OK, ve větších dělá problémy).

12) Jahody

	Já	Dcera
1. den	jahody po 4 dny v neomezeném množství	
2. den		½ jahody
3. den		1 jahoda
4. den		neomezeně

Místo jahod lze podat i jahodovou přesnídávku v poměru ½ jahody = 1–2 lžičky přesnídávky. Platí zde to, co o malinách – pozor na histamin, jahody jej také obsahují.

13) Semínka a mák

	Já
1. den	1 polévková lžíce semínek (chia/sezamových/slunečnicových)
2. den	semínka neomezeně
3. den	1 kousek makovce/1 polévková lžíce máku či makového mléka
4. den	makovec neomezeně

Test semínek a máku jsme prováděli jen přes mateřské mléko. Dýňová a lněná semínka nejsou alergeny. Recept na makovec najdete na [str. 119](#).

14) Soja

	Já	Dcera
1. den	50 ml sojového mléka	
2. den	100–150 ml sojového mléka	1–2 lžičky sojového mléka
3. den	neomezeně	4–6 lžiček sojového mléka
4. den	neomezeně	neomezeně

Přestože jsem si říkala, že soju k životu nepotřebuji, byla jsem překvapená, v kolika druzích pečiva je obsažena. Často se týká pečiva rozmraženého a rozpečeného v obchodě. A v neposlední řadě je soja v sojové omáčce, která zase často bývá přísadou mnoha dalších jídel, obzvláště v restauraci.

15) Ořechy

	Já	Dcera
1. den	1 hrst mandlí	
2. den	1 hrst kešu/vlašských	
3. den	1 hrst lískových oříšků	½ lžičky drcených mandlí
4. den	neomezeně	2–5 lžiček drcených mandlí

Místo drcených mandlí je možné podat i mandlové mléko a to 3. den jednu lžici a 4. den 2–5 lžic. K tomuto testu jsme se dostaly v dcerčiných 11 měsících.

18) Med

	Já	Dcera
1. den	neomezeně	
2. den		½ lžičky medu
3. den		½ lžičky medu
4. den		1 lžička medu
5. den		neomezeně, stačí opět 1 lžička

U medu se reakce projevuje zpožděně, testuje se proto 5 dní.

19) Koření

	Já	Dcera
1. den	koření neomezeně – kari, kurkuma, sladká paprika, pepř... ideálně vystřídat více druhů koření	
2. den		špetka sladké papriky/kari/kurkumy
3. den		špetka sladké papriky/kari/kurkumy

V příkrmech se doporučuji vyhnout prozatím pepři – je to nejsilnější alergen z koření. Jinak i koření jsme testovali jako celek. Některé koření však můžete v malých dávkách již od začátku:

Zelené bylinky patří mezi zelenou zeleninu a je vhodné jíst je při eliminační dietě již od začátku. Radíme mezi ně bazalku, oregano, majoránku, libeček i další.

Mezi slabší alergen patří bobkový list, skořice, sladká paprika, zázvor a hřebíček. „Špetku“ jsem si čas od času dala do jídla i před testem koření.

Mezi silnější alergen se řadí kari, kurkuma a muškátový oříšek.

Ty nejsilnější pak jsou pepř, pálivá paprika, nové koření a chilli – tyto doporučuji vynechat minimálně do testu koření a i po něm, pokud koření projde, používat střídavě. Pozor na jídla v restauracích, často bývají kořeněná právě pepřem, u nás to byla téměř vždy příčina zhoršení ekzému.

Neprojde-li koření, nechte po něm dva dny klidového režimu, z těla odchází pomalu.

Ořechy jsou silný alergen – test ořechů napřímo doporučuji pouze v případě, kdy si jste jisti, že přes mateřské mléko ořechy prošly. V případě pochybností test napřímo raději vynechejte a otestujte znovu nejprve přes mateřské mléko po nějaké době.

Na druhou stranu, je-li zřejmé, že ořechy prošly přes mateřské mléko, je dobré podat je alespoň ve stopovém množství i napřímo – stopy ořechů bývají v mnoha výrobcích a je proto vhodné znát případnou reakci na ně.

16) Hovězí maso

	Já	Dcera
1. den	po 4 dny hovězí maso v neomezené dávce	
2. den		1–2 lžičky hovězího masa
3. den		2–6 lžiček hovězího masa
4. den		neomezeně

Hovězí maso je možné testovat i na vývaru z hovězího masa, a to v příkrmu druhý den 20-30 ml vývaru a třetí den 40-90 ml vývaru.

17) Kakao

	Já	Dcera
1. den	2 kostičky hořké čokolády	
2. den	6 kostiček hořké čokolády	½ lžičky kakaa (do kaše)
3. den	neomezeně	1–1 ½ lžičky kakaa
4. den	neomezeně	neomezeně

Pozor, aby čokoláda neobsahovala mléko (někdy ho obsahuje i čokoláda na vaření). Ideálně doporučuji bio čokoládu, která obsahuje pouze kakaovou hmotu, kakaové máslo (nemá nic společného s klasickým máslem) a cukr, nic víc. Žádné lecitiny, rostlinné tuky, žádný palmový tuk. Takovou koupíte například v drogerii DM, navíc za celkem příznivou cenu.

Projde-li kakao, prochází i čokoláda, můžete tedy vesele mlsat. ☺ Tu výše uvedenou bio čokoládu si dávám bez výčitek (třeba do ranní kaše), protože až na cukr nic špatného neobsahuje.

20) Arašídý

	Já
1. den	1 lžička arašídů
2. den	1 polévková lžíce arašídů
3. den	2 polévkové lžíce arašídů
4. den	neomezeně

Arašídý jsme testovali pouze u mě.

21) Karob

Karob jsem jako jediný alergen testovala sama a řídila jsem se testem u kakaá.

Závěrem k testu alergenů

Máte-li podezření na reakci při testování alergenů již po 1. dni, kdy jste jej zatím nepodali v příkrmu, doporučuji druhý den opakovat stejné dávkování – tedy alergen podat zatím jen přes MM, ne v příkrmu. Dávkování při testování je možné také upravit (snížit množství, především to, kde je uvedeno „neomezeně od začátku“) podle individuálního pocitu a reakce dítěte.

My jsme tak testovali například citrusy, kdy první instrukce byla u mě „neomezeně“, ale protože jsme si nebyli jisti výsledkem, měla jsem upravené dávkování tak, jak jsem je uvedla do tabulky výše.

Všimněte si, že v příkrmech stačilo k otestování velmi, velmi malinké množství, sama jsem jím byla někdy překvapená. A to i v případech, kdy jsem já sama měla jíst alergen hned ze začátku neomezeně. Opravdu doporučuji první den testu u příkrmu podat jen takto malinké množství, na první setkání s alergenem to zcela postačuje a snížíte tím možnost případné velké a nepřiměřené reakce.

Pokud byste testovali alergenů rovnou napřímo (tj. pokud nekojíte), dala bych 1. den testu jen stopové množství, tedy něco jako olíznutí lžičky, na které se dřív alergen nacházel, nikdy ne více!