낙상위험도 평가지

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	강기형	생년월일(성별)	1943.12.15 (남)	본인부담률	기초 0%	
생활실	402	입소일	2024.08.21	- - - -	3등급	
작성일	2024.08.21	조사사유 ■ 1. 신규 □ 2. 재사정 □ 3. 상태변화				

구 분	4점	3점	2점	1점	점수
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	3
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		4
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	4
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		2
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	4
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		4
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4
합계점수					
※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)					

· 4점 이하: 낙상위험 낮음 · 5-10 점 : 낙상위험 높음

· 11점 이상: 낙상위험 아주 높음

비고

인지저하로 위험에 대한 인식이 없고 거동어려움으로 낙상위험이 높음.

유(金惠) 작성자명: 유순호

낙상위험도 평가지

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	강기형	생년월일(성별)	1943.12.15 (남)	본인부담률	기초 0%	
생활실	402	입소일	2024.08.21	디미	3등급	
작성일	2025.03.04	조사사유 □ 1. 신규 ■ 2. 재사정 □ 3. 상태변화				

구 분	4점	3점	2점	1점	점수
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	3
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		4
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	4
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		2
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	4
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		4
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4
합계점수					

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

· 4점 이하 : 낙상위험 낮음 · 5-10 점 : 낙상위험 높음

· 11점 이상: 낙상위험 아주 높음

비고

인지저하로 위험에 대한 인식이 없고 거동어려움으로 낙상위험이 높음.

작성자명: 권해숙

初新会

낙상위험도 평가지

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	강기형	생년월일(성별)	1943.12.15 (남)	본인부담률	기초 0%	
생활실	402	입소일	2024.08.21	디미	3등급	
작성일	2025.06.07	조사사유 □ 1. 신규 ■ 2. 재사정 □ 3. 상태변화				

구 분	4점	3점	2점	1점	점수
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	3
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		4
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	4
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		2
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	4
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		4
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4
합계점수					

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

· 4점 이하 : 낙상위험 낮음 · 5-10 점 : 낙상위험 높음

· 11점 이상: 낙상위험 아주 높음

비고

인지저하로 위험에 대한 인식이 없고 거동어려움으로 낙상위험이 높음.

작성자명: 권해숙

行列分