


## 욕창위험도 평가지

실버메디컬복지센터재가장기요양기관

수급자	김계선	생년월일(성별)	1929.10.27 (여)	본인부담률	일반 15%
인정번호	L1804085551	급여개시일	2020.09.09	등급	3등급
작성일	2022.08.26	조사사유	<input type="checkbox"/> 1.신규 <input checked="" type="checkbox"/> 2.재사정 <input type="checkbox"/> 3.상태변화		

구 분	척도	내용	점수
감각인지 정도	1.감각 완전 제한됨 (완전히 못 느낌)	의식수준이 떨어지거나 진정/안정제 복용/투여등 으로 통증 자극에 반응이 없다(통증자극에 대해 신음하거나 주먹을 쥔다거나 할 수 없음). 신체 대부분에서 통증을 느끼지 못한다.	
	2.감각 매우 제한됨	통증 자극에만 반응(신음하거나 불안정한 양상으로 통증이 있음을 나타냄) 또는 신체의 1/2 이상에 통증이나 불편감을 느끼지 못한다.	
	3.감각 약간 제한됨	말로 지시하면 반응하지만, 체위 변경을 해달라고 하거나 불편하다고 항상 말할 수 있는 것은 아니다. 또는 사지에 통증이나 불편감을 느끼지 못한다.	
	4.감각 손상 없음	말로 지시하면 반응을 보이며 통증이나 불편감을 느끼고 말로 표현할 수 있다.	4
습기여부	1.항상 젖어 있음	피부가 땀, 소변으로 항상 축축하다.	
	2.자주 젖어 있음	늘 축축한 것은 아니지만 자주 축축해져 8시간에 한번은 린넨을 갈아주어야 한다.	
	3.가끔 젖어 있음	가끔 축축하다. 하루에 한번 정도 린넨 교환이 필요하다.	
	4.거의 젖어있지 않음	피부는 보통 건조하며 린넨은 평상시대로만 교환 해 주면 된다.	4
활동상태	1.항상 침대에만 누워 있음	도움 없이는 몸은 물론 손, 발을 조금도 움직이지 못한다.	
	2.의자에 앉아 있을 수 있음	걸을 수 없거나 걷는 능력이 상당히 제한되어 있다. 체중 부하를 할 수 없어 의자나 휠체어로 이동시 도움을 필요로 한다.	
	3.가끔 걸을 수 있음	낮 동안에 도움을 받거나 도움 없이 매우 짧은 거 리를 걸을 수 있다. 그러나 대부분의 시간은 침상 이나 의자에서 보낸다.	
	4.자주 걸을 수 있음	적어도 하루에 두 번 방밖을 걷고, 방안은 적어도 2시간 마다 걷는다.	4
움직임	1.완전히 못 움직임(스스로 움직일 수 없음)	도움 없이는 신체나 사지를 전혀 움직이지 못한다.	
	2.매우 제한됨	신체나 사지의 체위를 가끔 조금 변경시킬 수 있지 만 자주하거나 많이 변경시키지 못한다.	
	3.약간 제한됨	조금이기는 하지만 혼자서 신체나 사지의 체위를 자주 변경시킨다.	
	4.제한 없음	도움 없이도 체위를 자주 변경시킨다.	4


영양상태	1.매우나쁨	제공된 음식의 1/3 이하를 섭취한다. 단백질(고기 나 유제품)을 하루에 2회 섭취량 이하를 먹는다. 수분을 잘 섭취 안한다. 유동성 영양보충액도 섭취 하지 않는다. 또는 5일 이상 동안 금식상태이거나 유동식으로 유지한다.	
	2.부족함	제공된 음식의 1/2를 먹는다. 단백질(고기나 유제 품)은 하루에 약 3회 섭취량을 먹는다. 가끔 영양보 충 식이를 섭취한다. 또는 유동식이나 위관영양을 적정량 미만으로 투여 받는다.	
	3.적당함	식사의 반 이상을 먹는다. 단백질(고기나 유제 품) 을 하루에 4회 섭취량을 먹는다. 가끔 식사를 거부 하지만 보통 영양보충식이는 섭취한다. 또는 위관 영양이나 TPN으로 대부분의 영양요구량이 충족 된다.	3
	4.양호함	대부분의 식사를 섭취하며 절대 거절하는 일이 없 다. 단백질(고기나 유제품)을 하루에 4회 섭취량 이 상을 먹으며 가끔 식간에도 먹는다. 영양보충 식이 는 필요로 되지 않는다.	
마찰력과 응전력	1.문제 있음	움직이는데 중정도 이상의 많은 도움을 필요로 한 다. 린넨으로 끌어당기지 않고 완전히 들어 올리는 것은 불가능하다. 자주 침대나 의자에서 미끄러져 내려가 다시 제 위치로 옮기는데 많은 도움이 필요 된다. 관절구축이나 강직, 움직임 등으로 항상 마찰 이 생긴다.	
	2.잠정적으로 문제있음	자유로이 움직이나 약간의 도움을 필요로 한다. 움 직이는 동안 의자억제대나 린넨 또는 다른 장비에 의해 마찰이 생길 수 있다. 의자나 침대에서 대부분 좋은 체위를 유지하고 있지만 가끔은 미끄러져 내려온다.	
	3.문제없음	침대나 의자에서 자유로이 움직이며 움직일 때 스스로 자신을 들어 올릴 수 있을 정도로 충분한 근력이 있다. 침대나 의자에 누워 있을 때 항상 좋은 체위를 유지한다.	3
합계점수			22
※ 해석 : (Braden , 2001) · 19~23 위험 없음                      · 15~18 약간의 위험 있음 · 13~14 중간 정도의 위험 있음      · 10~12 위험이 높음 · 9 이하 위험이 매우 높음			
비고			
작성자명 : 최은숙 			

## 욕창위험도 평가지

실버메디컬복지센터재가장기요양기관

수급자	김계선	생년월일(성별)	1929.10.27 (여)	본인부담률	일반 15%
인정번호	L1804085551	급여개시일	2020.09.09	등급	3등급
작성일	2022.11.24	조사사유	<input type="checkbox"/> 1.신규 <input checked="" type="checkbox"/> 2.재사정 <input type="checkbox"/> 3.상태변화		

구 분	척도	내용	점수
감각인지 정도	1.감각 완전 제한됨 (완전히 못 느낌)	의식수준이 떨어지거나 진정/안정제 복용/투여등 으로 통증 자극에 반응이 없다(통증자극에 대해 신음하거나 주먹을 쥐다거나 할 수 없음). 신체 대부분에서 통증을 느끼지 못한다.	
	2.감각 매우 제한됨	통증 자극에만 반응(신음하거나 불안정한 양상으로 통증이 있음을 나타냄) 또는 신체의 1/2 이상에 통증이나 불편감을 느끼지 못한다.	
	3.감각 약간 제한됨	말로 지시하면 반응하지만, 체위 변경을 해달라고 하거나 불편하다고 항상 말할 수 있는 것은 아니다. 또는 사지에 통증이나 불편감을 느끼지 못한다.	
	4.감각 손상 없음	말로 지시하면 반응을 보이며 통증이나 불편감을 느끼고 말로 표현할 수 있다.	4
습기여부	1.항상 젖어 있음	피부가 땀, 소변으로 항상 축축하다.	
	2.자주 젖어 있음	늘 축축한 것은 아니지만 자주 축축해져 8시간에 한번은 린넨을 갈아주어야 한다.	
	3.가끔 젖어 있음	가끔 축축하다. 하루에 한번 정도 린넨 교환이 필요하다.	
	4.거의 젖어있지 않음	피부는 보통 건조하며 린넨은 평상시대로만 교환 해 주면 된다.	4
활동상태	1.항상 침대에만 누워 있음	도움 없이는 몸은 물론 손, 발을 조금도 움직이지 못한다.	
	2.의자에 앉아 있을 수 있음	걸을 수 없거나 걷는 능력이 상당히 제한되어 있다. 체중 부하를 할 수 없어 의자나 휠체어로 이동시 도움을 필요로 한다.	
	3.가끔 걸을 수 있음	낮 동안에 도움을 받거나 도움 없이 매우 짧은 거 리를 걸을 수 있다. 그러나 대부분의 시간은 침상 이나 의자에서 보낸다.	
	4.자주 걸을 수 있음	적어도 하루에 두 번 방밖을 걷고, 방안은 적어도 2시간 마다 걷는다.	4
움직임	1.완전히 못 움직임(스스로 움직일 수 없음)	도움 없이는 신체나 사지를 전혀 움직이지 못한다.	
	2.매우 제한됨	신체나 사지의 체위를 가끔 조금 변경시킬 수 있지 만 자주하거나 많이 변경시키지 못한다.	
	3.약간 제한됨	조금이기는 하지만 혼자서 신체나 사지의 체위를 자주 변경시킨다.	
	4.제한 없음	도움 없이도 체위를 자주 변경시킨다.	4


영양상태	1.매우나쁨	제공된 음식의 1/3 이하를 섭취한다. 단백질(고기 나 유제품)을 하루에 2회 섭취량 이하를 먹는다. 수분을 잘 섭취 안한다. 유동성 영양보충액도 섭취 하지 않는다. 또는 5일 이상 동안 금식상태이거나 유동식으로 유지한다.	
	2.부족함	제공된 음식의 1/2를 먹는다. 단백질(고기나 유제 품)은 하루에 약 3회 섭취량을 먹는다. 가끔 영양보 충 식이를 섭취한다. 또는 유동식이나 위관영양을 적정량 미만으로 투여 받는다.	
	3.적당함	식사의 반 이상을 먹는다. 단백질(고기나 유제 품) 을 하루에 4회 섭취량을 먹는다. 가끔 식사를 거부 하지만 보통 영양보충식이 는 섭취한다. 또는 위관 영양이나 TPN으로 대부분의 영양요구량이 충족 된다.	3
	4.양호함	대부분의 식사를 섭취하며 절대 거절하는 일이 없 다. 단백질(고기나 유제품)을 하루에 4회 섭취량 이 상을 먹으며 가끔 식간에도 먹는다. 영양보충 식이 는 필요로 되지 않는다.	
마찰력과 응전력	1.문제 있음	움직이는데 중정도 이상의 많은 도움을 필요로 한 다. 린넨으로 끌어당기지 않고 완전히 들어 올리는 것은 불가능하다. 자주 침대나 의자에서 미끄러져 내려가 다시 제 위치로 옮기는데 많은 도움이 필요 된다. 관절구축이나 강직, 움직임 등으로 항상 마찰 이 생긴다.	
	2.잠정적으로 문제있음	자유로이 움직이나 약간의 도움을 필요로 한다. 움 직이는 동안 의자억제대나 린넨 또는 다른 장비에 의해 마찰이 생길 수 있다. 의자나 침대에서 대부분 좋은 체위를 유지하고 있지만 가끔은 미끄러져 내려온다.	
	3.문제없음	침대나 의자에서 자유로이 움직이며 움직일 때 스스로 자신을 들어 올릴 수 있을 정도로 충분한 근력이 있다. 침대나 의자에 누워 있을 때 항상 좋은 체위를 유지한다.	3
합계점수			22
※ 해석 : (Braden , 2001) · 19~23 위험 없음                      · 15~18 약간의 위험 있음 · 13~14 중간 정도의 위험 있음        · 10~12 위험이 높음 · 9 이하 위험이 매우 높음			
비고			
<div style="text-align: right;">             작성자명 : 이선영           </div>			

## 욕창위험도 평가지

실버메디컬복지센터재가장기요양기관

수급자	김계선	생년월일(성별)	1929.10.27 (여)	본인부담률	일반 15%
인정번호	L1804085551	급여개시일	2020.09.09	등급	3등급
작성일	2023.11.24	조사사유	<input type="checkbox"/> 1.신규 <input checked="" type="checkbox"/> 2.재사정 <input type="checkbox"/> 3.상태변화		

구 분	척도	내용	점수
감각인지 정도	1.감각 완전 제한됨 (완전히 못 느낌)	의식수준이 떨어지거나 진정/안정제 복용/투여등 으로 통증 자극에 반응이 없다(통증자극에 대해 신음하거나 주먹을 쥔다거나 할 수 없음). 신체 대부분에서 통증을 느끼지 못한다.	
	2.감각 매우 제한됨	통증 자극에만 반응(신음하거나 불안정한 양상으로 통증이 있음을 나타냄) 또는 신체의 1/2 이상에 통증이나 불편감을 느끼지 못한다.	
	3.감각 약간 제한됨	말로 지시하면 반응하지만, 체위 변경을 해달라고 하거나 불편하다고 항상 말할 수 있는 것은 아니다. 또는 사지에 통증이나 불편감을 느끼지 못한다.	
	4.감각 손상 없음	말로 지시하면 반응을 보이며 통증이나 불편감을 느끼고 말로 표현할 수 있다.	4
습기여부	1.항상 젖어 있음	피부가 땀, 소변으로 항상 축축하다.	
	2.자주 젖어 있음	늘 축축한 것은 아니지만 자주 축축해져 8시간에 한번은 린넨을 갈아주어야 한다.	
	3.가끔 젖어 있음	가끔 축축하다. 하루에 한번 정도 린넨 교환이 필요하다.	
	4.거의 젖어있지 않음	피부는 보통 건조하며 린넨은 평상시대로만 교환 해 주면 된다.	4
활동상태	1.항상 침대에만 누워 있음	도움 없이는 몸은 물론 손, 발을 조금도 움직이지 못한다.	
	2.의자에 앉아 있을 수 있음	걸을 수 없거나 걷는 능력이 상당히 제한되어 있다. 체중 부하를 할 수 없어 의자나 휠체어로 이동시 도움을 필요로 한다.	
	3.가끔 걸을 수 있음	낮 동안에 도움을 받거나 도움 없이 매우 짧은 거 리를 걸을 수 있다. 그러나 대부분의 시간은 침상 이나 의자에서 보낸다.	
	4.자주 걸을 수 있음	적어도 하루에 두 번 방밖을 걷고, 방안은 적어도 2시간 마다 걷는다.	4
움직임	1.완전히 못 움직임(스스로 움직일 수 없음)	도움 없이는 신체나 사지를 전혀 움직이지 못한다.	
	2.매우 제한됨	신체나 사지의 체위를 가끔 조금 변경시킬 수 있지 만 자주하거나 많이 변경시키지 못한다.	
	3.약간 제한됨	조금이기는 하지만 혼자서 신체나 사지의 체위를 자주 변경시킨다.	
	4.제한 없음	도움 없이도 체위를 자주 변경시킨다.	4


영양상태	1.매우나쁨	제공된 음식의 1/3 이하를 섭취한다. 단백질(고기 나 유제품)을 하루에 2회 섭취량 이하를 먹는다. 수분을 잘 섭취 안한다. 유동성 영양보충액도 섭취 하지 않는다. 또는 5일 이상 동안 금식상태이거나 유동식으로 유지한다.	
	2.부족함	제공된 음식의 1/2를 먹는다. 단백질(고기나 유제 품)은 하루에 약 3회 섭취량을 먹는다. 가끔 영양보 충 식이를 섭취한다. 또는 유동식이나 위관영양을 적정량 미만으로 투여 받는다.	
	3.적당함	식사의 반 이상을 먹는다. 단백질(고기나 유제 품) 을 하루에 4회 섭취량을 먹는다. 가끔 식사를 거부 하지만 보통 영양보충식이 는 섭취한다. 또는 위관 영양이나 TPN으로 대부분의 영양요구량이 충족 된다.	3
	4.양호함	대부분의 식사를 섭취하며 절대 거절하는 일이 없 다. 단백질(고기나 유제품)을 하루에 4회 섭취량 이 상을 먹으며 가끔 식간에도 먹는다. 영양보충 식이 는 필요로 되지 않는다.	
마찰력과 응전력	1.문제 있음	움직이는데 중정도 이상의 많은 도움을 필요로 한 다. 린넨으로 끌어당기지 않고 완전히 들어 올리는 것은 불가능하다. 자주 침대나 의자에서 미끄러져 내려가 다시 제 위치로 옮기는데 많은 도움이 필요 된다. 관절구축이나 강직, 움직임 등으로 항상 마찰 이 생긴다.	
	2.잠정적으로 문제있음	자유로이 움직이나 약간의 도움을 필요로 한다. 움 직이는 동안 의자억제대나 린넨 또는 다른 장비에 의해 마찰이 생길 수 있다. 의자나 침대에서 대부분 좋은 체위를 유지하고 있지만 가끔은 미끄러져 내려온다.	
	3.문제없음	침대나 의자에서 자유로이 움직이며 움직일 때 스스로 자신을 들어 올릴 수 있을 정도로 충분한 근력이 있다. 침대나 의자에 누워 있을 때 항상 좋은 체위를 유지한다.	3
합계점수			22
※ 해석 : (Braden , 2001) · 19~23 위험 없음                      · 15~18 약간의 위험 있음 · 13~14 중간 정도의 위험 있음        · 10~12 위험이 높음 · 9 이하 위험이 매우 높음			
비고			
<div style="text-align: right;">             작성자명 : 유명순              </div>			

## 욕창위험도 평가지

실버메디컬복지센터재가장기요양기관

수급자	김계선	생년월일(성별)	1929.10.27 (여)	본인부담률	일반 15%
인정번호	L1804085551	급여개시일	2020.09.09	등급	3등급
작성일	2024.06.03	조사사유	<input type="checkbox"/> 1.신규 <input checked="" type="checkbox"/> 2.재사정 <input type="checkbox"/> 3.상태변화		

구 분	척도	내용	점수
감각인지 정도	1.감각 완전 제한됨 (완전히 못 느낌)	의식수준이 떨어지거나 진정/안정제 복용/투여등 으로 통증 자극에 반응이 없다(통증자극에 대해 신음하거나 주먹을 쥔다거나 할 수 없음). 신체 대부분에서 통증을 느끼지 못한다.	
	2.감각 매우 제한됨	통증 자극에만 반응(신음하거나 불안정한 양상으로 통증이 있음을 나타냄) 또는 신체의 1/2 이상에 통증이나 불편감을 느끼지 못한다.	
	3.감각 약간 제한됨	말로 지시하면 반응하지만, 체위 변경을 해달라고 하거나 불편하다고 항상 말할 수 있는 것은 아니다. 또는 사지에 통증이나 불편감을 느끼지 못한다.	
	4.감각 손상 없음	말로 지시하면 반응을 보이며 통증이나 불편감을 느끼고 말로 표현할 수 있다.	4
습기여부	1.항상 젖어 있음	피부가 땀, 소변으로 항상 축축하다.	
	2.자주 젖어 있음	늘 축축한 것은 아니지만 자주 축축해져 8시간에 한번은 린넨을 갈아주어야 한다.	
	3.가끔 젖어 있음	가끔 축축하다. 하루에 한번 정도 린넨 교환이 필요하다.	
	4.거의 젖어있지 않음	피부는 보통 건조하며 린넨은 평상시대로만 교환 해 주면 된다.	4
활동상태	1.항상 침대에만 누워 있음	도움 없이는 몸은 물론 손, 발을 조금도 움직이지 못한다.	
	2.의자에 앉아 있을 수 있음	걸을 수 없거나 걷는 능력이 상당히 제한되어 있다. 체중 부하를 할 수 없어 의자나 휠체어로 이동시 도움을 필요로 한다.	
	3.가끔 걸을 수 있음	낮 동안에 도움을 받거나 도움 없이 매우 짧은 거 리를 걸을 수 있다. 그러나 대부분의 시간은 침상 이나 의자에서 보낸다.	
	4.자주 걸을 수 있음	적어도 하루에 두 번 방밖을 걷고, 방안은 적어도 2시간 마다 걷는다.	4
움직임	1.완전히 못 움직임(스스로 움직일 수 없음)	도움 없이는 신체나 사지를 전혀 움직이지 못한다.	
	2.매우 제한됨	신체나 사지의 체위를 가끔 조금 변경시킬 수 있지 만 자주하거나 많이 변경시키지 못한다.	
	3.약간 제한됨	조금이기는 하지만 혼자서 신체나 사지의 체위를 자주 변경시킨다.	
	4.제한 없음	도움 없이도 체위를 자주 변경시킨다.	4

영양상태	1.매우나쁨	제공된 음식의 1/3 이하를 섭취한다. 단백질(고기 나 유제품)을 하루에 2회 섭취량 이하를 먹는다. 수분을 잘 섭취 안한다. 유동성 영양보충액도 섭취 하지 않는다. 또는 5일 이상 동안 금식상태이거나 유동식으로 유지한다.	
	2.부족함	제공된 음식의 1/2를 먹는다. 단백질(고기나 유제 품)은 하루에 약 3회 섭취량을 먹는다. 가끔 영양보 충 식이를 섭취한다. 또는 유동식이나 위관영양을 적정량 미만으로 투여 받는다.	
	3.적당함	식사의 반 이상을 먹는다. 단백질(고기나 유제 품) 을 하루에 4회 섭취량을 먹는다. 가끔 식사를 거부 하지만 보통 영양보충식이 는 섭취한다. 또는 위관 영양이나 TPN으로 대부분의 영양요구량이 충족 된다.	3
	4.양호함	대부분의 식사를 섭취하며 절대 거절하는 일이 없 다. 단백질(고기나 유제품)을 하루에 4회 섭취량 이 상을 먹으며 가끔 식간에도 먹는다. 영양보충 식이 는 필요로 되지 않는다.	
마찰력과 응전력	1.문제 있음	움직이는데 중정도 이상의 많은 도움을 필요로 한 다. 린넨으로 끌어당기지 않고 완전히 들어 올리는 것은 불가능하다. 자주 침대나 의자에서 미끄러져 내려가 다시 제 위치로 옮기는데 많은 도움이 필요 된다. 관절구축이나 강직, 움직임 등으로 항상 마찰 이 생긴다.	
	2.잠정적으로 문제있음	자유로이 움직이나 약간의 도움을 필요로 한다. 움 직이는 동안 의자억제대나 린넨 또는 다른 장비에 의해 마찰이 생길 수 있다. 의자나 침대에서 대부분 좋은 체위를 유지하고 있지만 가끔은 미끄러져 내려온다.	
	3.문제없음	침대나 의자에서 자유로이 움직이며 움직일 때 스스로 자신을 들어 올릴 수 있을 정도로 충분한 근력이 있다. 침대나 의자에 누워 있을 때 항상 좋은 체위를 유지한다.	3
합계점수			22
※ 해석 : (Braden , 2001) · 19~23 위험 없음                      · 15~18 약간의 위험 있음 · 13~14 중간 정도의 위험 있음        · 10~12 위험이 높음 · 9 이하 위험이 매우 높음			
비고			
<div style="text-align: right;">             작성자명 : 이선영           </div>			




## 욕창위험도 평가지

실버메디컬복지센터재가장기요양기관

수급자	김계선	생년월일(성별)	1929.10.27 (여)	본인부담률	일반 15%
인정번호	L1804085551	급여개시일	2020.09.09	등급	3등급
작성일	2025.05.31	조사사유	<input type="checkbox"/> 1.신규 <input checked="" type="checkbox"/> 2.재사정 <input type="checkbox"/> 3.상태변화		

구 분	척도	내용	점수
감각인지 정도	1.감각 완전 제한됨 (완전히 못 느낌)	의식수준이 떨어지거나 진정/안정제 복용/투여등 으로 통증 자극에 반응이 없다(통증자극에 대해 신음하거나 주먹을 쥔다거나 할 수 없음). 신체 대부분에서 통증을 느끼지 못한다.	
	2.감각 매우 제한됨	통증 자극에만 반응(신음하거나 불안정한 양상으로 통증이 있음을 나타냄) 또는 신체의 1/2 이상에 통증이나 불편감을 느끼지 못한다.	
	3.감각 약간 제한됨	말로 지시하면 반응하지만, 체위 변경을 해달라고 하거나 불편하다고 항상 말할 수 있는 것은 아니다. 또는 사지에 통증이나 불편감을 느끼지 못한다.	
	4.감각 손상 없음	말로 지시하면 반응을 보이며 통증이나 불편감을 느끼고 말로 표현할 수 있다.	4
습기여부	1.항상 젖어 있음	피부가 땀, 소변으로 항상 축축하다.	
	2.자주 젖어 있음	늘 축축한 것은 아니지만 자주 축축해져 8시간에 한번은 린넨을 갈아주어야 한다.	
	3.가끔 젖어 있음	가끔 축축하다. 하루에 한번 정도 린넨 교환이 필요하다.	
	4.거의 젖어있지 않음	피부는 보통 건조하며 린넨은 평상시대로만 교환 해 주면 된다.	4
활동상태	1.항상 침대에만 누워 있음	도움 없이는 몸은 물론 손, 발을 조금도 움직이지 못한다.	
	2.의자에 앉아 있을 수 있음	걸을 수 없거나 걷는 능력이 상당히 제한되어 있다. 체중 부하를 할 수 없어 의자나 휠체어로 이동시 도움을 필요로 한다.	
	3.가끔 걸을 수 있음	낮 동안에 도움을 받거나 도움 없이 매우 짧은 거 리를 걸을 수 있다. 그러나 대부분의 시간은 침상 이나 의자에서 보낸다.	
	4.자주 걸을 수 있음	적어도 하루에 두 번 방밖을 걷고, 방안은 적어도 2시간 마다 걷는다.	4
움직임	1.완전히 못 움직임(스스로 움직일 수 없음)	도움 없이는 신체나 사지를 전혀 움직이지 못한다.	
	2.매우 제한됨	신체나 사지의 체위를 가끔 조금 변경시킬 수 있지 만 자주하거나 많이 변경시키지 못한다.	
	3.약간 제한됨	조금이기는 하지만 혼자서 신체나 사지의 체위를 자주 변경시킨다.	
	4.제한 없음	도움 없이도 체위를 자주 변경시킨다.	4

영양상태	1.매우나쁨	제공된 음식의 1/3 이하를 섭취한다. 단백질(고기 나 유제품)을 하루에 2회 섭취량 이하를 먹는다. 수분을 잘 섭취 안한다. 유동성 영양보충액도 섭취 하지 않는다. 또는 5일 이상 동안 금식상태이거나 유동식으로 유지한다.	
	2.부족함	제공된 음식의 1/2를 먹는다. 단백질(고기나 유제 품)은 하루에 약 3회 섭취량을 먹는다. 가끔 영양보 충 식이를 섭취한다. 또는 유동식이나 위관영양을 적정량 미만으로 투여 받는다.	
	3.적당함	식사의 반 이상을 먹는다. 단백질(고기나 유제 품) 을 하루에 4회 섭취량을 먹는다. 가끔 식사를 거부 하지만 보통 영양보충식이는 섭취한다. 또는 위관 영양이나 TPN으로 대부분의 영양요구량이 충족 된다.	3
	4.양호함	대부분의 식사를 섭취하며 절대 거절하는 일이 없 다. 단백질(고기나 유제품)을 하루에 4회 섭취량 이 상을 먹으며 가끔 식간에도 먹는다. 영양보충 식이 는 필요로 되지 않는다.	
마찰력과 응전력	1.문제 있음	움직이는데 중정도 이상의 많은 도움을 필요로 한 다. 린넨으로 끌어당기지 않고 완전히 들어 올리는 것은 불가능하다. 자주 침대나 의자에서 미끄러져 내려가 다시 제 위치로 옮기는데 많은 도움이 필요 된다. 관절구축이나 강직, 움직임 등으로 항상 마찰 이 생긴다.	
	2.잠정적으로 문제있음	자유로이 움직이나 약간의 도움을 필요로 한다. 움 직이는 동안 의자역제대나 린넨 또는 다른 장비에 의해 마찰이 생길 수 있다. 의자나 침대에서 대부분 좋은 체위를 유지하고 있지만 가끔은 미끄러져 내려온다.	
	3.문제없음	침대나 의자에서 자유로이 움직이며 움직일 때 스스로 자신을 들어 올릴 수 있을 정도로 충분한 근력이 있다. 침대나 의자에 누워 있을 때 항상 좋은 체위를 유지한다.	3
합계점수			22
※ 해석 : (Braden , 2001) · 19~23 위험 없음                      · 15~18 약간의 위험 있음 · 13~14 중간 정도의 위험 있음      · 10~12 위험이 높음 · 9 이하 위험이 매우 높음			
비고			
작성자명 : 이선영 			

## 욕창위험도 평가지

실버메디컬복지센터재가장기요양기관

수급자	김계선	생년월일(성별)	1929.10.27 (여)	본인부담률	일반 15%
인정번호	L1804085551	급여개시일	2020.09.09	등급	3등급
작성일	2025.08.18	조사사유	<input type="checkbox"/> 1.신규 <input checked="" type="checkbox"/> 2.재사정 <input type="checkbox"/> 3.상태변화		

구 분	척도	내용	점수
감각인지 정도	1.감각 완전 제한됨 (완전히 못 느낌)	의식수준이 떨어지거나 진정/안정제 복용/투여등 으로 통증 자극에 반응이 없다(통증자극에 대해 신음하거나 주먹을 쥔다거나 할 수 없음). 신체 대부분에서 통증을 느끼지 못한다.	
	2.감각 매우 제한됨	통증 자극에만 반응(신음하거나 불안정한 양상으로 통증이 있음을 나타냄) 또는 신체의 1/2 이상에 통증이나 불편감을 느끼지 못한다.	
	3.감각 약간 제한됨	말로 지시하면 반응하지만, 체위 변경을 해달라고 하거나 불편하다고 항상 말할 수 있는 것은 아니다. 또는 사지에 통증이나 불편감을 느끼지 못한다.	
	4.감각 손상 없음	말로 지시하면 반응을 보이며 통증이나 불편감을 느끼고 말로 표현할 수 있다.	4
습기여부	1.항상 젖어 있음	피부가 땀, 소변으로 항상 축축하다.	
	2.자주 젖어 있음	늘 축축한 것은 아니지만 자주 축축해져 8시간에 한번은 린넨을 갈아주어야 한다.	
	3.가끔 젖어 있음	가끔 축축하다. 하루에 한번 정도 린넨 교환이 필요하다.	
	4.거의 젖어있지 않음	피부는 보통 건조하며 린넨은 평상시대로만 교환 해 주면 된다.	4
활동상태	1.항상 침대에만 누워 있음	도움 없이는 몸은 물론 손, 발을 조금도 움직이지 못한다.	
	2.의자에 앉아 있을 수 있음	걸을 수 없거나 걷는 능력이 상당히 제한되어 있다. 체중 부하를 할 수 없어 의자나 휠체어로 이동시 도움을 필요로 한다.	
	3.가끔 걸을 수 있음	낮 동안에 도움을 받거나 도움 없이 매우 짧은 거 리를 걸을 수 있다. 그러나 대부분의 시간은 침상 이나 의자에서 보낸다.	
	4.자주 걸을 수 있음	적어도 하루에 두 번 방밖을 걷고, 방안은 적어도 2시간 마다 걷는다.	4
움직임	1.완전히 못 움직임(스스로 움직일 수 없음)	도움 없이는 신체나 사지를 전혀 움직이지 못한다.	
	2.매우 제한됨	신체나 사지의 체위를 가끔 조금 변경시킬 수 있지 만 자주하거나 많이 변경시키지 못한다.	
	3.약간 제한됨	조금이기는 하지만 혼자서 신체나 사지의 체위를 자주 변경시킨다.	
	4.제한 없음	도움 없이도 체위를 자주 변경시킨다.	4

영양상태	1.매우나쁨	제공된 음식의 1/3 이하를 섭취한다. 단백질(고기 나 유제품)을 하루에 2회 섭취량 이하를 먹는다. 수분을 잘 섭취 안한다. 유동성 영양보충액도 섭취 하지 않는다. 또는 5일 이상 동안 금식상태이거나 유동식으로 유지한다.	
	2.부족함	제공된 음식의 1/2를 먹는다. 단백질(고기나 유제 품)은 하루에 약 3회 섭취량을 먹는다. 가끔 영양보 충 식이를 섭취한다. 또는 유동식이나 위관영양을 적정량 미만으로 투여 받는다.	
	3.적당함	식사의 반 이상을 먹는다. 단백질(고기나 유제 품) 을 하루에 4회 섭취량을 먹는다. 가끔 식사를 거부 하지만 보통 영양보충식이 는 섭취한다. 또는 위관 영양이나 TPN으로 대부분의 영양요구량이 충족 된다.	3
	4.양호함	대부분의 식사를 섭취하며 절대 거절하는 일이 없 다. 단백질(고기나 유제품)을 하루에 4회 섭취량 이 상을 먹으며 가끔 식간에도 먹는다. 영양보충 식이 는 필요로 되지 않는다.	
마찰력과 응전력	1.문제 있음	움직이는데 중정도 이상의 많은 도움을 필요로 한 다. 린넨으로 끌어당기지 않고 완전히 들어 올리는 것은 불가능하다. 자주 침대나 의자에서 미끄러져 내려가 다시 제 위치로 옮기는데 많은 도움이 필요 된다. 관절구축이나 강직, 움직임 등으로 항상 마찰 이 생긴다.	
	2.잠정적으로 문제있음	자유로이 움직이나 약간의 도움을 필요로 한다. 움 직이는 동안 의자억제대나 린넨 또는 다른 장비에 의해 마찰이 생길 수 있다. 의자나 침대에서 대부분 좋은 체위를 유지하고 있지만 가끔은 미끄러져 내려온다.	
	3.문제없음	침대나 의자에서 자유로이 움직이며 움직일 때 스스로 자신을 들어 올릴 수 있을 정도로 충분한 근력이 있다. 침대나 의자에 누워 있을 때 항상 좋은 체위를 유지한다.	3
합계점수			22
※ 해석 : (Braden , 2001) · 19~23 위험 없음                      · 15~18 약간의 위험 있음 · 13~14 중간 정도의 위험 있음        · 10~12 위험이 높음 · 9 이하 위험이 매우 높음			
비고			
<div style="text-align: right;">             작성자명 : 강미영                      강미영           </div>			